

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة منتوري * قسنطينة *

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

رقم التسجيل :

الشعبة : الإدارة المالية

التوقع بالمبيعات باستخدام نماذج إحصائية

دراسة تطبيقية بشركة الاسمنت حامة بوزيان (SCHB)

مذكرة مقدمة مكملة لتأهيل شهادة الماجستير في علوم التسيير

تحت إشراف الأستاذ الدكتور :

عبد العزيز شرابي

من إعداد الطالب :

صلاح الدين كروش

أمام أعضاء لجنة المناقشة :

المركز الجامعي - أم البوادي

رئيساً

أ.د. السعدي رجال

جامعة منتوري - قسنطينة

مقرراً

أ.د. عبد العزيز شرابي

جامعة منتوري - قسنطينة

عضوأ

د. عبد النور موساوي

جامعة منتوري - قسنطينة

عضوأ

د. عبد الباقي روابم

السنة الجامعية : 2007-2006

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿...وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الآلية 88 من سورة هود

صدق الله العظيم

أحمد الله الذي وفقني لإتمام هذه المذكرة ...

شكر واهداء

أقدم أسمى شكراتي إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز شرابي ، الذي تفضل بقبوله الإشراف على هذه المذكرة ، كما لا أنسى الأستاذة إبراهيم خنني ، محمود فوزي شعوبي ، محمد شيخي من جامعة ورقلة ، بيبي عبد الوهاب من معهد الإحصاء جامعة قسطنطينية ، على جميع المساعدة والمساعدة التي قدموها لي في سبيل إعداد هذه المذكرة .

كما أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين والإخوة والأخوات ، وإلى أختي وزوجها وأبنها ، وإلى جميع الذين قدموا لي مساعدة من قرير أو بعيد ...

شكراً

مقدمة عامة

--*-*-*

مع دخول اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق، والماضيات الجارية من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وجب على الشركات والمؤسسات الجزائرية أن تتكيف مع المتغيرات التي تفرضها هذه الرهانات، وهذا من أجل محاولة رفع التحدي وتطوير قدراتها الذاتية من أجل تحسين منتجاتها وجعلها أثر تنافسية، والإعتماد أكثر من أي وقت مضى على التخطيط والتكنولوجيات والأساليب المستحدثة في التسيير والإدارة، والتي تقوم بمراقبة سيرورات التموين، الإنتاج التوزيع، ولهذا فإن للتوقع أهمية قصوى لحياة هذه المؤسسات، انطلاقاً من فائدته للإنسان في حياته، حيث أن الإنسان يخاف مم يخبئه له المستقبل القريب أو البعيد، ولهذا أصبح التوقع بالمعنى الحديث هو محاولة توقع الخطر أو المجهول ودرره، أو على الأقل الحد من خطورته وعواقبه، وله أهمية قصوى لدى الباحثين، والقادة لأنّه أحد الوسائل الهامة التي تساعده على اكتشاف المستقبل، ولهذا اتسعت أساليبه واتسع نطاقه في العصر الحديث، فهو يُعد اللبنة الأساسية في العملية الإدارية حيث تُحدّد فيه الإدارة ما تريده عمله، وأين، وكيف، وما هي الموارد التي تحتاج إليها لإتمام العمل، وذلك عن طريق تحديد الأهداف، ووضع الإستراتيجيات الواجب تحقيقها في المستقبل، وتصميم البرامج وتفصيل الخطوات والإجراءات والقواعد الازمة في إطار زمني محدد وبياني محسن، وهذا على ضوء التوقعات بالمستقبل والعوامل المؤثرة المحتمل وقوعها، كما يُعد النشاط الأساسي الذي تنتجه الإدارات كمدخل لحل مشكلاتها المختلفة، وحينما يُنفك المخطط في وضع خطة إدارية أو إنتاجية أو تسويقية أو ما شابه ذلك، فإنه يُحاول أن يتوقع، ويستشرف المستقبل مستعيناً في ذلك باستقراء الماضي البعيد والحاضر، وتحليل المتغيرات الحاضرة التي تلعب دوراً رئيساً وملائماً، وحتى يكون التوقع مفيداً يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية وإلا ستفقد العملية أهميتها :

أ- أن يكون دقيقاً قدر المستطاع، بـ- أن تكون البيانات المعتمدة في العملية التوقعية حديثة، جـ- أن يكون التوقع مفيداً أي يُستخدم في حل المشكلات، دـ- أن يكون غير مكلف، فلا تفوق التكاليف الفائدة المرجوة منه، هـ- أن يكون واضحاً قدر المستطاع لأن التوقع ومهما كانت دقتها فإنه لن يصل إلى حد الصحة المطلقة في جميع الأحوال .

كما تُعد تقنيات ونماذج التوقع من بين أهم الوسائل التسييرية الحديثة التي انتشرت بعد الحرب الكونية الثانية، وأخذت قسطاً وافراً من الدراسة والإهتمام نظراً لاستعمالاتها الواسعة والمتعددة في البلدان المتطرفة اقتصادياً، وذلك من أجل استخدامها كوسيلة ذات أهمية بالغة في تفسير بعض الظواهر الاقتصادية، والتوقع بسلوكها المستقبلي لأغراض أهمها البرمجة والتخطيط الاقتصادي، فهي عبارة عن معادلة أو مجموعة معادلات تتشكل من متغيرات داخلية(تابعة) وأخرى خارجية (مستقلة)، بالإضافة إلى مجموعة معالم ومقادير عشوائية، وتمثل هذه المعادلات نظاماً كاملاً لتشبيه مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني، وذلك بغية تسهيل آليات التسيير، وبشكل رئيس عقلنة عملية اتخاذ القرارات في ميدان المبيعات الإنتاج والتشغيل...إلخ، وذلك تبعاً لتطور نماذج القياس في الاقتصاد بشقيه الجزيئي "Micro économétrique" ، والكلي "Macro économétrique" ، إذ يلاحظ وعلى امتداد العقود الماضيين تبلور اتجاه قوي بين النماذج من جهة والنظرية الإقتصادية من جهة أخرى، فظهر ما اصطلاح على تسميته بالنمذجة "modélisation" ، والتي تحاول من خلال النموذج "model" الكشف عن الصفات الأساسية للظاهرة التي يقوم المحلل بدراستها، ويعطيه قدرة كبيرة على التحكم في

المتغيرات التي تؤثر فيها، ممّ يمكّنه في نهاية الأمر من اختبار الفرضيات، و اختيار أفضل البديل أو الحلول للمشكلات التي تواجه المخطّط، أو العوائق التي تحدُّ من قدراته على وضع الإستراتيجيات المناسبة لمشكلاته، هاته النماذج التي وصلت إلى مستوى كبير من التطور، وعمَّ استخدامها مختلف القطاعات كنتيجة مباشرة للتطورات التي وصلت إليها الحاسوبات الإلكترونية، والبرامج الجاهزة^(١) مما جعلها أكثر اقتصادية وسرعة، ذلك أن اتخاذ القرارات اعتماداً على هذه النماذج بعد الإختيار الموفق لها يخفّف بشكل كبير من الخسائر المحتملة، أو التقليل من حجم الفرص البديلة وهذا في ظل بيئة أو محیط اقتصادي تميّزه اللاإكادمة .

كما يُمكن الإشارة إلى أن عملية التوقع بواسطة النماذج المختلفة، واتخاذ القرارات في الشركات والمنشآت الصغيرة يقع على عاتق المسؤول الأول فيها، بينما في الشركات والمنشآت المتوسطة والكبيرة لا يمكن للمسيّر أن يتحمل لوحده هذا العبء الكبير، ولذا وجب تكوين متخصصين في ميادين الاستشراف والتوقع، وإيجاد قسم أو هيئة خاصة ومتخصصة لهذا العمل الإستراتيجي الهام سواءً بالنسبة للمنشأة أو الدولة .

كما نشير إلى أن هناك قسمين متمايزين لنماذج التوقع هما: الأساليب النظامية، الأساليب الغير نظامية، أما موضوع اهتمامنا في هذه الدراسة فهو ينحصر في الأساليب النظامية الغير سببية، والتي تعتمد على المتغيرات التاريخية للمتغير المراد توقع قيمته المستقبلية، ولا تحتاج إلى تحديد المتغيرات التي تفسّر سلوكه، ومن أهم النماذج الغير سببية نجد إسقاطات الإتجاه العام، والنماذج الإحصائية للسلسل الزمنية، هذه الأخيرة التي سوف نركّز عليها في هذا البحث، وذلك للأسباب التالية :

- غياب العلاقات السببية في بعض الأحيان، وكذا صعوبة قياس بعضها الآخر ،
- عدم توفر المعطيات الكافية حول المتغيرات الشارحة، كونها تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المشاهدات .

وقد أرتدينا أن تدور الإشكالية حول المسؤولين التاليين :

١- ما مدى دقة الطرق المستعملة في التوقع بالمؤسسة؟ ،

٢- هل يمكننا تحسين هاته التوقعات بتطبيقاتنا لنماذج إحصائية معينة؟ .

و لأجل الإجابة عن هذين المسؤولين، فإننا نقترح الفرضية التالية :

إن التوقعات التي تقوم بها شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) حالياً لا تقسم بالدقة، ويمكننا تحسينها اعتماداً على هاته النماذج .

والدافع الرئيس الذي دفعنا لمعالجة هذا الموضوع هو الأهمية الكبيرة للتوقع بالمبيعات، حيث أن الخطأ في إعداد هاته التوقعات لا يؤثّر فقط في أنشطة وفعاليّات إدارة المبيعات، بل يمتد إلى الأجهزة والوظائف الأخرى خاصة وظيفة الإنتاج

^(١) على الرغم من وجود عشرات النماذج المختلفة التي أصبح متوفراً على أقراص الحواسب الآلية الصغيرة منها والكبيرة، فإنه من المستبعد أن توجد البرمجيات الجاهزة القادرة على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات، وخاصة وأن ظروف وملابسات المشكلات التي تحيط بمنشأة أو منظمة غالباً ما تختلف عن ظروف وملابسات المشكلات التي تواجه المنظمات والمنشآت الأخرى، فال محلل يجد نفسه أحياناً أمام مشكلات تحتاج على تصميم نماذج خاصة بها، أو إلى ضرورة تطوير أو تطوير هذه البرامج الجاهزة لتصبح ملائمة لها . وللمزيد من التفصيل حول النماذج وأشكال النماذج (من المرجع [س. رجال- ٩٨]) .

وظيفة التخزين، وينجر عن هذا الخطأ عدد من العوائق، فعندما تكون النتائج المحصل عليها أكبر من المبيعات المحققة فعلاً، يؤدي ذلك إلى تجميد مبالغ كبيرة في شكل مخزون سلعي معرض للتلف والتقادم، زد على ذلك ارتفاع تكاليف التخزين، أما في حالة كون النتائج المحصل عليها أقل من الطلب الحقيقي، فينجم على ذلك حدوث فجوات واحتنيقات في الإنتاج مما يلزم المنشأة بتشغيل العاملين أوقاتاً إضافية لتغطية الطلبيات الضائعة للحفاظ على سمعتها، وقد يؤدي إلى فقدان قسط من الأرباح المتوقعة من المبيعات بسبب زيادة التكاليف المتمثلة في دفع أجور إضافية للعمال، ولهذا يتطلب نجاح عملية التوقع بالمبيعات ما يلي :

أ- الخبرة والمهارة الكافيين في القائمين بعملية التوقع، بـ- توفر المعلومات عن ماضي الظاهرة المدروسة، جـ- تحديد وتحليل العوامل المتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر في الطلب على المبيعات، دـ- مراقبة المبيعات باستمرار بهدف معرفة الإنحرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

ومن المفيد التذكير أن هذا البحث هو امتداد لرسائل ومذكرات ماجستير سابقة على مستوى جامعة قسنطينة، منها رسالة الطالب : السعدي رجال (1984) والعنونة بـ : أسس استخدام جدول التشابك في التنبؤ بهيكل التعليم في الجزائر، و ذلك بواسطة تقنية جديدة تجمع بين بعض خصائص جدول المدخلات والمخرجات من جهة وسلسل ماركوف من جهة أخرى، كما كانت الرسالة مدعمة بدراسة تطبيقية، وكذلك الطالبة : سميرة عطيوي (1998)، والتي تناولت تحسين التوقع بالطلب على المنتوجات الصيدلانية، دراسة تطبيقية بمؤسسة أنكوفارم، وكذلك الطالبة شهرزاد الوافي (1998)، والتي تناولت موضوع الطاقة الكهربائية في الجزائر في محاولة للتوقع بالإستهلاك وهذا باستخدام نماذج قياسية، وكذلك الطالب : عبد القادر بوالسبت (2001) الذي تناول دراسة تحليلية وتنبؤية لإنتاج الحبوب الشتوية في الجزائر، حيث قام باستخدام "سلسل ماركوف" في التنبؤ بانتاجية الهكتار من القمح، وكذا إنتاجه بدرجة جودة مقبولة، وأخيراً الطالب : ساعد مرابط (2002) الذي تناول التوقع بالمبيعات على المدى القصير باستعمال طريقة بوكس-جنكينز، دراسة تطبيقية بمؤسسة (B.C.R) سطيف، حيث تناول فيها المفاهيم الأساسية المتعلقة بطريقة بوكس-جنكينز في التوقع والطرق الأخرى المعروفة، كما قام بإجراء دراسة تطبيقية لهذه الطريقة على سلسلة زمنية تحتوي على مبيعات شهرية لأحد المنتوجات المختارة، ومقارنتها مع الطريقة البسيطة المعروفة بالتمليس الأسني .

أما من حيث حدود الدراسة و اختيار المناهج المستخدمة في البحث فهي كما يلي :

لقد اتبعنا في هذه الدراسة، و نظراً لطبيعة الموضوع محل الدراسة ولبلوغ الغاية المراد الوصول إليها، على المناهج المتعارف عليها في العلوم الإنسانية من المنهج التحليلي الإستنتاجي والإحصائي الرياضي، وذلك من خلال اعتماد سلسلة زمنية تمثل المبيعات الشهرية للإسمنت البني في شركة إنتاج الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) .

وحتى يمكننا تغطية الموضوع وفقا للأهداف والحدود، تم تقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول على النحو التالي :

الفصل الأول : العنون بالتوقع بالمبيعات وأهم طرقه، وقد قُسم إلى أربعة مباحث كما يلي :

لله البحث الأول : تضمن أهمية التوقع بالمبيعات بالمؤسسة ومستوياته .

لله البحث الثاني : تضمن أساليب التوقع المختلفة من الموضوعية أو النظامية إلى الغير نظامية أو الذاتية .

لله البحث الثالث : تضمن مفهوم السلسل الزمنية ومركباتها، مع التطرق لاختبارات المساعدة في كشفها .

لله البحث الرابع والأخير: تم التطرق فيه إلى التوقع بواسطة نماذج الإستقطاب .

الفصل الثاني : حُصص للتطرق إلى طريقة بوكس-جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية، وقد قسم إلى أربعة مباحث

كما يلي :

لله البحث الأول : تضمن مدخل أولي مفاهيمي حول السلسل الزمنية المستقرة والغير مستقرة، وكذلك الدول المختلفة لتمثيل السلسل الزمنية وهي دالة الإرتباط الذاتي الكلية و الجزئية، وكذلك تم التطرق لكلا الدالتين الممثلتين لنماذج التشويش الأبيض أو الضجة البيضاء .

لله البحث الثاني : تضمن التعريف بالنماذج التمثيلية المختلفة للسلسل الزمنية وهي نماذج الإنحدار الذاتي ونماذج المتواسطات المتحركة، التكمالية العادية والموسمية والتي تسمى اختصاراً بـ (ARIMA-SARIMA) مع التعرض إلى خصائصهما، وتمثيلهما في منحنيات دالتي الإرتباط الذاتي، والإرتباط الذاتي الجزئية، وكذلك التعرض إلى شروط استقرارهما .

لله البحث الثالث : تضمن مراحل وخطوات التوقع بواسطة أسلوب بوكس-جنكنز في تحليل السلسلة الزمنية العشوائية بدءاً بالتعرف على النموذج، تقدير معلماته، تشخيص واختبار باقي النموذج .

لله وأخيراً في البحث الرابع، فقد تم التطرق فيه إلى التوقع بواسطة طريقة بوكس-جنكنز، واختبار دقة التوقع بواسطة أدوات اختبارية معينة .

الفصل الثالث : العنون بالتوقع بواسطة نماذج (ARCH-GARCH)، وقد قُسم إلى مباحثين كما يلي :

لله البحث الأول : تضمن التعريف بمشكلة عدم ثبات التباين، وأهم اختبارات الكشف عنها .

لله البحث الثاني: تم التطرق فيه إلى التعريف بشكل النموذجين (ARCH-GARCH) مبتدئين بالنماذج (ARCH)، وكذلك خصائص النموذجين، وشروط استقرارهما، وأخيراً علاقة التوقع بواسطتهما .

الفصل الرابع : العنون بالتعريف بالشركة وتشخيص مزيجها التسويقي، وقد قُسم إلى المباحث التالية :

لله البحث الأول : تضمن التعريف بمجمع الإسمنت للشرق (ERCE)، وكذلك شركة تسويق مواد البناء للشرق (SCMCE).

لله البحث الثاني : تضمن وظائف شركة إنتاج الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)، مبتدئين بالتعريف بها وبهيكلها التنظيمي، حيث تطرقنا إلى الوظائف التالية إبتداءً بوظيفة التموين، الإنتاج، والمالية وأخيراً الوظيفة التسويقية .

لله المبحث الثالث : تم التطرق فيه إلى تشخيص المزيج التسويقي للمنتج الوحيد الذي تنتجه شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)، وهو منتج الإسمنت البورتلاندي المركب الذي يرمز إليه بـ : CPS-CEM II/A 42.5، وذلك من حيث طبيعة المنتوج، الأسعار والمنافسة، الإشهار والتوزيع .

الفصل الخامس : تم فيه إجراء الدراسة التطبيقية بشركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)، وقد قُسم إلى ثلاثة مباحث كما يلي:

لـ³ المبحث الأول: تضمن الدراسة الإحصائية للسلسلة الزمنية المدروسة، حيث قمنا بالكشف عن مركبات الإتجاه العام والموسمية، إلا أننا لم نجد لها تحتوي على أية مركبة، والهدف من ذلك هو جعلها مستقرة، إذ لا يمكن الإنطلاق في مرحلة التعرّف على النموذج الملائم إلا بتوفّر شرط استقرارية السلسلة الزمنية محل الدراسة.

لله المبحث الثاني : تضمن التوقع باستعمال النموذج الملائم للسلسلة الزمنية المعدلة (ج)، حيث وبعد المرور بالمراحل الثلاث ابتداءً بالتعرف، التقدير، فالتشخيص، وقمنا بإجراء المقارنة بين نتائج التوقع بواسطة بوكس-جنكز والمسح الأسم، البسيط.

لله المبحث الثالث والأخير: تم التطرق فيه إلى التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH، إلا أنه وبعد اختبار معامل الإرتباط الذاتي الكلية والجزئية وشكل الإرتباط الذاتي للبواقي مربعة اتضح أن جميعها يقع داخل فترة ثقة ٩٥٪، بما يعني أن الا، تباط الذات، بين البواقي، مربعة غير معنوي . وبالتالي، لا يمكن تطبيق هذا النوع من النماذج .

وتنتهي المذكرة بعرض لأهم النتائج المتوصّل إليها، مع ذكر لأهم التوصيات تليها عملية استعراض للمراجع التي تم اعتمادها بهذه الدراسة بصورة مفصلة متوكّلاً فيها الترتيب الأبجدي للغة الصادر بها، بينما اعتمدنا منهجية الإقتضاب عند الإشارة على هذه المراجع في هوماش صفحات الدراسة، مع الإكتفاء فقط بذكر إسم المؤلف وسنة التأليف ضمن القائمة تا، كين التفاصيل الأخرى لقائمة المراجع المعروضة في نهاية المذكرة .

كما لا أنسي في الأخير التذكير بالصعوبات التي واجهتنا في سبيل إعداد هذه المذكرة خاصة في الجانب التطبيقي، فنذكر منها ما تعلق بالحصول على البيانات الخاصة بالمبيعات، وكذلك الحصول على البرمجيات الخاصة بميدان القياس الاقتصادي خاصة وهي (e-views ver2.0)^(٤)، ممًّا تطلب منا التكوين من أجل التمرن على كيفية استخدامه .

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه

- ﴿ المبحث الأول : أهمية التوقع بالمبينات بالمؤسسة ومستوياتها
- ﴿ المبحث الثاني : أساليب التوقع بالمبينات
- ﴿ المبحث الثالث : مركبات السلسلة الزمنية وطرق كشفها
- ﴿ المبحث الرابع : التوقع بواسطة نماذج الاستقطاب

الفصل الأول : التوقع بالبيعات وأهم طرقه

تمهيد :

في الماضي كان التوقع بالبيعات مجرد تخمين بقيمة الطلب المتوقع من الأفراد أو الجماعات على السلع والخدمات، ذلك أن الإنتاج كان محدوداً والسوق الذي يُصرف فيها في منطقة ضيقة نتيجة الطلب المحدود، زد على ذلك أن الأساليب الإدارية والفنية المستخدمة آنذاك كانت بدائية، أما في الوقت الحاضر فقد حدث تغيير جذري نتيجة التطور العلمي، حيث أصبحت الأساليب والأنشطة التي تقوم بها المنشآت أكثر تعقيداً وتطوراً، مما يسمح لها بخوض غمار المنافسة، وإنتاج سلع وخدمات جديدة ذات مواصفات أكثر قبولاً لدى المستهلكين، الأمر الذي أدى إلى وجوب تخطيط البيعات مستقبلاً، فتخطيط البيعات يعتمد على النتائج المحصل عليها من خلال عملية التوقع بالبيعات، وسوف نحاول في هذا الفصل التطرق إلى التوقع بالبيعات بواسطة نماذج الاستقطاب البسيطة، على أن نتطرق إلى النماذج الأكثر تطوراً وتعقيداً في الفصلين القادمين، ولكن سوف نبدأ أولاً بإعطاء بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بميدان التوقع .

المبحث الأول : أهمية التوقع بالبيعات في المؤسسة ومستوياته

يرى الأستاذ هنري فايول، الذي يعتبر الأب الحقيقي لعلم الإدارة أن قوة التوقع بالأشياء قبيل حدوثها يعتبر جوهر الإدارة^(١) ، فالقيام بعملية التوقع بشكل صحيح يوصلنا إلى الهدف المطلوب إذا قمنا باتباع الطرق السليمة والصحيحة، واعتمدنا على الأسس العلمية والطرق الرياضية والإحصائية في إعداد التوقعات .
وسنحاول في هذا البحث إعطاء بعض المفاهيم الأساسية في مجال التوقع، وكذلك إبراز أهمية التوقع بالبيعات في المؤسسة ومستوياتها .

١ - مدخل مفاهيمي :

نظراً لقلة الأبحاث باللغة العربية حول الدراسات المستقبلية، فإن المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذا المجال المعرفي غير مضبوطة، ولا زالت تستعمل كلمة "التبؤ" للدلالة عن أي معرفة عن المستقبل، بينما هناك تميّز واضح في اللغات الأجنبية الأخرى بين مجموعة من المفاهيم تتعلق بموضوع المعرفة المستقبلية، وتحمل مضموناً محدداً ودقيقاً . هذا التميّز بين المفاهيم ضروري لإرساء الصراحة العلمية في مجال الدراسات المستقبلية^(٢) ، وفيما يلي تعريف وجيز بتلك المفاهيم .

١-١- التوقع : للتوقع عدة تعريفات تختلف باختلاف الزاوية التي يُنظر إليها، فأما لغة فإنه مشتق من الفعل وقع، توقع الأمر، أي انتظر حصوله، ويُقال استوقع الأمر بمعنى انتظر حصوله ؛ تخوّف منه .

أما في قاموس اللغة الفرنسية: فإننا نجد **Prévision**، مشتقة من الصيغة الإسمية للفعل اللاتيني الكلاسيكي **Preavisum**، والتي تنقسم في مفهومها إلى شقين هما: **Vidère**: تعني الأمام، و **Prea**: الرؤية، والكلمة في مدلولها الكلي تعني إدراك أو استنتاج مسبق .

^(١) من المرجع [م. عبيدات- ٠٢]، ص ١٨٤.

^(٢) من المرجع [ع. شرابي- ٠٠]، ص ٩ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

أما اصطلاحاً؛ فإن التوقع عبارة عن عملية فهم وتقدير الواقع عن طريق بناء نموذج رياضي إحصائي يقوم على فرضيات ، ويوضح العلاقات السببية أو الإرتباطية بين المتغيرات التي تحكم الظاهرة المدروسة بقدر من الثقة واليقين، وأن الأمور تتتطور في المستقبل بشكل كبير من تطورها في الماضي^(١).

وكذلك، فالتوقع هو عملية فهم وتقدير الواقع عن طريق بناء نموذج رياضي إحصائي يقوم على فرضيات، ويوضح العلاقات السببية أو الإرتباطية بين المتغيرات التي تهم الظاهرة المدروسة بقدر من الثقة واليقين وأن الأمور تتتطور في المستقبل بشكل قريب من تطورها في الماضي^(٢).

إلا أن العديد من الباحثين من استعمل لفظي التوقع والتنبؤ بمفهوم واحد، خاصة الخطأ الشائع في إسناد مفهوم التوقع إلى التنبؤ لمعظم المراجع العربية، في حين يوجد هنا تمييز واضح في اللغات الأجنبية، حيث أن التنبؤ يهتم بالتغييرات الطارئة وبالظواهر الاقتصادية والاجتماعية العقدة مثل اكتشاف مصدر جديد للطاقة، انهيار دولة معينة، وصول تيار سياسي معين إلى الحكم وغيرها، بينما يقتصر التوقع على المؤشرات الكمية^(٣).

١ - ٢- التنبؤ :

يُعرف التنبؤ لغوياً من الفعل نبأ، أي ادعى النبوة، فهو من خصائص الأنبياء، أي الإدعاء بما سيحدث في المستقبل، ولا يحتمل الشك، بينما التوقع من خصائص البشر قد يحتمل الصَّح أو الخطأ.

طبعية موضوع التنبؤ تجعله لا يعتمد على بناء النماذج الرياضية، ولا يمتلك بعدً منهجاً علمياً دقيقاً مثل ما هو شأن بالنسبة للتوقع، فعملية التنبؤ تعتمد على الخبرة الهاشلة والمعرفة العلمية والعملية في مجال الظاهرة المدروسة مما يجعل موضوع التنبؤ هو أقرب إلى الفن منه إلى العلم .

وأما أهم الطرق المتبعة في عملية التنبؤ هي طريقة تقديرات الخبراء، ومنها طريقة دلفي نسبة إلى المدينة اليونانية الشهيرة التي تنبأ أهلها بانتصار الإسكندر المقدوني على داريوس إمبراطور الفرس .

١ - ٣- التقدير : هي عملية إدراك الواقع وصياغته في شكل رياضي-إحصائي، يوضح العلاقة السببية أو الإرتباطية بين المتغير التابع والمتغير أو المتغيرات المستقلة، وعادة ما يأخذ هذا النموذج الشكل التالي :

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots) + u$$

حيث أن u تمثل الظاهرة المدروسة، قد يكون معدل النمو الاقتصادي مثلاً، أما المتغيرات المستقلة $\dots, x_1, x_2, x_3, \dots$ فهي المتغيرات النظامية التي يعتقد أنها تفسّر وتحكم الظاهرة u ، مثل حجم الإستثمارات، نمو الإنتاجية، معدل نمو السكان .

^(١) انظر المرجع [ع.ق.بودقة - ٧٩]، ص ١٩٧.

^(٢) انظر المرجع [م.ن.الخياط - ٨٣] ، ص ٦٤-٦٥.

^(٣) انظر في ذلك [ع.شرابي- ٠٠]، ص ١١.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

إن النموذج يمكن أن يأخذ أشكالاً مختلفة فقد تكون خطية أو أسيّة أو لوغارتمية أو مثلثية عندما يتعلق الأمر بدراسة الطواهر الموسمية والدورية^(١).

أما // فهي قيمة عشوائية تُعبّر عن الأخطاء في القياس وأخطاء المعلومات المدخلة في النموذج، وكذلك المتغيرات التي لم تُؤخذ بعين الإعتبار، بالإضافة إلى العوامل العشوائية التي قد تحدث وقد لا تحدث، كمانها تُعبر عن الفرق بين الشكل الحقيقي للعلاقة والشكل الرياضي .

إن وجود هاته القيمة العشوائية في النموذج مهما كانت صغيرة هي التي تعطي الطابع الإحصائي الإحتمالي للعلاقة، بحيث مهما اجتهد الباحث في إدراج كل العوامل المفسّرة للظاهرة المدروسة في النموذج، فإن هناك دوماً مجال لعوامل عشوائية يظهر تأثيرها من حين إلى آخر، فمثلاً عند عملية تقدير العلاقة الإرتباطية بين المحصول الزراعي كتابع والعوامل المفسّرة له مثل كمية الأمطار المتساقطة، كمية الأسمدة الكيميائية المستعملة... إلخ، فإنه يبقى هنالك دوماً مجال للعوامل العشوائية المختلفة التي قد تحدث وقد لا تحدث، مثل هبوب رياح عاتية تتلف المحصول الزراعي، أو اجتياح الجراد للحقول المزروعة وبالتالي إتلاف المحصول^(٢).

١ - ٤- التخطيط :

إن التخطيط هو عبارة عن إجابة على عدد من التساؤلات منها : ماذا نفعل؟، متى؟، أين؟، كيف؟، أو أنه عبارة عن عملية الإعداد المقدم لما يجب عمله في المستقبل بهدف تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف، فهو إذن يتطلب درجة عالية من الإبتكار أو التفكير الإبتكاري، كمانه ينطوي على قدر كبير من التوقع بالمستقبل .

ومن ناحية أخرى فهو يعتبر الوظيفة الإدارية الأولى التي ما عادها من الوظائف الأخرى، وبالإضافة إلى أن التخطيط يعتبر وظيفة كل مدير بالمنظمة، فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة، وتنتمي ترجمة عملية التخطيط إلى الخطة التي تعتبر النتاج الرئيس لعملية التخطيط، وأنها تقرير أو بيان بأنواع الوسائل والتصرفات الخاصة بتحقيق الأهداف أو النتائج المستهدفة، وهذا البيان قد يُمثل في حقيقة الأمر ترجمة رقمية لعملية التخطيط، فنجده في الخطة الإجابة على الأسئلة السابقة^(٣)، إذن يمكن القول بأن معرفة المستقبل ما هي سوى مدخل في العملية التخطيطية^(٤).

إذا أردنا التوقع بقيمة متغير معين في سنة قادمة، فقد نعتبر هذه القيمة مساوية لقيمتها في السنة السابقة، أو لتوسط قيمه في عدد من السنوات السابقة، وقد توضع نماذج أكثر تعقيداً للسلالس الزمنية مثل نماذج بوكس- جنكنز (سوف نتناولها في الفصل الثاني) ، ولكنها تشتراك جميعاً في صفة أساسية، وهي أن التوقع بالقيم المستقبلية لمتغير معين يتم استناداً إلى القيم التاريخية لهذا المتغير وحده .

^(١) انظر الأشكال المختلفة لهاته الدالة في هذا الفصل ، حيث المتغير المستقل هو الزمن t ، حيث أن الدالة تأخذ الشكل التالي :

$$y = f(t_1, t_2, t_3, \dots) + u$$

^(٢) انظر المرجع [ع.ق. عطية-٠٢]، ص ١٠٥ للتعرف على الفرضيات الإحتمالية للمتغير العشوائي .

^(٣) انظر المرجع [ع.س. أبو قحف-٠٢]، ص ص ٢٥٣ - ٣٣٩ .

^(٤) من المرجع [ع.شرابي-٠٠] ، ص ٢٤ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

2 - أهمية التوقع بالبيانات في المؤسسة ومستوياته :

إن تعقد وتشابك المتغيرات التي يعيش في إطارها مشروع الأعمال في الوقت الراهن ، جعل الإدارات تدرك أهمية التخطيط والتوقع بالمستقبل . فالخطيط يساعد المنظمة في البحث عن أهداف منطقية وعلمية من جهة ، ومن جهة أخرى في الوصول إلى طرق منطقية وعلمية لتحقيق هذه الأهداف ، كذلك يفيد التخطيط في تنسيق أنشطة المنظمة وتوجيهها إلى أهداف محددة مُتفق عليها ، حيث أن البديل للخطيط هو السلوك العشوائي (Random Behavior) ، ففي غيبة التخطيط تكون تصرفات المدير عبارة عن ردود أفعال (Reaction) للمواقف والمشاكل التي تَسْتَجِدُ ، أما التخطيط فإنه يسمح بأخذ المبادرة في نشوء مواقف تستفيد منها المنظمة ، فالمدير الذي لا يأخذ بالخطيط يبقى بصفة مستمرة فيما يشبه حالة مكافحة النيران وفيما يتعلق بالعلاقة بين التوقع والخطيط ، هو أنه يمكن اعتبار الأول مرحلة أو خطوة في الثاني ، وأن الثاني يلي ويأتي كنتيجة للأول . وأيًّا كان الجدل فإن للتوقع أهمية للقيام بالعملية الخططية .

وسوف نتناول في هذا المقام النقاط التالية :

- ١- أهمية التوقع و مجالات استخدامه ،
- ٢- استخدامات بيانات التوقع بالبيانات ،
- ٣- العوامل المؤثرة على حجم البيانات ،
- ٤- معايير التوقع الفعال ،
- ٥- المستويات الأساسية للتوقع .

وسوف نبدأ بسرد هاته العناصر بالترتيب كما يلي :

١- أهمية التوقع في المؤسسة و مجالات استخدامه : يرى الأستاذ "هنري فايل" الذي يعتبر الأب الحقيقي لعلم الإدارة أن قوة التوقع بالأشياء قبل حدوثها جوهر الإدارة^(١) ، فالقيام بعملية التوقع بشكل صحيح يوصلنا إلى الهدف المطلوب إذا قمنا فعلاً باتباع الطرق السليمة والصحيحة واعتمدنا على الأسس العلمية والطرق الرياضية والإحصائية لعملية التوقع .

إن التفكير المنظم السابق لعملية التنفيذ والإستعداد والتهيئة للمستقبل قائم على التوقع والإحتمالات التي تضعها الجهات الإدارية على ضوء الإمكانيات المتاحة .

فعالية النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات من تسيير مالي وتجاري، تسيير للإنتاج، والموارد البشرية في تحسين الأداء الاقتصادي تبقى محدودة إذا لم يتم الاعتماد على توقعات دقيقة، ومن هنا برز التوقع كضرورة حتمية للتسيير الفعال للمؤسسة، ومن بين أهم العوامل التي أدت إلى الاهتمام المتزايد بهذه الأداة ما يلي^(٢) :

ـ زيادة وتحسين نوعية البيانات الإحصائية وخاصة بعد إنشاء أقسام الإحصاء المتخصصة، حيث بقدر صحة البيانات بقدر صحة النتائج .

^(١) انظر المرجع [م.عبدات-٠١] ، ص ١٨٤ .

^(٢) انظر المرجع [س.رجال-٨٤] ، ص ٩ .

الفصل الأول : التوقع بالبيعات وأهم طرقه

- « مشاركة بعض الباحثين في تحليل السلسل الزمنية التي تعكس تطور الظواهر الاقتصادية والاجتماعية عبر الزمن .
- « ظهور نتائج البحوث في ميدان القياس الاقتصادي ، والتي استهدفت البحث في أنواع العلاقات المعبرة عن سلوك بعض المتغيرات واتجاهها تبعاً للسلوك الحالي .
 - كما تجدر الإشارة إلى أن عملية التوقع في معظم المؤسسات تشتهر في العناصر التالية ^(٤) :
 - « لا يمكن القيام بعملية التوقع إلا في ظل فترة زمنية محددة ،
 - « تقتضي عملية التوقع جهلنا بالأوضاع التي ستواجه المؤسسة في المستقبل ، لأنه إذا كان الأمر عكس ذلك ، فإن عملية التوقع تصبح غير مجديّة ،
 - « ترتكز وظيفة التوقع أساساً على جمع معطيات تاريخية تُعتبر كقاعدة فعالة في عملية أخذ القرار .
 - إذن نستنتج أن عملية التوقع هي مسألة جوهريّة ومركزيّة بالنسبة للمؤسسة ، والجدول التالي يوضح لنا أهم مجالات استخدامات التوقع في المؤسسة .

جدول (١-١) : مجالات استخدام التوقع في المؤسسة

الآفاق	الاستخدامات	الوظائف
من ٣ إلى ٦ أشهر	للتوقع بالبيعات للتحديد الأهداف	• التسويق التجاري
من ٣ إلى ٦ أشهر	للتوقع بالطلبيات للتخطيط الإنتاج للتسبيير المخزون	• تسبيير الإنتاج
٦ إلى ١٢ شهراً	للتوقع بالبيعات للمخطط التسويقي	• التسويق
/	للتسبيير الخزينة للتسبيير أخطار الصرف	• المالية
١٥ إلى ١٨ شهراً	للموازنات	• مراقبة التسبيير
٣ سنوات	للتخطيط الإستراتيجي	• التخطيط

المصدر: [J.C.Usunier-٤٢]، ص ٨.

^(٤) انظر المرجع [س. عطيوى-٩٨]، ص ٦٢.

الفصل الأول : التوقع بالمبيعات وأهم طرقه

2-2-استخدامات بيانات التوقع بالمبيعات :

إن التوقع بالمبيعات ينبغي أن يكون مُرشداً لتحسين الأداء، والتوقع بالمبيعات الذي يُعدّ بعناية، ويتضمن درجة عالية نسبياً من الدقة يمكن الإستفادة منه في عدراً من أنشطة المنظمة، ونبين فيما يلي أهم هذه الإستخدامات بإيجاز^(٤) :

2-2-1-في ميدان الإنتاج :

تساعد عملية التوقع بالمبيعات في جدولة الإنتاج، فالإنتاج يختلف وفقاً للكميات المطلوبة، كمانه يُرتب الإلتزامات بالنسبة لشراء المعدات والمواد والمهمات، وكذلك فإن عدد عمال الإنتاج يمكن تحديده واتخاذ إجراءات الزيادة أو التخفيف في هذا العدد . يضاف إلى ذلك أن الشركة تستطيع تحديد الآلات التي سيتم تشغيلها . كمان هناك العديد من الأسئلة التي تتوقف الإجابة عليها على توافر بيانات المبيعات المتوقعة، ومن أمثلة ذلك : هل هناك حاجة لزيادة طاقة المصنع ؟ ، وهل سيتم ذلك عن طريق الشراء أو التأجير (Leasing) ، ما هي الكمية التي يجب أن ينتجهما بنفسه ؟، وما هي الكمية التي يوفرها من خلال موردين من الباطن؟ ، هل الأرخص للمشروع تركيب معدات جديدة أو الإستمرار في الاعتماد على موردين آخرين ؟.

2-2-2-في مجال المشتريات :

يتطلب الأمر بالنسبة لمعظم المشروعات ترتيب الإلتزامات في المستقبل، وذلك عن طريق التعاقد مقدماً لتأمين حصولها على احتياجات، ويصبح من الصعب على مدير المشتريات تحقيق أهداف إدارته إذا لم يعرف كمية الاحتياجات المستقبلية من الأصناف المختلفة، إذ وبدون التوقع بالمبيعات يضطر مدير المشتريات إلى الاعتماد على خبراته السابقة التي قد تختلف عن الوضع في المرحلة القادمة .

2-2-3-في مجال التمويل :

من المجالات الحرجية في أي مشروع من المشاريع توفير التمويل الكافي للمحافظة على يُسر سير عملياته، ومعظم المشروعات لا يكون لديها كميات كبيرة من الأموال الجاهزة للإستخدام، فهي تفضل تمويل العمليات العادية باستخدام أموالها الخاصة، أو الإقتراض من مصادر أخرى لتمويل الأنشطة والعمليات التي تمثل تقلباً أعلى من المستوى المعتاد، وذلك كالزيادة الموسمية أو غير المتوقعة، ويساعد التوقع بالمبيعات على تحديد حجم الأموال المطلوبة وأفضل المصادر من أجل الحصول عليها .

2-2-4-في مجال البيع :

تستخدم إدارة التسويق رقم المبيعات المتوقع به في أكثر من مجال، حيث يمكن الإسترشاد به في تحديد الإعلان، عدد رجالات البيع، الحصول عليهم، تدريبهم، الإشراف عليهم .

ويبني مدير المبيعات تخطيطه على حجم الأعمال التي سيقوم بها في الفترة القادمة، فالتوقع السنوي يُصبح أداة رئيسية في وضع استراتيجية المبيعات، والتوقع الربع سنوي يعطي توجيهها أكبر لعمل أي تغييرات في ضوء تغير الظروف واختلاف

^(٤) انظر المرجع [م.ع. الرحيم- ٨٨]، ص ٨٥ .

الفصل الأول : التوقع بالبيعات وأهم طرقه

الواقع الفعلي على التوقع . كمأن التوقع الشهري يُمكّن مدير البيعات من التكيف مع الواقع بسرعة مثل الإحتفاظ بمستوى المجهود الحالي أو زيارته ، وتدعمه المناطق الضعيفة ومواجهة الظروف الطارئة وغير المتوقعة .

كمأن لعملية التوقع أهمية لا يُستهان بها بالنسبة لوظيفة تسخير الموارد البشرية ، وتبرز هذه الأهمية خاصة في النقاط التالية :

لتسهيل القرارات الخاصة بمخطط التوظيف ،


لـ التوقع بعدد العمال الذين سيتم توظيفهم ضمن السلم المهني ، وكذلك الحاجات لبرامج التكوين ،

لـ التوقع بالتغييرات التي يمكن أن تطرأ على الساعات القانونية للعمل ، وكذلك التقاعد .

إن الملاحظة التي يمكن استنتاجها مـ سبق هي أنه بالرغم من أن لكل وظيفة مجالات استخدام التوقع ، غير أن هذه المجالات تتفاعل فيما بينها لتحليل الكم الهائل من المعلومات المتوفرة .

إن تداخل مختلف الوظائف فيما بينها يساهم في عملية اتخاذ القرارات على مستوى الإطار العام للمؤسسة ، حيث لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بتخطيط معين دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين وظائفها ، لذلك ينبغي على أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية أن تتميّز بالمرونة من حيث استعمالها لطرق التوقع المختلفة حتى تستطيع التكيف مع التغيرات التي قد تحدث في محيط المؤسسة ، وهذا ما يجعلها قادرة على تغيير أو تعديل التوقعات بناءً على المعلومات الجديدة المتوفرة لديها ، والشكل التوضيحي الموجي يبين لنا أهمية الدقة في التوقع بالبيعات من أجل نجاح نظام الميزانيات التقديرية ، وتعتبر ميزانية البيعات التقديرية أساساً لإعداد ميزانية المشتريات والإنتاج ، ومرشداً للتوسيع في المشروع باعتبارها المورد الرئيس للأرباح والمقوّضات النقدية التي يعتمد عليها لتمويل خطط المشروع .

إذن ، فإن التسخير الحديث يتطلب التعامل مع عدد هائل من المعلومات والملايين من الأرقام والتي يجب شرحها وتفسيرها وإعداد توقعات مستقبلية لها ، وذلك من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات وإعداد الإستراتيجيات داخل المؤسسة .



الشكل (١-١) : أهمية التوقع لنجاح الموازنات التقديرية

المصدر : [م. عبيادات - ٠١]، ص ٢١٤.

٢-٣ - العوامل المؤثرة في حجم المبيعات :

تقوم معظم التوقعات بالمبيعات على تقدير العوامل الخارجية ، والتوقع بحجم المبيعات التي يتوقعها المشروع إذا استمر على أوضاعه الحالية ، ويغلب على هذه النظرة اعتبار أن التوقع بالمبيعات شيء خارج عن نطاق المشروع ، ولكن النظرة الأكثر واقعية تتمثل في اعتبار أن المبيعات ليست نتيجة الأحوال الاقتصادية والتنافسية الخارجية فقط ، ولكنها أيضاً نتيجة تصرفات المشروع نفسه . فحجم المبيعات يتتأثر بالإعلان ، وسياسة الأسعار ، وتحسين وتطوير المنتجات و المجهودات التسويقية الأخرى ، وبهذا فإنه يمكننا تصوّر عدة برامج بديلة ، يوجد كل منها مع كل تركيبة من العوامل وتأثير كلاً من هذه العوامل ، ولكن وعلى الرغم من أن القائمين على المشروع يدركون أن التصرفات المختلفة ستؤثر على المبيعات والأرباح في الفترة القادمة ، فإن نتائج هذه التصرفات لا يمكن حسابها بدقة .

ومن المفيد تصنيف العوامل المختلفة التي تؤثر في حجم المبيعات إلى عوامل يمكن التحكم بها ، وأخرى لا يمكن التحكم بها .

فأما العوامل التي يمكن التحكم بها فتضم عناصر البيئة الداخلية للمشروع والأنشطة التخطيطية التي يسيطر عليها ،

وقد تخضع هذه العوامل لبعض القيود التي تتعلق بتوافر الموارد ، ومن الأمثلة على ذلك ذكر^(١) :

« طرح سلع جديدة وتطوير القديمة ،

« استخدام أساليب توزيع جديدة ،

^(١) انظر المرجع [م. عبيادات - ٠١] ، ص ١٨٧

الفصل الأول : التوقع بالبيعات وأهم طرقه

«تطوير كفاءة جهاز البيع ،

«التنسuir ،

«الإعلان ،

«تكليف النشاط التسويقي ،

«كفاءة الجهاز الإداري ،

«الموارد المالية .

أما العوامل التي لا يمكن التحكم بها أو العوامل الخارجية فتضم العناصر البيئية التي ليس للمشروع سيطرة عليها في المدى القصير، فهي عوامل البيئة الخارجية والتي تضم ما يلي :

لله العوامل السياسية ؛ حيث تعتبر الحروب والخلافات بين الدول وتقلبات الأوضاع السياسية الناجمة عن خلافات الكتل السياسية ذات أثر كبير و مباشر على عملية التخطيط والتوقع بالبيعات .

لله العوامل الاقتصادية ؛ حيث تتأثر المشاريع بالنواحي الاقتصادية العامة للبلد من حيث مرورها في فترات رواج أو كساد اقتصادي، والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي والسلبي على عملية التوقع بالبيعات .

لله الرقابة الحكومية على النشاط البيعي ؛ حيث تفرض الحكومات أحياناً إجراءات على أنظمة على نوعية السلع المنتجة ومواصفاتها وأسعارها مما يؤثر على عملية التوقع بالبيعات .

لله السكان ؛ حيث تتأثر عملية التوقع بالبيعات بعدد السكان، وتوزيعهم الجغرافي حسب فئات الأعمار والجنس، ونسبة النمو السكاني وعادات الإستهلاك والثقافة .

لله العوامل التقنية؛ حيث تؤثر العوامل التقنية على التوقع بالبيعات، وذلك نتيجة التطور التكنولوجي المستمر والذي يؤدي إلى خفض الأسعار نتيجة انخفاض التكاليف بالرغم من التعقيدات المصاحبة للتطور التقني .

لله العوامل الاجتماعية؛ وتشمل العادات والقيم الاجتماعية السائدة والقوة الشرائية والدخل القومي، وحجم الإستثمارات، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية ومستوى المنافسة في السوق وخطة الإستيراد والتصدير في بلد المشروع والضرائب وتقلبات الأسعار وكلها تؤثر على عملية التوقع بالبيعات .

ويُعتبر التوقع بالبيعات حصيلة تقييم العوامل الخارجية التي تؤثر على عمليات المشروع، وكذلك الموارد الداخلية والأهداف التي تسيطر عليها الإدارة . وكلما غطت هذه التوقعات أطول فترة من الزمن كلما ازدادت أهمية المناخ الخارجي لأنه يفرض قيوداً ومحددات تؤثر في المشروع .

وبينبغي إعطاء المنافسة - بصفة خاصة - وزناً كبيراً في تقدير المبيعات المستقبلية، ويمكن التمييز بين نوعين من المنافسة :

أ- المنافسة بين الصناعات المختلفة (Interindustry Competition) ، وهي التي تضم التصرفات التي تهدف إلى إغراء المستهلكين والمشترين على شراء منتجات صناعة معينة دون أخرى، وكمثال على ذلك المنافسة بين صناعتي الصلب والألمنيوم، والذين يمكن إحلال كلاً منهما مكان الآخر في بعض من المنتجات، وفي المجال الإستهلاكي ، فإن المجال مفتوح أمام عدد كبير جداً من الصناعات التي تتنافس على الدخل المتاح للتصرف فيه بواسطة المستهلك .

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه

بـ- أما النوع الآخر من المنافسة فهو بين مشروعات الصناعة الواحدة (Intra-Industry Competition)، وهو الذي يعبر عن الفكرة الشائعة عن المنافسة، فإذا تغيرت أحوال المنافسة داخل الصناعة، سواءً عن طريق تغيير عدد المشروعات المتنافسة، أو عن طريق تغيير أنشطتها الإعلانية أو البيعية وتصميم المنتجات، فإن حجم المبيعات المستقبلية سيتأثر تبعاً لذلك، وبالمثل فـي تأثير في استراتيجيات السعر الخاصة بالمنافسين يمكن أن يكون لها تأثير كبير.

٤-٢-معايير التوقع الفعال^(١):

يعتمد التوقع الفعال على عدد من العوامل، ليس أقلها الحظ، إلا أنه يمكن التمييز بين عدد من المعايير التي تؤدي إلى توقع أفضل، والتي نوجزها فيما يلي⁽²⁾ :

١٠-أخذ جميع العوامل المؤثرة في الإعتبار، ويدخل في ذلك العوامل الداخلية والخارجية، وذلك مثل العوامل المؤثرة في نمو الصناعة، وعوامل القوة والضعف بالنسبة لكل مشروع ومنافسيه، وقدرة الوظائف المختلفة للمشروع على تنفيذ الحجم المتوقع به.

بـ- الدقة : (Accuracy)

إذ و على الرغم من أهمية هذا العامل، فإنه لا ينبغي اعتباره بمعزل عن التكاليف المرتبطة به، فعلى سبيل المثال ربما يُستبعد أسلوب توقع معين (كاستطاع رأى المستهلكين)، لأنّه يؤدّي إلى نتائج غير دقيقة وتتكلفه مرتفعة.

ج - المرونة (Flexibility)

فالعوامل تحتاج إلى تعديل من وقت آخر لتلائم الظروف المتغيرة، وتسمح بأخذ المستقبل غير الرئيسي في الإعتبار، ولا ينبغي أن يكون التوقع جامداً لا يمكن تعديله في ضوء هذه الظروف أو أخطاء التقدير، وتحقيق معظم المشروعات المرونة المرغوبة عن طريق فحص توقع المبيعات في نهاية كل شهر أو ثلاثة أشهر وتعديلها-إذا لزم الأمر- في ضوء الأحوال السائدة وتطبيق هذا التعديل على باقي مدة التوقع . كما يمكن مراجعة طريقة التوقع ذاتها وذلك عن طريق مقارنة المبيعات المتوقعة بها وتحليل الإنحرافات أو الاختلافات، والهدف هو تحديد أسباب الإنحرافات وذلك في سبيل الوصول إلى توقعات أدق، وتعديل الفروق والأساليب في المستقبل .

د- المضامن (Plausibility)

فالمدير الذي يستخدم التوقع يجب أن يكون قادرًا على الإعتقاد في الطريقة التي استخدمت في الوصول إليه، فالأساليب الإحصائية المعقّدة التي لا يفهمها إلا الإحصائيون المتخصصون يمكن أن تكون موضع شك بالنسبة لكثير من المديرين.

^{١٤} انظر كذلك في المرجع [ع.شرابي-٦٠] ،ص ١٦ .

⁽²⁾ من المجمع [م.ع. الـ حـيم-88] ، ص 89 .

الفصل الأول : التوقع بالمبيعات وأهم طرقه

٤- التكلفة :

حيث يفضل الباحث أو رجل الأعمال عادة الطريقة ذات التكلفة الأقل ، وعموماً هناك ثلات عناصر أساسية تدخل في حساب التكلفة الإجمالية المتعلقة بتطبيق طريقة توقع معينة ، وهي ناجمة أساساً عن استعمال غالبية طرق التوقع للحاسوب ، وهذه العناصر هي :

- لله تكلفة تطوير وإعداد البرمجيات (Logiciels) ،
- لله تكلفة التخزين ،
- لله تكلفة الإستغلال .

و- مساعدة إدارة المنظمة (Organisational Participation) :

إذ لا ينبغي أن يتم التوقع على كل المستويات ، وبواسطة معظم الوظائف حتى يتتسنى لنا الحصول على حكم سليم . ويؤكد هذا العنصر الأخير أهمية إشراك رجال البيع في عملية التوقع ، كما ينبغي ترك هذه العملية كلية إلى الإدارات الإستشارية التي قد تكون بعيدة عن واقع البيع في السوق ، فعدم اشتراك إدارة المبيعات ، أو اشتراكها بدرجة غير كافية في عملية التوقع يمكن أن يكون له الأثر الكبير على الأهداف البيعية التي يمكن تحديدها . هذا بالإضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى إغفال عوامل معينة تكون لها تأثير على المبيعات .

ومن الشائع عند الوصول إلى رقم إجمالي للمبيعات المحتملة الميل إلى تبسيط كل شيء بحيث يتم تجاوز الرقم المحقق في السنة الماضية أو على الأقل تحقيق رقم مساوٍ له . ومن الواضح أن هذا الأسلوب غير واقعي لأنه يحمل الواقع الذي يؤثر في المبيعات المستقبلية . فعلى سبيل المثال ، إذا كانت مبيعات السنة منخفضة بسبب ظروف غير عادية لن تستمر فإنه من السهل تجاوزها في السنة التالية ، وعلى العكس من ذلك إذا كانت المبيعات مرتفعة بسبب ظروف موالية لن تتكرر ، فإنه من الصعب المحافظة عليها عند نفس المستوى . ومن ثم فإن هذا الإتجاه يؤثر تأثيراً سلبياً على جميع أعمال التخطيط التي تبني على أساس هذا التوقع ، بجانب تأثيره السيئ على معنويات رجال البيع الذين يتم تقديرهم على أساس درجة إنجازهم للأهداف البيعية . وبعد من ذلك ، وفي فترات التضخم فإن تجاوز أرقام السنة السابقة قد يقود إلى التفكير بأن هنالك تقدّم ، بينما المشروع في حقيقة الأمر يخسر مركزه التنافسي^(١) .

٢-٥- المستويات الأساسية للتوقع بالمبيعات :

يتم التوقع عادة بالنسبة لثلاثة مستويات من النشاط هي^(٢) :

- أ- التوقع في المستوى الاقتصادي العام ،
 - ب- التوقع بالسوق الكلي (أي مبيعات الصناعة) ،
 - ج- التوقع بنصيب المشروع من السوق (أي مبيعات الشركة) .
- وسوف نتناول كلاً من هذه المستويات بإيجاز كما يلي :

^(١) من المرجع [م. الرحيم-٣٨] ، ص ٩١.

^(٢) من المرجع [م. عبيدات-٠١] ، ص ١٣٨.

الفصل الأول : التوقع بالبيعات وأهم طرقه

أ- التوقع بالنشاط الاقتصادي العام :

إن تأثير المستوى العام للنشاط الاقتصادي في الدولة يحتم على مشروع الأعمال ضرورة البدء بالتوقع بالمناخ الاقتصادي العام للمجتمع كخطوة أولى في إعداد توقع جيد بالبيعات، فتحليل السياسة المالية، والنقدية، والإنفاق الإستهلاكي والاستثمارات الجديدة، كلها مؤشرات مفيدة في تحديد اتجاه النشاط الاقتصادي . ومن الأهمية بما كان في هذا الصدد أن يتم اختيار من يقوم بتوقع المؤشرات التي تؤثر على نشاطه، فبالنسبة مثلاً لمشروع إنتاج إطارات السيارات نجد أنه عند التوقع بمبيعاته لا بد وأن يُميّز بين عنصرين وهما :

أولاً: المبيعات من الإطارات التي تُستخدم في السيارات الجديدة، وهذه الأخيرة تؤثر بالحالة الاقتصادية العامة لأن هذه الحالة تؤثر بدون شك على مبيعات السيارات الجديدة .

ثانياً: المبيعات بغض الإحلال، وهذه تتأثر بعدد السيارات التي بيعت منذ سنتين أو أكثر .

ب- التوقع بمبيعات الصناعة :

لكي يحدد المشروع فرصه البيعية فإنه - بعد التوقع بالحالة الاقتصادية العامة - لا بد وأن يقوم بتقدير الطلب الكلي للسوق أي مبيعات الصناعة التي ينتمي إليها، ويمكن تعريف الطلب الكلي بالنسبة لمنتج معين بأنه الحجم الكلي الذي سيُشتري من هذا المنتج بواسطة مجموعة محددة من المستهلكين في منطقة جغرافية محددة، وفي فترة زمنية محددة، وفي مناخ استثماري تسويقي محدد، وفي ظل برنامج تسويقي محدد، ويعتبر تقدير الطلب الكلي على الصناعة من أهم العقبات التي تواجهه من يقوم بعملية التوقعات المتعلقة بمبيعات المشروع، وذلك بسبب صعوبة تحديده . ولكن من المفيد للوصول إلى حجم السوق الكلي وتحديده بين رقحين آخرين هما :

أولاً: السوق المحتمل (Market Potential) : وهو عبارة عن أعلى مستوى ممكناً من الطلب بحيث أن أي زيادة في المجهودات التسويقية سيكون لها تأثير محدود على زيادة الطلب عند هذا المستوى ،

ثانياً: السوق المتوقع (Market Forecast) : وهو عبارة عن المستوى من الطلب الذي يمكن تحققه عند مستوى متوقع من المجهودات التسويقية لجميع مشروعات الصناعة .

ج- التوقع بمبيعات الشركة :


يعطي التوقع بالبيعات الشركة مؤشراً عن حجم المبيعات المتوقعة، والتي يمكن تحقيقها من منتج معين في ضوء خطة تسويقية معينة، ويعبر الطلب المتوقع على منتجات الشركة عن نصيبها من الطلب المتوقع الكلي للصناعة، ويتأثر هذا الطلب بجميع العوامل التي يتأثر بها السوق الكلي، بالإضافة إلى تأثيره بالمجهودات التسويقية للمنافسين، والنظرية الشائعة هي أن هناك علاقة طردية بين نصيب المشروع من السوق وكمية المجهودات التي يقوم بها .

أما المبيعات المحتملة (Sales Potential)؛ فهي ذلك الجزء من السوق المحتمل الكلي الذي يمكن أن يصل إليه المشروع . وفي الواقع فإن نفس الشكل النموذجي السابق، والذي يُبيّن العلاقة بين السوق المحتمل والمتوقع بالنسبة للصناعة بالكامل يمكن أن يوضح نفس هذه العلاقة بالنسبة للمشروع .

الفصل الأول : التوقع بالمبيعات وأهم طرقه

وقد لا يريد المشروع أن يصل بمبيعاته المتوقعة إلى المستوى المحتمل (أقصى حد متصور) ، وذلك لسبب أو آخر مثل عدم امتلاك الطاقة التوزيعية اللازمة ، أو تقادري ما قد يصاحب النمو من اعتقاد لدى الرأي العام من احتكار لمنتج معين .

ولتوضيح العلاقة بين المستويات الثلاثة، فيكون لدينا الشكل الموجي:



الشكل (١-٢) : العلاقة بين المستويات الأساسية للتوقع بالمبيعات .

المصدر: [م. عبيادات - ٠١]، ص ١٨٨.

٣- مطلبات التوقع بالمبيعات^(٤) :

عملياً، هناك مجموعة من المطلبات الواجب توافرها لإنجاز عملية التوقع بشكلها الصحيح وكما يلي :

- ١- الإهتمام بمختلف السجلات التاريخية الماضية المتعلقة بعملية التوقع بالمبيعات والإلام بها ،
- ٢- حصر العوامل التي أثرت على حجم المبيعات في السابق مثل الدخل والدعائية وجودة السلعة والسعر ،
- ٣- وضع تصور للنشاط المستقبلي للمبيعات ،
- ٤- مراجعة وتصحيح التوقعات والتقييم للتفذية العكسية في المستقبل ،
- ٥- تحديد الطلب التابع والطلب المستقل ، حيث أنه إذا كان الطلب على سلعة معينة مرتبط بالطلب على سلعة أخرى سُمي ذلك بالطلب التابع، لأن الطلب عليه يتوقف أو يعتمد على الطلب على السلعة الأخرى، ومثال ذلك أن الطلب على البنزين متوقف على الطلب على السيارات، والطلب على السلع الرأسمالية يتوقف على الطلب على السلع الاستهلاكية .
- ٦- الإهتمام والمعرفة الكاملة بالسلع المنافسة والبدائلة ومدى تطورها .
- ٧- مراعاة دورة حياة السلعة أثناء التوقع بالمبيعات، وفي أي مرحلة من مراحل الدورة تكون السلعة، أين تكون المبيعات في أوجها في مرحلة التشبع، حيث تمتاز هذه المرحلة بدرجة ثبات نسبي للمبيعات . وفي هذه المرحلة لا بد من الإستعانة بالخبراء من أجل خلق منافع جديدة للسلعة لزيادة الطلب عليها، وإلا ذهبت السلعة إلى مرحلة الإنحدار .

^(٤) من المرجع [م. عبيادات - ٠١] ، ص ١٨٩ .

الفصل الأول : التوقع بالبيعات وأهم طرقه

٨- معرفة مرونة الطلب، والتي يعبر عنها بأنها نسبة التغيير في المبيعات الناتجة عن تغير أحد العوامل التي تؤثر على الطلب، وهذه العوامل هي السعر والدخل والإعلانات، ولقياس ذلك نستخدم المعادلات التالية :

مرونة السعر = التغيير النسبي في الكمية المطلوبة / التغيير النسبي في السعر ،

مرونة الدخل = التغيير النسبي في الكمية المطلوبة / التغيير النسبي في الدخل ،

مرونة الإعلان = التغيير النسبي في الكمية المطلوبة / التغيير النسبي في حجم الإنفاق على الإعلان .

كما يعتبر الطلب مرنًا إذا كان عامل المرونة أكبر من واحد، أي أن نسبة التغيير في الكمية المطلوبة أكبر من نسبة التغيير في أي من العوامل الثلاثة السابق ذكرها .

ويكون الطلب غير مرن إذا كان عامل المرونة أقل من واحد، أي أن نسبة التغيير في الكمية المطلوبة أقل من نسبة التغيير في أي عامل مرونة يساوي (١)، وهذا معناه أن نسبة التغيير في الكمية المطلوبة تساوي نسبة التغيير في أي من العوامل الثلاثة السابقة .

وممّ سبق يتضح لنا أن على مدير التسويق فهم جميع هذه العناصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على زيادة أو نقصان الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى التي تؤثر في الطلب .

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه

المبحث الثاني : أساليب التوقع بالمبينات

تنقسم أساليب التوقع إلى قسمين متمايزين أولهما الأساليب النظمية (الموضوعية)، والأساليب الغير نظمية (الذاتية)^(١)، والشكل (١-٣) المولى يُبيّن التقسيمات الرئيسية والفرعية لأساليب التوقع .

١- الأساليب النظمية (الموضوعية) في التوقع^(٢) :

هي الأساليب المبنية على قاعدة صريحة، أو نظام واضح المعالم، بحيث يمكن شرح ما ينطوي عليه هذا النظام من خطوات، وبحيث يمكن لأي شخص قادر على فهم هذه الخطوات وتطبيقها بسهولة، ومن خصائص الأسلوب النظمي في التوقع أنه إذا طُبق على نفس المعلومات من جانبأشخاص مختلفين، فمن الممكن أن يتوصلا إلى نفس النتائج، وهذا هو المقصود بال الموضوعية، حيث لا يتتأثر التوقع - إذا ما طبق الأسلوب النظمي وبدقة - بأي اعتبارات ذاتية، وربما يكون ذلك التعريف للأساليب النظمية نظرياً، أو مثالياً أكثر من اللازم، إذ نادراً ما تأخذ هذه الأساليب طريقها إلى التطبيق في تجريد تام عن الإعتبارات الذاتية .

ويمكن وصف الأساليب النظمية أو الموضوعية للتوقعات أيضاً بأنها تلك الأساليب التي تعتمد على نماذج صريحة في إجراء التوقعات، وهذه النماذج يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما :

أ- النماذج السببية : وهي تحاول التعبير عن سلوك المتغير موضع الإهتمام إلى نظرية ما بشأن العوامل المحددة لقيم هذا المتغير، ومن أمثلة ذلك أننا عندما نريد التوقع بمتوسط استهلاك الأسر لأحد المنتجات الإستهلاكية المعينة في إحدى الدول، فإننا نبدأ بصياغة علاقة تفسيرية لهذا المتغير يدخل فيها عدد من المتغيرات التفسيرية، مثل متوسط دخل هذه الأسرة ... إلخ، ثم نحاول تقدير معلمات هذه العلاقة باستعمال أحد أساليب التقدير الإحصائي منها تحليل الإنحدار مثلاً.

ب- النماذج الغير سببية : وهذه النماذج معنية أساساً بالتوقع، ولا تتطرق إلى سلوك ذلك المتغير المراد التوقع به، ولا تحاول الكشف عن المتغيرات الأخرى التي تحدد قيمة، والتوقع بقيمة مستقبلية لمتغير ما يعتمد عملياً على القيم التاريخية لنفس المتغير، فإذا أردنا التوقع بقيمة متغير معين في سنة قادمة، فقد تعتبر هذه القيمة مساوية لقيمتها في السنة السابقة، أو لتوسيط قيمه في عدد من السنوات السابقة وقد توضع نماذج أكثر تعقيداً للسلسل الزمانية مثل نماذج بوكس- جنكنز (والتي سوف نتناولها بكثير من التفصيل في الفصل الثاني) .

^(١) هناك من يصنف أساليب التوقع حسب أجل التوقع وهي أساليب توقع لكل من الأجل القصير والمتوسط والطويل، ولكن نظراً لأن الأسلوب الواحد يمكن أن يستخدم التوقع لأكثر من أجل زمني، فقد فضلنا التقسيم حسب منهجهية التوقع، انظر [م.ف.السباعي-٠١]، ص ١٠٩.

كمأن هناك من يقسم طرق التوقع إلى قسمين وهما : الكمية والكيفية، فاما الأساليب الكمية فهي تلك التي تتخذ سلسلة المعطيات الماضية للظاهرة نقطة انطلاق لتوقع بقيمتها التقديرية اعتماداً على قواعد محددة، إلا أن المعطيات الكمية لا تتوفر على جميع الظواهر المدرسة أو قد تتوفر بشكل غير كاف أو مناسب، في هذه الحالة يلجأ الباحث إلى الإعتماد على استدلاله وتقديراته الشخصية عن الظاهرة قيد الدراسة وبهذا تكون بحد أسلوب من الأساليب التي تنتمي إلى المجموعة الذاتية ، انظر [س. رجال - ٨٤] ، ص ١٦ .

^(٢) من المرجع [م.ف.السباعي-٠١] ، ص ص ١٠٩-١١١ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

لكن هذه النماذج تشتراك جميعها في صفة أساسية، وهي أن التوقع بالقيم المستقبلية لتغير معين يتم استناداً إلى القيم التاريخية لهذا المتغير وحده، وسوف نوضح فيما يلي أهم أنواع النماذج التي تدرج تحت كلاً من النماذج السببية والغير سببية، وسوف نبدأ بالنماذج الغير سببية.

١-١-النماذج غبو سببية : نذكر منها نموذج الخطوة العشوائية (Random Walk Model) ؛ والذي يُعد من أبسط النماذج الغير سببية، ويطلق عليه أيضاً نموذج عدم التغير، فالقيمة التي تتوقع بها للمتغير y في الفترة الزمنية t تكون هي نفس القيمة y التي تحققت في الفترة السابقة (1— t) ، أي أن : $y_{t-1} = \hat{y}_t$ ، حيث أن \hat{y} تشير إلى التوقع بقيمة y ، ولكن من المعتاد إضافة متغير عشوائي على الطرف الأيمن لهذه العلاقة، وذلك مراعاة للصفة الإحتمالية للسلسل الزمنية، فإذا رمزاً للمتغير العشوائي بالرمز u ، فإن نموذج الخطوة العشوائية يأخذ الصيغة التالية :

$$(1) \quad y_t = y_{t-1} + u_t , \text{ وهو ما يعني أن التغير العشوائي في قيم } y \text{ ، يرجع إلى قيمة المركبة العشوائية } u .$$

يعني أن $y_t = y_{t-1} + u_t$ ، حيث أن المركبة العشوائية u ، تمثل الخطأ العشوائي ولها توزيع احتمالي بمتوسط يساوي $E(u_t) = 0$ ، وتبادر ثابت σ لكل t ، وأن المركبات العشوائية لفترات الزمنية u_s مستقلة عن بعضها البعض لجميع قيم $s \neq t$ ، وهي خصائص العنصر العشوائي في نموذج الإنحدار^(٤) ، أي أن :

$$\begin{cases} E(u_t u_s) = \sigma^2 , & \text{if } t = s \\ = 0 , & \text{if } t \neq s \end{cases}$$

وفي ظل هذه الخصائص لعنصر الخطأ العشوائي u ، فإن المعادلة (1) تمثل أفضل توقع بالقيمة المتوسطة للمتغير y في الفترة السابقة (1— t) ، ولعل أهم ميزة لهذا النموذج هي أنه لا يلزمنا سوى معرفة قيمة واحدة للمتغير y ، وهي قيمته في الفترة السابقة من أجل التوقع بقيمتة في فترة لاحقة .

١-٢-النماذج السببية : يمكن للنماذج السببية التي تفسر الظاهرة موضع الإهتمام من زاوية التوقع لأن تأخذ أشكالاً متعددة، وفق منهجية تصميم وحل النموذج، وفيما يلي بعض أنواع النماذج الشائعة المستخدمة في التوقع :

١-٢-١-نماذج القباب الإقتصادي^(٢) (النماذج الأيكونومترية) (ECONOMETRIC MODELS) :

يمر أي بحث قياسي بأربعة مراحل يمكن إيجازها فيما يلي^(٣) :

- **المراحل الأولى :** تعيين النموذج (Specification of the model) ، أو مرحلة وضع الفروض ،
- **المراحل الثانية :** تقدير معلمات النموذج (Estimation of the model) ، أو مرحلة اختبار الفروض ،
- **المراحل الثالثة :** تقدير المعلمات المقدرة للنموذج (Evaluation of the Estimation) ،

^(٤) يطلق عليه في سياق السلسل الزمنية (WN) White noise ، وسوف يأتي التطرق إليه في الفصل الثاني .


^(٢) إن الترجمة العربية الدارجة للمصطلح "Econometrics" هي الاقتصاد القياسي تعتبر غير موفقة، ذلك أن المحتوى اللغوي للتقياس الاقتصادي يعني استخدام القياسات في مجال الاقتصاد، بينما يدل المحتوى اللغوي للإقتصاد القياسي بالعربية "الإقتصاد في العمليات القياسية" ، وعليه فإن التسمية الصحيحة يجب أن تكون "القياس الاقتصادي" وليس غيرها .

^(٣) من المرجع [ع.ق. عطية-٠٢] ، ص ١٤ .

• المرحلة الرابعة : اختبار مقدرة النموذج على التوقع

(Evaluation of the forecasting validity of the model)

وفيما يلي شكل توضيحي يوضح خطوات بناء نموذج قياس إقتصادي :




شكل (٤-٤) : خطوات المقاربة التكرارية من أجل بناء النموذج القياسي

المصدر: [G.M.JENKINS-٩٤]، ص ١٧.

والسمة الرئيسية لهذا النوع من التوقع هي أنها تحاول قياس العلاقات بين متغيرات نظام معين من واقع البيانات التاريخية المأخوذة عن السلوك الفعلي للنظام، وذلك باستخدام طرق إحصائية غالباً ما يفترض فيها توزيعات احتمالية نمطية لبعض متغيرات النظام محل البحث، أو على الأقل للذبذبات التي تميز علاقات النظام (أي عناصر الخطأ في العدالات)، وهي افتراضات غالباً ما يصعب تحقيقها عملياً بشكل حرفى ، كما يصعب التتحقق من صحتها في بعض الحالات، أضف إلى ذلك أن القياس السليم لعلاقات النموذج، أي تقدير معلمات العلاقات المكونة للنموذج عادة ما يتطلب توفر شروط متشددة في البيانات كاستقلال المتغيرات التفسيرية عن بعضها البعض، وعدم الترابط بينها وبين عنصر الخطأ في العدالات، وعدم الترابط للقيم المختلفة لعنصر الخطأ ذاته ، وخلو المتغيرات التفسيرية من أخطاء المشاهدة والقياس، (وتلك هي شروط نموذج الإنحدار الخطى)، فضلاً عن ذلك فإن التوصل إلى قياس سليم للمعلمات في ظل عدم تحقق بعض هذه الإفتراضات غالباً ما يستلزم توفير أكبر قدر ممكن من البيانات من جهة، أو قد يقتضي الأمر الأخذ بطرق تقدير معقدة من جهة أخرى، وأهم من هذا وذلك، أنه لا توجد حتى الآن طريقة عامة معروفة للإقتصاديين القياسيين لاتباعها عندما لا يتحقق في نفس الوقت أكثر من شرط من الشروط المطلوبة للتطبيق السليم لنموذج الإنحدار الخطى.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

وغالباً ما يتم التركيز على تلافي النتائج المترتبة على عدم تحقق ما يمكن أن يعتبره الباحث شرطاً أكثر أهمية من غيره، مع تجاهل للنتائج المترتبة على عدم تحقق الشروط الأخرى^(١).
وفيما يلي الشكل (١-٣) الذي يبين تقسيم نماذج القياس الاقتصادي السالفة الذكر .



شكل (١-٥): قسمي نماذج القياس الاقتصادي

المصدر: من المرجع [م.حشمان-٠٢]، ص ٦.

١-٢-٢- نماذج المدخلات والخرجات^(٢) : يعتبر أسلوب المدخلات-المخرجات بطبعته أسلوب توقع، ممّ يلاحظ انتشاره بشكل واسع في جميع الدول الرأسمالية والإشتراكية، وفي هذا السياق تُستخدم مصفوفة المعاملات الفنية كأداة رئيسية في تحديد الصورة التي سيكون عليها الاقتصاد الوطني في المستقبل، والتوقع بما سيحدث من أحداث اقتصادية في المستقبل، وذلك عن طريق تحليل وتشخيص كل العوامل التي تؤثر على أي حدث اقتصادي، أو أي إجراء يُتخذ على صعيد السياسة الاقتصادية^(٣)، والتوقع في النتائج المتوقعة التي تحصل في الإنتاج الوطني والقطاعي في حال تنفيذ الأهداف المرسومة في الخطة، واستيضاح إمكان تحقيقها وتقديم حلول بديلة عنها في حال ظهور صعوبات أو عوائق أو اختناقات في تحقيقها. ولكن السؤال المطروح هنا كيف تستعمل هذه المعاملات الفنية في التحليل الاقتصادي في المستقبل، رغم أن هذه المعاملات تعبر عن فترة منقضية؟ . هذه المشكلة تسمى بمتباين المعاملات الفنية، ولكن في الحقيقة الثبات ليس من فترة زمنية لأخرى، وإنما تباين العلاقات الفنية للإنتاج . وفيما يلي إحدى جداول المدخلات- المخرجات المسماة بجدول ليونتييف البسيط^(٤) .

^(١) للمزيد من التفصيل،أنظر المرجع [م.ف.السباعي-٠٢] ، ص ص ١١٤-١١٦ .

^(٢) Input - Output models

^(٣) أنظر المرجع [م.الحمصي-٧٩] ، ص ١٢١ .

^(٤) فاسيلي ليونتييف " Wassily Leontief " ولد في روسيا سنة ١٩٠٦ ، عمل أستاذاً في جامعة هارفارد في الو.أ. في سنة ١٩٤١ . نشر مقالاً حول طريقة استخدام البيانات التربوية في تطبيق نظرية التوازن العام في كتابه الشهير "هيكل الاقتصاد الأمريكي" "The structure of American Economy" ، ومن ثم ظهرت جداول المدخلات و المخرجات في الواقع العملي ، و لقاء هذا العمل نال جائزة نوبل في الاقتصاد عام ١٩٧٣ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

جدول (1-2) : جدول المدخلات والمخرجات

المدخلات (j) المخرجات (i)	1	2	3	...	j	...	n	الطلب النهائي y	إجمالي المخرجات
1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	...	X_{1j}	...	X_{1n}	y_1	X_1
2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	...	X_{2j}	...	X_{2n}	y_2	X_2
3	X_{31}	X_{32}	X_{33}	...	X_{3j}	...	X_{3n}	y_3	X_3
:	⋮							⋮	⋮
n	X_{i1}	X_{i2}	X_{i3}	...	X_{ij}	...	X_{in}		
:	⋮								
n	X_{n1}	X_{n2}	X_{n3}	...	X_{ij}	...	X_{nn}	y_n	X_n
القيمة المضافة	V_1	V_2	V_3	...			V_n	$\sum y$	
إجمالي المدخلات	X_1	X_2	X_3	...			X_n		$\sum X_j = \sum X_i$

المصدر : [المصي-79]. ص 121.

حيث تقوم الفكرة الأساسية لهذا الجدول تتجلى واضحة في دراسة تشابك العلاقات الإقتصادية بين مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني، لذا فإن الدراسات التطبيقية المتعلقة بالترابط بين المتغيرات الإقتصادية بدأ الاستفادة منها منذ إنشاء ف. ليونتييف لنموذج المتعلق بالمدخلات والمخرجات الذي بدأ عمله عام 1931 عن الإقتصاد الأمريكي، الذي يقوم عن التحليل الكمي للعلاقات القائمة بين مختلف القطاعات، وهذا ما يساعد على إعطاء صورة رقمية مفصلة للحالة التي يتواجد عليها الإقتصاد الوطني، وإظهار العلاقات التي تربط جميع قطاعاته، وإمكانية دراسة وتحليل التطورات المستقبلية في الإقتصاد وتعتبر هذه الفكرة أحد أساسيات التحليل الإقتصادي في عدة ميادين سواءً منها ما تعلق بالمستوى الكلي أو الجزئي ويتبين هذا عند وضع الخطط الإنتاجية، حيث يحتاج المخطط إلى معلومات مفصلة عن تدفقات السلع والخدمات بين مختلف الأنشطة الإقتصادية، وذلك لتفادي الإختناقات في توفير مستلزمات الإنتاج والموارد المتاحة .

وكأي نموذج، فإن جدول المدخلات - المخرجات لـ ف.ليونتييف يقوم على جملة من الفرضيات ذكر وهي : تجانس المنتجات كل قطاع، تبات نسب مزج عوامل الإنتاج، استخدام أسلوب فني واحد، تبات الأسعار النسبية، فكرة التشابك القطاعي، فإذا نظرنا إلى الجدول عموديا نجد البيانات توضح مدخلات أو مشتريات كل قطاع (j) من القطاعات الإنتاجية الأخرى على منتجه النهائي، بالإضافة إلى مستلزمات أو مدخلات X_{11} من إنتاج نفس القطاع، ونستخدم ما مقداره X_{21} من منتجات القطاع الثاني، و X_{31} من منتجات القطاع الثالث، وهكذا حتى القطاع الأخير، والرمز V_1 يمثل القيمة المضافة، أما الرمز X_1 يعبر عن مجموع إجمالي المدخلات، أو قيمة الإنتاج الكلي في القطاع الأول .

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه

﴿ أما إذا نظرنا أفقيا للجدول، نلاحظ أن كل سطر من الأسطر الموجودة في الجدول يُشير إلى حجم مبيعات كل قطاع إلى القطاعات الأخرى بما فيها القطاع نفسه، مثلاً القطاع الأول يبيع للقطاع نفسه ما مقداره X_{11} ، ويبيع للقطاع الثاني ما مقداره X_{12} ، وللقطاع الثالث ما مقداره X_{13} ، وهكذا حتى القطاع الأخير، أما الجزء المتبقى يخصص للإستهلاك النهائي ومقداره y_1 .

أما X_1 فإنها تُعبّر عن إجمالي مخرجات القطاع الأول، وهو عبارة عن إجمالي إنتاج القطاع الأول، وعلى نفس المنوال يتم توضيح البيانات وال العلاقات الاقتصادية للقطاعات الأخرى .

١-٢-٣-التنبؤ باستخدام طريقة الخبراء^(٤) : إن التنبؤ يعتمد على تفعيل خبرة الإنسان في موضوع ما، وأشهر طريقة في هذا المجال هي طريقة دلفي، حيث تعتمد هذه الطريقة على توجيهه أسئلة محددة إلى مجموعة من الخبراء مثل: هل ستترتفع أسعار المحروقات خلال السنة المقبلة؟، وغيرها كثير من الأسئلة الممكنة، وتتميز هذه الطريقة عن بقية الطرق التي تعتمد على تقديرات الخبراء بأنها تعتمد على السرية، كما تتم عادة على عدة جولات، كمان أبسط الطرق لاستخدام تقديرات الخبراء في التنبؤ هي إعطاؤهم مجموعة من البديل الممكنة لظاهرة معينة، ويطلب منهم ترتيبها حسب أولوية حدوثها مستقبلاً، ويراعى أن تتم الإجابة في سرية كما ذكرنا آنفاً .

١-٢-٣-١- خطوات استخدام تقديرات الخبراء في التنبؤ :

يتم استخدام هذه الطريقة عن طريق المرور بالخطوات التالية :

أ- تحديد موضوع التنبؤ بدقة وإعادة البديل الممكنة ،

ب- تحديد مجموعة الخبراء ،

ج- الحصول على تقديرات الخبراء ،

د- تحليل النتائج المتحصل عليها من تقديرات الخبراء .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخبرير (Expert)، وأي شخص متخصص وله مهارة في مجال بحثي معين و يتميز بارتفاع مهاراته وتجدها في التنبؤات، قائمة الخبراء يمكن أن تشمل مثلاً: الباحثون في مجال بحوث التسويق، مدورو المنظمات، المستشارون، رجال الغرف الصناعية و التجارية، محرر روا المجلات و الصحف التجارية، بعض الموظفين في الأجهزة الحكومية، وطبقاً لهذه الطريقة فإن الخبرير يمكن أن يقدم عدة أشكال للتنبؤ بالمبينات كان يقوم بتحديد رقم معين للمبيعات المتوقعة (١٠٠٠٠ وحدة في السنة مثلاً)، أو تحديد مدى معين يمكن أن يتحقق أو يقع رقم المبيعات خلاله كان يقال أن المبيعات ستتراوح بين ١٠٠٠٠ و ٣٠٠٠٠ وحدة خلال ستة أشهر الأولى من السنة، أو وضع احتمال معين لتحقيق المبيعات كان يقال أن احتمال تحقيق مبيعات ٢٠٠٠٠-٣٠٠٠٠ وحدة هو ٤٥% وأن تحقيق ٤٠٠٠٠-٥٠٠٠٠ وحدة له احتمال ٣٠% وأن تحقيق ٩٠٠٠٠ وحدة له احتمال ٢٥% .

^(٤) من المرجع [ع. شرابي-٥٠]، ص ١٥٧.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

و في ما يلي نحاول إجراء مقارنة بين ثلاثة أساليب منها^(١) :

رأي الخبراء	أسلوب DELPHI	رأي رجال البيع	الأسلوب
من ضعيف إلى جيد	من مقبول إلى جيد جدا	جيد	• الدقة في التنبؤ: لأن الأجل القصير(٦ أشهر).
ضعيف إلى جيد	مقبول إلى جيد جدا	مقبول إلى جيد	لأن الأجل المتوسط (سنة).
ضعيف إلى مقبول	مقبول إلى جيد جدا	ضعيف	لأن الأجل الطويل.
التنبؤ بالبيانات السنوية في الأجل الطويل + التنبؤ بها من الربح + مستقبل المنتجات الجديدة	التنبؤ ببيانات السلعة + هامش الربح خلال سنة أو أكثر	التنبؤ ببيانات السلعة خلال السنة	• مجالات الاستخدام
حسب طلب كل خبير	البيانات المجمعة مع وجود منسق لإرسال و استقبال الآراء	تارikhية من سجلات العملاء	• البيانات المطلوبة
٢ / ١ أسبوع	٣-٢ أسابيع	٣-٢ أسابيع	• مدة التنبؤ

المصدر : [ع.س.أبو قحـف - ٩٠]، ص ٢٩٤.

^(١) أنظر المرجع [ع.س.أبو قحـف - ٩٠] ، ص ص ٢٩٣ - ٢٩٤ .

المبحث الثالث : مركبات السلسلة الزمنية وطرق كشفها

تعتبر دراسة الظواهر واتجاهاتها، والتحكم في مساراتها من بين أسباب نجاح المؤسسات الإقتصادية التي تعتمد الطرق العلمية في تسييرها حيث تحتاج كل مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطاتها إلى معرفة وتحليل الظواهر المحيطة بها، والعوامل المؤثرة فيها، والتوقع بقيمتها في المستقبل، ولتحديد وبلغ ذلك يجب دراسة وتحليل معطيات الفترات السابقة لهذه الظواهر قصد تحديد مساراتها واتجاهها العام، بشرط أن تكون كل معطية من هذه المعطيات مرتبطة بفترة زمنية، أو بتاريخ معين (سنة، شهر، أسبوع ١ ، جانفي، ٣: ديسمبر، ...إلخ)^(٤).

١- مركبات السلسلة الزمنية :

على العكس من الاقتصاد القياسي التقليدي، فإن الهدف من تحليل السلسلة الزمنية ليس الربط بين المتغيرات بعضها بعض، وإنما الإهتمام بديناميكية هذا التغيير أو المتغيرات^(٢)، هذه الأخيرة مهمة لسببين وهما : تطور الاقتصاد القياسي أظهر أننا لا نستطيع ربط إلا المتغيرات التي تتميز بخصائص متشابهة أو متماثلة، بوجه خاص نفس نفس خصائص الاستقرارية أو عدم الاستقرارية، الخصائص الرياضية للنماذج تسمح بتقدير الروابط التي تربط بين المتغيرات والعلاقات الديناميكية بين بعضها البعض .

١-١- تعريف السلسلة الزمنية : يمكن تعريف السلسلة الزمنية كما يلي :

أ- **تعريف أول** ^(٣) : "السلسلة الزمنية عبارة عن مجموعة متتالية من القراءات x_1, x_2, x_3, \dots تؤخذ عادة على فترات زمنية متساوية إحدى الظواهر".

ب- **تعريف ثانٍ** ^(٤) : تُعرف بصورة عامة بأنها عبارة عن مشاهدات عن قيم متغير اقتصادي معين على امتداد فترة زمنية معينة، أو بتعبير آخر عبارة عن تطور متغير اقتصادي بالزمن، ويعتبر الزمن (t) من وجهة نظر القياس الإقتصادي بمثابة متغير مستقل عند تقدير الإتجah العام لتطور المتغيرات الإقتصادية خلال فترة زمنية معينة، ويمثل الزمن في هذه الحالة المحصلة النهائية لتأثير نمو جميع العوامل ذات التأثير في المتغير التابع ول يكن (y , x).

وبصفة عامة فإن السلسلة الزمنية عبارة عن مجموعة من المشاهدات مرتبة على أساس كمي يعبر عن قيم متغير (اقتصادي أو اجتماعي) معين على امتداد فترات زمنية متساوية ومتتالية تشكل أساس السلسلة الزمنية وتلعب دور المتغير المستقل، في حين تلعب قيم الظاهرة المدروسة دور المتغير التابع .

وفيما يلي جدول يمثل سلسلتان زمنيتان تمثلان تطورات الناتج المحلي الإجمالي (PIB)، وعدد السكاني في الجزائر كما يلي :

^(٤) انظر المرجع [ج. جلاطـ ٩٩]، ص ١٦٧.

^(٢) من المرجع [G.CHEVEILLON-٠٤]، [ج. ٩]

^(٣) انظر المرجع [س. رجالـ ٨٤]، ص ٣٧ .

^(٤) من المرجع [ع. شريفـ ٨١]، [ج. ٤١]، ص ٤١ .

الفصل الأول : التوقع بالبيعات وأهم طرقه

جدول (١-٣): تطورات PIB وعدد السكان في الجزائر المقابل لكل سنة من السنوات 1963 حتى 2002

السنة	PIB (بملايين الدنانير) (بالآلاف)	عدد السكان (بالآلاف)
1965	15 240 .0	11 467
1966	14 490 .0	11 814
1967	16 123 .0	12 178
1968	18 740 .0	12 539
1969	21 044 .8	12 912
1970	24 072 .3	13 309
1971	24 922 .8	13 739
1972	30 413 .2	14 171
1973	34 531 .1	14 649
1974	55 560 .9	15 164
1975	61 573 .9	15 768
1976	74 051 .1	16 450
1977	87 240 .5	17 058
1978	104 831 .6	17 600
1979	128 222 .6	18 120
1980	162 507 .2	18 666
1981	191 468 .5	19 262
1982	207 551 .9	19 883
1983	233 752 .1	20 522
1984	263 855 .9	21 185
1985	291 597 .2	21 863
1986	296 551 .4	22 512
1987	312 706 .1	23 139
1988	347 716 .9	23 783
1989	422 043 .0	24 409
1990	554 388 .1	25 022
1991	862 132 .8	25 643
1992	1 074 695 .8	26 271
1993	1 189 721 .9	26 894
1994	1 487 403 .7	27 496
1995	2 004 994 .7	28 060
1996	2 570 028 .9	28 566
1997	2 780 168 .7	29 045
1998	2 809 999 .8	29 507
1999	3 212 543 .5	29 965
2000	4 087 675 .3	30 416
2001	4 241 800 .0	30 879
2002	4 455 300 .0	31 357


المصدر: [ONS-03]، ص 99.

حيث كل قيمة للمؤشر في السلسلة الزمنية يسمى بمستوى السلسلة الزمنية، وإلى جانب مستوى السلسلة الزمنية، هناك الفترة الزمنية المقابلة لكل مستوى، وفي مثالنا كل مستوى من مستويات في السلسلة الزمنية الأولى يُبين تطورات الناتج الداخلي الخام (PIB) من سنوات 1965 حتى 2002، وكذلك كل مستوى من مستويات السلسلة الزمنية الثانية يُبين تطورات عدد السكان المقابل لكل سنة من السنوات.


فالسلسل الزمنية إذن، تعني تتبع الملاحظات المتواقة مع نفس التغير الممثل له، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي مثلاً هناك (الناتج الوطني الخام لبلد معين (PIB)، التضخم، الصادرات، الواردات، ...)، على مستوى الاقتصاد الجزئي (مبيعات إحدى الشركات، مداخيل الأفراد، ...)، في الجانب المالي (البورصات: CAC 40، SP'500، ...، أسعار الأسهم الشفاعة والبيع، تطورات أسعار الأسهم، ...)، أحوال الطقس (درجات الحرارة الشهرية، كمية التساقط السنوي من

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

الأمطار ...)، الجانب السياسي (عدد المُنتخبين، الأصوات المُحصل عليها لصالح مرشح معين ،...)، الجانب الديموغرافي (متوسط الطول للسكان، أعمارهم ،...)، أي كل ما هو مُرقم وله عدة متغيرات بمرور الوقت .



الشكل (6-1) الناتج الداخلي الخام "PIB" للجزائر من سنة 1965 حتى سنة 2002 (و: مليون دج)
المصدر: تم الإعداد من طرفنا اعتماداً على Microsoft Excel 2003



الشكل (1-7) : تطور عدد السكان من سنة 1963 1963 حتى سنة 2002 (و: الآلاف نسمة)

المصدر: تم الإعداد من طرفنا اعتماداً على Microsoft Excel 2003

أ- نموذج الارتباط الذاتي من الدرجة 1 : $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$: AR(1)

حيث يتأثر استقرار النموذج بالتغير الحاصل في القيم المختلفة التي تأخذها α ، حيث عندما تكون $|\alpha| < 1$ ، فإن النموذج

مستقر، وعندما تكون $|\alpha| = 1$ ، فإن النموذج غير مستقر، كما نلاحظ ذلك في الشكل (1-8) بالنموذج السابق في حالة كون

$$\alpha > 1$$

ب- السلسل ذات المتغيرات المتعددة : $y_t = A y_{t-1} + \varepsilon_t$ ، حيث :

ج- نموذج الإنحدار الذاتي الشعاعية، من الدرجة الأولى VAR(1)

$$\begin{bmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{1t-1} \\ y_{2t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix} \sim WN\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}\right)$$


الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

د- نموذج الإنحدار الذاتي ذي التأخر الموزع (Autoregressive Distributed Lags , ADL)

إذا كانت $\alpha_{12} \neq 0$ هذا النموذج يتبع علاقة سببية بين y_{t-1} و $y_{1,t}$ ، كما يلي :

$$y_{1,t} = \alpha_{11}y_{1,t-1} + \alpha_{12}y_{2,t-1} + \varepsilon_{1,t}, \quad \varepsilon_{1,t} \sim WN(0, \sigma_1^2)$$

والشكل المولالي تمثيل لسلسلة زمنية بواسطة النموذج $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$ ، $AR(1)$ ، بحيث تأخذ α قيمًا مختلفة . ويكون النموذج مستقرًا في حالة $|\alpha| < 1$ ، أما في حالة $|\alpha| = 1$ فيكون غير مستقرًا، كما نلاحظ في حالة السلسلة الزمنية في حالة $|\alpha| > 1$.



الشكل ١-٨: سلسلة زمنية ممثلة بواسطة النموذج $AR(1)$

المصدر: [٤] G.CHEVEILLON

كما ينبغي التذكير هنا إلى أنه عند بناء السلسلة الزمنية، وقبل استخدامها في التحليل أو التوقع لا بد من التأكد من أن مستوياتها قابلة للمقارنة فيما بينها، وهو شرط أساس لصحة أي تحليل، وأي تقدير أو توقع، وفيما يلي الشروط الازمة لكي تكون مستويات السلسلة الزمنية قابلة للمقارنة فيما بينها ^(٢):

- I - أن تخُص مستويات السلسلة الزمنية فترات زمنية متساوية، فمثلاً لا يجوز أن تُعبر بعض مستويات السلسلة الزمنية عن عدد المواليد خلال كل شهر وبعض المستويات الأخرى تُعبر عن المواليد خلال كل سنة، فالمقارنة بين المستويات هنا غير ممكنة .

^(١) هي اختصار لـ **Auto Regressive** ، وسوف نتناول هذا النموذج بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه المذكرة .

^(٢) من المرجع [ع.شرايبي-٥٠]، ص ٢٢ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

٢- أن تكون جميع مستويات السلسلة الزمنية خاصة بمكان معين، سواءً كان إقليماً أو ولاية أو مؤسسة، فلا يجوز أن تُعبر بعض المستويات عن مؤشر خاص بمجال معين ومستويات أخرى خاصة بمجال أوسع مثلاً، وتظهر هذه المشكلة خاصة عند تغيير حدود الأقاليم والولايات، أو عند تجزئة المؤسسات الكبيرة إلى مؤسسات أصغر أو العكس.

٣- أن تكون وحدة القياس لجميع مستويات السلسلة الزمنية موحدةً.

٤- التعبير عن مستويات السلسلة الزمنية القيمية بالأسعار الثابتة، لأن الأسعار الجارية تُخفي أثر ارتفاع الأسعار وتجعل المقارنة غير موضوعية.

٥- أن تكون طريقة قياس جميع مستويات السلسلة الزمنية موحدةً.

كما يجب الإشارة إلى أن السلسلة الزمنية عادة ما لا تعطى جاهزة، وقابلة للتحليل مباشرة حيث يتطلب الأمر في أغلب الأحيان إجراء بعض التعديلات لجعل مستوياتها قابلة للمقارنة وفقاً للشروط المذكورة أعلاه، وعموماً تصاغ هذه التعديلات في الجدول المواري :

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

الجدول (٤-١): طرق تعديل السلسلة الزمنية

النحوية	دور التعديل	السلسلة المعدلة	السلسلة الخام	التعديل (تحويل T) (ترشيم F)
حذاري من القيم المعدومة والسلبية	سحق القيم العالية ، خفض سلم التمثيل البياني ، تخطية التمثيل	$z_t = \log y_t$	y_t	اللوغاريتم : (T)
فقدان قيم من البداية ومن النهاية	حذف التقلبات الموسمية المترهلة	$z_t^* = \frac{y_t + y_{t-1} + \dots + y_{t-m+1}}{m}$	y_t	المتوسط المتحرك ذو طول (m) :
فقدان قيمة من السلسلة	سكون السلسلة في وحدة الزمن	$\nabla y_t = y_t - y_{t-1}$	y_t	الفروق الأولية : (F)
فقدان قيمتين من السلسلة	سكون السلسلة في وحدة الزمن لكنها تأخذ شكل أسي	$\nabla^2 y_t = \nabla(\nabla y_t)$	y_t	الفروق الثنائية : (F)
فقدان قيمة من السلسلة	نمو السلسلة في وحدة الزمن بمعدل ثابت (متوسط حسابي وانحراف معياري ثابتين)	$z_t = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$	y_t	الفروق النسبية : (F)

المصدر: مقتبس بتصرف من المرجع [J.C.USINIER-82]، ص 227.

كما يمكن كتابة Z_t^* بالشكل $Z_t^* = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} y_{t-k}$ وكلما كانت m كبيرة نسبياً، فإن هذا يسمح بإلغاء أحسن للتغيرات العارضة، لكن عموماً ما تنتهي m حسب دورية المعطيات، فإذا كانت المعطيات شهرية والتغيرات الفصلية ضعيفة فإن طول المتوسط المتحرك $3 = m$ ، أو $4 = m$ ، وإذا حدث أن كانت التغيرات الفصلية قوية الظهور سنوياً فإن $12 = m$ ^(٤)، كما يمكن استعمال عدد من هذه التعديلات واحد تلو الآخر للحصول على سلسلة مصقوله .


٢- مركبات السلسلة الزمنية :

تتكون السلسلة الزمنية من مجموعة من المركبات وهي، مركبة الدورات الاقتصادية، مركبة الموسمية والمركبة العشوائية، وتعتبر هذه المركبات كمتغيرات تطرأ على البيانات ولذلك يجب تحليلها ومعرفة مدى تأثيرها .

^(٤) من المرجع [J.FOURASTIE-88]، ص ص ١١٤ - ١١٥.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

2-1- مركبة الإتجاه العام ($T(t)$) : إن هذه المركبة كما يدل عليها اسمها ، تعبّر عن اتجاه عام للظاهرة المدروسة في المدى الطويل ، سواء بالزيادة أو النقصان⁽¹⁾. مثلاً عدد الطلبة المسجلين في الجامعة الجزائرية سنوياً، تطور الدخل الوطني الجزائري من 1969 حتى 1989 ، ويُمثّل الإتجاه العام للسلسلة بميل موجب أو سالب ، والشكل(1-9) المولى يوضح مركبة الإتجاه العام .



شكل(1-9): تطور الدخل الوطني الجزائري من 1969 حتى 1989

المصدر: من المرجع [م. حشمان-02]. ص 15.


2-2- مركبة الدورات الاقتصادية ($C(t)$) : وهي متغيرة منتظمة ذات طول غير معروف بدقة ، وتظهر هذه المركبة في المدى البعيد ، وتشمل حالتين : حالة الركود الاقتصادي وحالة الرخاء الاقتصادي ، هذين الحالتين تتعاقبان بشيء من الإنظام في فترات متباعدة ، وتأثيران في الطلب على البيانات ، ذلك أنه في حالة الركود يكون الطلب على البيانات منخفض وفي فترة الرخاء يحدث العكس ، ولكن لكون أن التوقع عموماً يهتم بال مدى القريب والمتوسط فإن مركبة الدورات نهمل دراستها.

2-3- المركبة الموسمية ($S(t)$) : وهي التغيرات المتشابهة في مسار سلوكها ، والتي تظهر في فترات زمنية منتظمة ، ومحددة بصفة متعاقبة ، وتفيد هذه المركبة في تحديد قيمة الطلب على السلع والخدمات التي تتاثر بعامل الموسمية (الفصلية) كالأعياد والعطل والمناسبات...إلخ .

2-4- المركبة العشوائية ($E(t)$) : وهي المركبة التي تصف جميع العوامل والمتغيرات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار أو تلك التي لا يمكن قياسها والتوقع بحدوثها ، تكونها مفاجئة وعشوائية الحدوث مثل الحروب والفيضانات والزلزال وبقية العوامل المؤثرة في طلب السلع والخدمات بشكل غير متوقع .

⁽¹⁾ من المرجع [ج. جيلالي-02]، ص 167.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه



شكل (١٠-١) : مركبات السلسلة الزمنية

المصدر : مقتبس بتصرف من المراجع [م.أبو صالح - ٨٣]، ص ٢٧٦.

٣- الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية :

بالنظر إلى بعض الأشكال الممثلة لبعض السلسلات الزمنية^(١)، فإنه من الصعب في بعض الحالات كشف مركبة أو مركبات السلسلة الزمنية محل الدراسة، ولهذا فهناك بعض الطرق المساعدة في الكشف، وهي :

٣-١ - عن طريق تحليل المعلومات بيانيًا (Plot) : وذلك عن طريق تحليل الظروف التي تولّدت عنها هذه السلسلة الزمنية، فإذا كان هذا المحيط مستقرًّا تكون هذه السلسلة كذلك، والعكس، فيتمثل الإتجاه العام مثلاً في تلك المركبة التي تدفع بالمنحنى نحو الزيادة، أي إذا كان الميل موجباً، أو إلى الأسفل إذا كان الميل سالباً، بينما تتعكس المركبة الدورية في الشكل البياني على شكل قمم (peaks)، أو انخفاضات (Troughs) بشكل منتظم، بينما المركبة العشوائية تتمثل في عدم تركها المركبات المنتظمة تكون كذلك وبيانياً دائمًا .

٣-٢-عن طريق الإختبارات الإحصائية (Statistical Tests) : في كثير من الحالات يُلْجأ إلى هذه الإختبارات لأن الطريقة السالفة الذكر غير كافية لكشف مركبات السلسلة الزمنية .

٣-٢-١- الكشف عن مركبة الإتجاه العام (T_t) : يمكن تقسيمها إلى :

٣-٢-١-١- الإختبارات الحرجة (Non Parametric Tests) : ومعنى حرّتها لا تخضع لأي توزيع إحصائي، فهي لا تتطلب أي فرضية حول التوزيع الإحتمالي للأخطاء (Errors). ولهذا ورغم سهولة تكوينها وحسابها، فإنه يُعاب عليها في كشف المركبات المعنية، وهناك مجموعة من الإختبارات نذكر منها^(٢) :

٣-٢-١-١-١- اختبار نقطة الإنعطاف (Turning points) :

لا يهتم هذا الإختبار على عكس تسميته ببنقطة الإنعطاف بحد ذاتها بقدر ما يهتم بعدد مرات الصعود و النزول (Ups and Downs) للمنحنى، وبتعبير آخر عدد مرات تغير الإشارة من موجب إلى سالب أو العكس، من خلال الفروقات من

^(١) من المراجع [م. حشمان-٢٠٢]، ص ١٥.

^(٢) الصفحة ١٨ من المراجع الأخير .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

الدرجة الأولى Δy أين : $y_t - y_{t-1} = \Delta y$ ، حيث أن y تمثل السلسلة الزمنية محل الإختبار مرتبة ترتيباً زمنياً .
أما شكل الإختبار فيكون كالتالي : H_0 : السلسلة عشوائية / لا يوجد اتجاه عام ،
 H_1 : السلسلة بها اتجاه عام .

ولتكوين الإختبار يلزمنا حساب الفروقات من الدرجة الأولى للسلسلة المعنية وإعطاء إشارة موجبة للفروقات الموجبة، وسالبة للسلالبة، ومنه فرمز u ، وهو عدد المرات التي تتغير فيها Δy كمان الإختبار يُستعمل لما يكون عدد المشاهدات أكبر من 10 .

القرار: رفض H_0 إذا كان : $Z_{\frac{\alpha}{2}} > |z|$ ، حيث أنه مُعطى بالعلاقة التالية :

$$\sigma_u = \sqrt{\frac{16T-29}{90}} , \mu_u = \frac{2(T-2)}{3}$$

1-1-2-3-إختبار الإشارة (Sign Tests)

على غرار الإختبار السابق، فإن هذا الإختبار يعتمد على إشارات الفروقات من الدرجة الأولى موجبة وسالبة، كما يفترض هذا الإختبار التوزيع العشوائي للمعطيات .

شكل الإختبار : H_0 : السلسلة عشوائية / لا يوجد اتجاه عام ،
 H_1 : السلسلة بها اتجاه عام .

ولتكوين الإختبار : \leftarrow الرمز v يعني عدد الفروقات الموجبة، بينما n تمثل عدد الفروقات غير الصفرية .
 \leftarrow يُستعمل هذا الإختبار لما ($n > 20$) .

القرار: نرفض الفرض H_0 إذا كان : $Z_{\frac{\alpha}{2}} > |z|$ ، حيث Z معطى بالعلاقة التالية :

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{n}{4}} , \mu_v = \frac{n}{2}$$

1-1-2-3-إختبار دانيال (Daniel's Tests)

يعتبر هذا الأخير من أقوى المعايير السابقة، وهو يُستعين بمعامل الإرتباط لسبيرمان⁽⁴⁾، يعتمد هذا المعامل قياس الإرتباط الخطي بين ترتيبين، الرتبوي (تصاعدي مثل R_t) والزمني t ، أي بتعبير رياضي ($R_t = f(t)$ ، $t = 1, 2, T$) ، حيث أن معامل سبيرمان يُعطى بالعلاقة التالية :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{t=1}^T d_t^2}{T(T^2 - 1)}$$

حيث : d_t يمثل مجموع مربعات الفرق بين الترتيب التصاعدي الزمني أي : $(R_t - t)^2$

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه

ونعلم أن: $+1 \leq r_s \leq -1$ ، ومن ثم فإن صيغة الإختبار تكون كالتالي: H_0 : السلسلة عشوائية / لا يوجد اتجاه عام ، H_1 : السلسلة بها اتجاه عام .

القرار: بعد حساب r_s ، يتم رفض H_0 ، وذلك حسب حجم العينة لما يكون :

١- في العينات الصغيرة : ($T \leq 30$)

ب- في العينات الكبيرة : $Z = \frac{r_s - \mu_{rs}}{\sigma_{rs}}$ حيث $|Z| > Z_{\alpha/2}$: ($T > 30$)

$$Z = \frac{r_s}{\sigma_{rs}} = r_s \sqrt{T-1} : \text{ بالتعويض } \quad \sigma_{rs} = \frac{1}{\sqrt{T-1}} : \quad \mu_{rs} = 0 \quad \text{أين :}$$

٣-٢-١-٢-٣- الإختبارات غير المعرفة (Parametric Tests) : تتمثل هذه الطريقة في افتراض وجود مركبة اتجاه

عام في السلسلة الزمنية، بالإضافة إلى افتراض معرفة التوزيع الاحتمالي للأخطاء أي : $y_t = f(t, u_t)$

بحيث: $N(\mu, \sigma^2)$ ، يمعني أن الخطأ العشوائي u يتبع توزيعاً طبيعياً بوسط معروف، وتبالين تابث يساوي

σ^2 ، وبعد تحديد الدالة (f) أعلاه، يتم تقدير معاملها، ثم اختبار معنوية معلمة الاتجاه العام باستعمال مقاييس

الانحراف المعياري، أو إحصائية ستودنت (Student) ^(٤)، الخ .

3-2- الكشف عن المركبة الفضائية (S) : ليس من الصعوبة اكتشاف المركبة الموسمية، فمثلاً فيما يتعلق

بموضوع الطلب على غازات التدفئة (Gas, Gasoil)، حيث يزداد الطلب عليها بشدة في الفصول و المناطق الباردة

كالهضاب العليا، وينقص الطلب على الكهرباء في الفصول الباردة ويزداد في تلك الحارة نظراً للإستعمال المكثف لأجهزة

⁽²⁾ التبريد، ورغم ذلك، فإنه قد يتذرع كشفها في بعض السلال الشديدة التذبذب، وخاصة عند توفر مجموعة هائلة من

المعطيات، أو قد نحتاج إلى دليل أكثر قوة وبرهان، ومنه وفي هذه الظروف نلجم إلى استعمال بعض المقاييس الإحصائية

لکھفما

الختارات المرة⁽³⁾: من هذه المجموعة، نكون قد استعملنا U و V لكشف مرکبة الاتجاه العام ، الا

أُننا نقتصر في هذا المقام، ولكشف الفصلية، بدراسة إشارات الفروقات من الدرجة الأولى فقط لمعطيات موسمية مثلاً،

حيث نسجل في هذا الأخير إشارتي (+) في بداية كل سنة مثلاً، وإشارة (-) في الفصل الرابع من كل سنة .

1-1-2-2-3- اختبار Kurskall-Wallis : سوف نحاول على شكله، وكيفية تطبيقه، ويكون شكل الاختبار

الحالات: H_0 : السلسلة لا توجد بها فصلية ،

H_1 : السلسلة بها مركبة فصلية.

⁽⁴⁾ كما في النماذج المختلفة على غرار النمذجة بواسطة نماذج بوكس-جنكنز.

⁽²⁾ انظر المرجع [م. حشمان-02]، ص 31

Non-Parametric Tests پذیری (۳)

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

$$، KW = \frac{12}{T(T+1)} \sum_{i=1}^p \frac{R_i^2}{n_i} - 3(T+1) \rightarrow \mathcal{W}_{(p-1)}^2$$

حيث : R_i : تمثل مجموع رتب المشاهدات المقابلة للفصل i ،

n_i : تمثل عدد المشاهدات المقابلة للفصل i ،

p : الدورة (Period)، وهي تساوي 4 في المشاهدات الفصلية، 12 في الشهرية، وهكذا .

إذا كانت ($n_i > 5$) ، يمكن إظهار (KW) أن يتبع تقريباً توزيع \mathcal{W} بدرجة حرية تساوي $1-p$.

القرار: رفض H_0 إذا كانت : $KW > \mathcal{W}_{(p-1)}^2$ ، كما نشير هنا أنه وحتى لا يكون هذا الإختبار مغلطاً، يجب إزالة مركبة الإتجاه العام من السلسلة الزمنية قبيل محاولة الكشف عن المركبة الموسمية، ولاستخدام هذا المقياس وإضافة إلى شرط توفر عدد معتبر من المشاهدات في لحظة زمنية معينة على الأقل تساوي ($p \times n_i$) ، يجب مسبقاً معرفة العلاقة التي تربط بين مركبات السلسلة الزمنية لأن تكون تجمعية، أو جدائية، أو مختلطة^(١) كما يلي :

النموذج التجميعي $y_t = T_t + S_t + e_t$

النموذج الجدائى $y_t = T_t \times S_t + e_t$


النموذج المختلط $y_t = (T_t \times S_t) + e_t$

وذلك لأن هذا الإختبار يكون مغلطاً في حالة وجود مركبة الإتجاه العام، ولهذا يجب إزالتها قبيل إجراء الإختبار، وهذه العملية تشرط المعرفة المسبقة لهذه العلاقة، ولمعرفة طبيعة هذه العلاقة يمكن الاعتماد على ثلاث طرق :

١- الطريقة البيانية (Graph Inspection): تكون وفق هذه الطريقة السلسلة الزمنية ذات عناصر تجمعية لما تنحصر ذبذباتها بين خطين متوازيين، أي أن هذه الهرات ثابتة الشدة، بينما السلسلة الجدائية، تكون ذذباتها غير ثابتة الشدة (تباعين متزايد أو متناقص، وبالتالي تقع بين خطين منفرجين) ، كما يبينه الشكلين التاليين :

الشكل (١-١): الشكل التجميعي

الشكل (١-٢): الشكل الجدائى



المصدر : [J.C.Usiner-82]، ص 25.

^(١) سوف تستبعد مركبة الدورات الاقتصادية لأنها في الغالب تحدث في السلسلة الزمنية الطويلة جداً .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

٢- **الأسلوب الإنحداري** : وهو يعتمد على تقدير المعادلة التالية^(١) :

$\sigma_i = a + b \cdot \bar{y}_i$ ، أين : m : عدد السنوات .

$$\sigma_i = p^{-\frac{1}{2}} \sqrt{\sum_{j=1}^p (y_{ij} - y_i)^2} \text{ ، و } y_i = p^{-1} \sum_{j=1}^p y_{ij}$$

أين : y_i و y_{ij} بطريقة المربعات الصغرى العاديّة (OLS) ، يمكن تقدير المعلمات المهمة في العلاقة أعلاه كما يلي :

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^m \sigma_i \bar{y}_i - m \bar{\sigma} \bar{y}_i}{\sum_{i=1}^m \bar{y}_i^2 - m \bar{y}^2}$$

القرار: تكون السلسلة الزمنية مختلطة ، تجتمعية ، أو جدائیة لما يكون وعلى الترتيب :

$$0.05 \leq \hat{b} < 0.10$$

$$\hat{b} < 0.05$$

$$\hat{b} > 0.10$$

٣-٢-١-٢-٢-٢-٣ **إختبار تحليل التباين (ANOVA)** ^(٢) : بعد تعرضنا لاختبار KW ، يوجد

هناك اختبار آخر وهو اختبار تحليل التباين ، حيث أن هذا الإختبار يرتكز على عنصرين هما :

« الدورية معلومة وتتساوي $p = 12$ ، وفي المطبيات الشهرية تساوي $p = 4$ في المطبيات الثلاثية ،

« إلغاء مركبة الإتجاه العام إن وجدت في السلسلة الزمنية .

و الفرضية الأساسية في هذا الإختبار هي : H_0 : السلسلة لا توجد بها موسمية

H_1 : السلسلة بها مركبة موسمية

ومن أجل القيام بهذا الإختبار فإننا نستعمل إحصائية (Fisher) ، ونستعين في ذلك بجدول تحليل التباين ، حيث لدينا :

☒ j : مؤشر التأثير الموسمية ،

☒ i : مؤشر التأثير السنوي ،

☒ n : عدد السنوات ،

☒ p : عدد الفصول .

^(١) من المرجع [م. حشمان-٠٢] ، ص ٣٧.

^(٢) من المرجع [C.MARMUSE-٤٣] ، ص ص ١٣١ - ١٣٢ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \quad , \quad \bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p \mathbf{X}_j \quad , \quad \bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{np} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \mathbf{X}_{ij}$$

جدول (١-٥) : جدول تحليل التباين

دالة الحرية (df)	علاقة مقدرات التباين	مجموع المربعات	تباين العوامل
$p - 1$	$V_m = \frac{S_m}{p-1}$	$S_m = n \sum_{j=1}^p (\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\mathbf{X}})^2$	تباين العامل الموسمي
$n - 1$	$V_a = \frac{S_a}{n-1}$	$S_a = p \sum_{i=1}^n (\bar{\mathbf{X}}_i - \bar{\mathbf{X}})^2$	تباين العامل السنوي
$np - 1$	I	$S_T = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_{ij} - \bar{\mathbf{X}})^2$	التباین الكلی
$(p - 1)(n - 1)$	$V_R = \frac{S_R}{(p-1)(n-1)}$	$S_R = S_T - (S_m + S_a)$	تباين الأخطاء

القرار : عند مستوى معنوية معين ($\alpha\%$) ، وباستعمال جدول فيشر ، فيكون القرار كما يلي :

• إذا كان $\left(\frac{V_m}{V_a}\right) \gg F(P-1, (P-1)(N-1))$ ، فإننا نرفض H_0 ، وبالتالي فإن هناك التأثير الموسمي ، وإذا كان العكس فإننا نقبل H_0 ، وبالتالي لا يوجد هناك التأثير الموسمي .

• إذا كان $\left(\frac{V_m}{V_a}\right) \ll F(P-1, (P-1)(N-1))$ ، فإننا نرفض H_0 ، وبالتالي هناك التأثير الموسمي ، وإذا كان العكس نقبل الفرض العددي H_0 ، وبالتالي لا يوجد التأثير الموسمي .

3-2-2-3-الاختبارات غير الحرة : تتمثل هذه الإختبارات في التالي :

3-2-2-1-الطريقة الإنحدارية: وتتمثل في افتراض وجود المركبة الموسمية في السلسلة الزمنية بـ p من المؤشرات ، ويتم التعبير عنها بنفس العدد من المتغيرات الفصلية التمثيلية (Dummy Variables) ، التي يتم تقديرها معاملاتها بطريقة المربعات الصغرى (OLS) ، ثم اختبارها إحصائيا .

3-2-2-2-3-دالة الارتباط الذاتي (ACF)^(٤): تعتمد على فكرة الارتباط بين المشاهدات وفي فترات زمنية مختلفة ، وتشير الموسمية في هذه الدالة في شكل قمم وانخفاضات في فترات زمنية تعادل p ، أي أنه تظهر قمة في دورة تعادل p ، ونفس الشيء بالنسبة لانخفاضات .

^(٤) سوف نتناول هاته الدالة بكثير من التفصيل في الفصل الثاني .

المبحث الرابع : التوقع بواسطة نماذج الإستقطاب

قبيل الولوج في هذا البحث، لا بد من التذكير بدواعي استعمال هذه النماذج والتي تهدف إلى التوقع في المدى القصير كما يلي^(١) :

- أ- غياب العلاقات السببية بين المتغيرات وكذا صعوبة قياس بعضها الآخر.
- بـ- عدم توافر المعطيات الكافية حول المتغيرات المفسرة، كونها تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المشاهدات .
- جـ- كون هذه النماذج بسيطة التركيب وسهلة التفسير، وهذا ما يسمح للمسؤولين الغير متخصصين في الميدان من الإستعانة بها.

د- إضافة إلى هذا، فإن النماذج الإنحدارية، ورغم استعمالها لعلومات معتبرة وتطلبها لمجهودات علمية وبشرية جبارة، فإن نتائجها ليست دوماً في مستوى هذه المجهودات، وسوف نبدأ بالتوقع بنماذج الإتجاه العام .

١- التوقع بنماذج الإتجاه العام وطرق تقديرها :

تهتم هذه النماذج بالركبة النظامية في السلسلة الزمنية، والمتمثلة في شكل اتجاه عام قد يكون متمثل في دالة خطية، أوسيّة أو لوغاريمية ... إلخ، إضافة إلى مركبة عشوائية ضعيفة التذبذب، كما نشير هنا أن التغيير المراد دراسته يفسّر بواسطة الزمن (t) .

١-١- نموذج الإتجاه العام الخطى (Linear Trend Models) : يمكن التعبير عن السلسلة الزمنية التي تنموا بمقدار مطلق ثابت عبر الزمن بالعلاقة أو النموذج التالي : $y_t = f(t, u_t) = a + b \cdot t + u_t$ ، حيث تشير t هنا إلى دليل الوقت، أي وحدة قياس السنة، الفصل، الشهر، وهكذا، بينما b هي معالم يراد تقديرها لأغراض التوقع في المستقبل القريب، كما نشير إلى أنه وبالنظر لانطواء هذا النموذج على التغيير العشوائي أو الخطأ، فإن قيمة t المحددة لا تقابل بقيم محددة من (Y) ، وإنما بتوزيع احتمالي كامل .

وعليه فإن القيم (Y_t) تتحدد على أساس كل من قيمة t وتوزيع الخطأ (u_t) ، ولهذا السبب ، فإن معادلة نموذج الإنحدار السابقة الذكر تعتبر غير كافية، وإنما يتطلب الأمر وضع معادلات تكميلية لتعطية الإفتراضات الخاصة بتوزيع الخطأ وأسس تحديد قيم التغيير المستقل^(٢) .

١-١-١- الفرضيات الأساسية (Basic Assumption) :

فيما يلي نورد الفرضيات الأساسية الخاصة بتوزيع الخطأ (u_t) ، وأسس تحديد قيم التغيير المستقل .

١- التوزيع الطبيعي (Normality) (Normality) يعني بأن الخطأ (u_t) يتوزع توزيعاً طبيعياً ،

بـ- إن الوسط الحسابي للخطأ يكون مساوياً للصفر (Zero Mean) ، أي أن : $E(u_t) = 0$.

جـ- تجانس أو ثبات تباين الخطأ (Homoscedasticity) (Homoscedasticity) ، أي أن: $E(u_t^2) = \sigma^2$.

^(١) من المرجع [م. حشمان-٠٢] ، ص ١٢.

^(٢) من المرجع [ع. شريف-٨١] ، ص ١٥٦.

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه


د- انعدام الارتباط الذاتي بين البواقي (Non AutoCorrelation) بين البواقي ، أي أن :

$$E(u_i \cdot u_j) = 0 \quad \forall i \neq j$$

٤- انتظام قيم المتغير المستقل، وعدم تغييرها من عينة إلى أخرى، وأنه مهما اختلف حجم العينة

تكون القيمة مفصلاً للفرضيات الأساسية المذكورة آنفاً : عبارة عن رقم نهائي (Finite Number) ، وفيما يلي نقدم شرحًا

- تدل الفرضيتين "أ" و "ب" على التوزيع الطبيعي للخطأ حول الصفر، ويعني ذلك بأن (u_i) مستمرة، وتترواح قيمتها بين $(-\infty)$ و $(+\infty)$ ، وأنها موزعة بصورة متناهية (Symmetrically Distributed) حول وسطها.
 - تعني فرضية تجانس، أو تبات التباين (Homoscedasticity)، أن تباين الخطأ متساوي عند جميع قيم المتغير المستقل، ويتساوي (σ^2) ، وهذه القيمة مجهرة، وتدل هذه الفرضية على ثبات تشتت قيم الخطأ عند قيم (t_i) المختلفة. فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يكون التشتت كبيراً عند قيم (t_i) الكبيرة وصغيراً عند قيم (t_i) الصغيرة، وكما هو مبين في الشكل البياني أدناه.



¹⁵⁹ المصدر: انظر المرجع [ع. غ. محبوب - 82]، ص 159.

كمان للفرضية "د" أهمية خاصة بالنسبة للسلسل الزمنية، إذ تعني عدم ثأثير الظاهرة الاقتصادية المتحققة في السنة (t_i) - ولتكن الدخل الوطني مثلاً - على تلك المتحققة في السنة الثانية (t_2) ، وانعدام التأثير يتحقق في حالة انعدام الارتباط الذاتي بين البيوافي .

تعني الفرضية الأخيرة بأن قيمة المتغير المستقل لا تتحدد عن طريق الصدفة، وإنما وفق إرادة الباحث، كما يشترط بأن تكون أرقامه مختلفة، أي أكثر من رقم واحد ولا أصبح تباينها يساوى الصفر.

وكون نموذج الإتجاه العام ذو علاقة خطية، فيمكن تقدير معلمات النموذج بالطريقة المشهورة والتي تعرف بطريقة المربعات الصغرى العادلة (OLS)، بالإضافة إلى طريقة أخرى وهي طريقة المصفوفات.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

١-١-٢- طريقة المربعات الصغرى العادبة (OLS)

استعملت هذه الطريقة لأول مرة من طرف (Gauss 1805)، وكذلك Legendre في قياسات علم الفلك، والشكل المطروح في ذلك الوقت هو تقرير مجموعة من الملاحظات y_i مع بعض الدوال غير المعروفة $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ التي تعتمد على المعالم غير المعروفة أيضاً $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ حيث $i = 1, 2, \dots, n$ ، حيث $n < m$ ، وبعدها (Legendre) أبانه في حالة ما إذا كانت $\hat{\theta}_i = \theta_i$ نقوم بتنمية المدار^٤ بالنسبة لـ $\hat{\theta}_1$ لنحصل على وسط العينة :

$$\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \bar{y}$$

والذي يعتبر أحسن قيمة تمثل (y_n, y_2, \dots, y_1) وبناءً على هذه النتيجة، اقترح (Legendre) تصغير مربعات الأخطاء، وهو ما يسمى بالمربعات الصغرى (LS).

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n (y_i - g_i(\theta))^2$$

مع افتراض أن الدالة (θ_i) تقبل الإشتقاق وكذلك $\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = 0$ ، وتعطي المعادلات الطبيعية على الشكل :

$$(-2) \sum_{i=1}^n [y_i - g_i(\theta)] \frac{\partial}{\partial \theta_k} g_i(\theta) = 0$$

$$k = 1, 2, \dots$$

$$m < n$$

بينما يقترح (GAUSS) إضافة للتوزيع الاحتمالي، حيث إذا كانت العينة العشوائية (X_1, X_2, \dots, X_n) لها دالة كثافة $f(X)$ والوسط X_p هو قيمة تمثيلية من أجل كل من i ، فإن دالة الكثافة يجب أن تكون طبيعية أي :

$$f(X) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} \exp\left[\frac{-1}{2\sigma_x^2} X^2\right]; x \in \mathbb{R}$$

ومنه يضع (GAUSS) المشكل على النحو التالي :

$$y_i = g_i(\theta) + u_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$u_i \sim IN(0, \sigma_u^2), i = 1, 2, 3, \dots, n$$

يُشتق بعد ذلك توزيع العينة الممثل لمجموعة الملاحظات $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

$$f(y, \theta) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot \exp\left[\frac{-1}{2\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - g_i(\theta))^2\right]$$

^٤ انظر المرجع [ص. تومي-99]، ص ص 16-19.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

وتعظيم هذه الدالة الأخيرة $f(y, \theta)$ بالنسبة لـ θ ، يعطي نفس المقدار لـ θ عندما نقوم بتنبأة مجموع مربعات الأخطاء

$$\min \sum_{i=1}^n [y_i - g_i(\theta)]^2$$

$$y_i = \sum_{k=1}^m \theta_k x_{ki} + u_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

وتعوض فرضية التوزيع الطبيعي بالفرضيات السابقة لطريقة (OLS)

وبالنسبة للمقدرات، ولنعتبر أن المعادلة التالية : $y_t = \hat{a} + \hat{b} \cdot t + e_t$ نظيرًا للعلاقة التالية⁽¹⁾ :

حيث أن \hat{b}, \hat{a} بينما e_t تمثل تقدير الأخطاء والتي تسمى الباقي .

إن طريقة (OLS) تعتمد على مبدأ تصغير مجموع مربعات الباقي أي :

$$\min \sum_{t=1}^T e_t^2 = \min \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{a} - \hat{b} \cdot t)^2$$

وكون $\sum_{t=1}^T e_t^2$ تتوافق مع نقطة انعطاف صغرى، أين تكون المشتقة الأولى لها بالنسبة للمعلمتين معروفة أي :

$$\frac{\partial \sum_{t=1}^T e_t^2}{\partial \hat{a}} = -2(y_t - \hat{a} - \hat{b} \cdot t) = 0$$

$$= \sum_{t=1}^T y_t - T \cdot \hat{a} - b \cdot \sum_{t=1}^T t = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{t=1}^T y_t = T \cdot \hat{a} + b \cdot \sum_{t=1}^T t$$

ومنه وبعملية بسيطة نجد أن :

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \cdot \bar{t}$$

$$\hat{b} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T t = \frac{T+1}{2} \quad \text{و} \quad \bar{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T y_t \quad \text{حيث أن :}$$

وبنفس الطريقة نجد أن :

$$\frac{\partial \sum_{t=1}^T e_t^2}{\partial \hat{b}} = -2(y_t - \hat{a} - \hat{b} \cdot t) \cdot t = 0$$

$$= \sum_{t=1}^T y_t \cdot t - \hat{a} \sum_{t=1}^T t - \hat{b} \cdot \sum_{t=1}^T t^2 = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{t=1}^T y_t \cdot t = \hat{a} \sum_{t=1}^T t + \hat{b} \cdot \sum_{t=1}^T t^2$$

وبتعويض \hat{a} بقيمتها المحسوبة أعلاه :

⁽¹⁾ من المرجع [م. حشمان-02] ، ص ص 41-44

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

$$\begin{aligned}\sum_{t=1}^T y_t \cdot t &= (\bar{y} - \hat{b} \cdot \bar{t}) \sum_{t=1}^T t + \hat{b} \cdot \sum_{t=1}^T t^2 \\ &= \bar{y} \sum_{t=1}^T t + \hat{b} \cdot \bar{t} \sum_{t=1}^T t + \hat{b} \cdot \sum_{t=1}^T t^2\end{aligned}$$

وبضرب المقاديرتين الأولىين في الطرف الأيمن في القيمة T ، وبالقسمة عليه نحصل على مقادير جديدة بدلالة الأوساط الحسابية ، بمعنى أن :

$$\sum_{t=1}^T y_t \cdot t - T \bar{y} \bar{t} = \hat{b} \left(\sum_{t=1}^T t^2 - T \bar{t}^2 \right)$$

ومنه فإن :

$$\hat{b} = \frac{\sum_{t=1}^T y_t \cdot t - T \bar{y} \bar{t}}{\sum_{t=1}^T t^2 - T \bar{t}^2}$$

ويمكن أيضاً التعبير عنها بدلالة انحراف القيم عن أوساطها الحسابية وكما يلي :

$$\hat{b} = \frac{\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})(y_t - \bar{y})}{\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})}$$

وهذا التقدير تم طبعاً مع الأخذ في الإعتبار الفرضيات السابقة .

3-1-1 - طريقة المصفوفات :

بتعييض t في معادلة نموذج الإتجاه العام الخطى $y_t = f(t, u_t) = a + b \cdot t + u_t$ بـ $1, 2, \dots, T$ و ... و

فنتحصل على T من المعادلات وكما يلي ⁽¹⁾ :

$$y_1 = a + b \cdot 1 + u_1$$

$$y_2 = a + b \cdot 2 + u_2$$

...

$$y_T = a + b \cdot T + u_T$$

ويمكن الآن صيغة هذه المعادلات في شكل مصفوفتي كما يلي :

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_T \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_T \end{bmatrix}$$

$$Y = X \cdot B + U$$

⁽¹⁾ من المرجع [م. حشمان-02] ، ص 44

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

حيث يمكن التعبير عنه على الشكل التالي :

$$E(U'U) = \sigma^2 \cdot I_n$$

إذ أن (U) عبارة عن موجه عمودي (Column Vector)، و (U') موجه أفقي (Row Vector)، وأن $(U'U)$ عبارة عن مصفوفة متناهية ذات الأبعاد $(n \times n)$ ، وبمأن التوقع الرياضي للمصفوفة المتناهية يشمل كل عنصر من عناصرها، فإنه بالإمكان إعادة صياغة المعادلة $(*)$ السابقة كما يلي :

$$E(U'U) = \begin{bmatrix} E(U_1^2) & E(U_1 U_2) & E(U_1 U_3) & \dots & E(U_1 U_n) \\ E(U_2 U_1) & E(U_2^2) & E(U_2 U_3) & \dots & E(U_2 U_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ E(U_n U_1) & E(U_n U_2) & E(U_n U_3) & \dots & E(U_n^2) \end{bmatrix}$$

وبمأن :

$$E(U'U) = \sigma^2$$

$$E(U_i U_j) = 0 \quad , \forall (i \neq j)$$

فيكون لدينا ما يلي ^(٤) :

$$E(U'U) = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \\ &= \sigma^2 \cdot I \end{aligned}$$

حيث أن I هي مصفوفة وحدة $N \times N$.

$$\hat{b} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix} = (X' X)^{-1} X' Y \quad \text{يكون كما يلي :}$$

بشرط أن تكون المصفوفة $(X' X)$ غير شاذة، أي ذات محدد غير معروف، وبالتالي فهي قابلة للقلب، أين

^(٤) انظر المرجع [ع.غ.محبوب-٨٢] ، ص ١٠٨.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

$$X' X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & T \end{bmatrix}$$

وبتطبيق قاعدة ضرب مصفوفتين نحصل على ما يلي :

$$\sum_{t=1}^T t^2 = \frac{T(T+1)(2T+1)}{6} \quad , \quad \sum_{t=1}^T t = \frac{T(T+1)}{2}$$

أين :

$$X' Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum Y_t \\ \sum t \cdot y_t \end{bmatrix}$$

وكذلك :

ويتم تشكيل توقع النموذج كما يلي : ($\hat{y}_{T+h} = \hat{a} + \hat{b}(T+h)$ ، أين h يمثل أفق التوقع ، وبتحليل هذه العلاقة أكثر

وبفك الأقواس يمكن التوصل إلى : $\hat{y}_{T+h} = (\hat{a} + \hat{b}T) + \hat{b} \cdot h$

$$\hat{y}_{T+h} = \hat{y}_T + \hat{b} \cdot h \dots \text{R}$$

ومadam \hat{b} هو مقدار النمو المطلق في السلسلة الزمنية y_t ، أي :

$$\hat{y}_T - \hat{y}_{T-1} = (\hat{a} + \hat{b}T) - (\hat{a} + \hat{b}(T-1))$$

$$\Rightarrow \hat{y}_T - \hat{y}_{T-1} = \hat{b}$$

ومنه يمكننا كتابة العلاقة (R) في الشكل التالي :

وما دامت قيم كل من y_t ، y_{t-1} قد تحققت فعلياً ، ولتحسين دقة التوقع ، نعرض هذه القيم بتلك المشاهدة كما يلي :

$$\hat{y}_{T+h} = y_T + (y_T - y_{T-1}) \cdot h$$

وهذه هي نقطة انطلاق طريقة هولت وينترز (Holt-winters) ⁽¹⁾.

١-٢-النموذج الأسني ⁽¹⁾ (The Exponential Models)

⁽¹⁾ انظر نمذجة الفصلية، الصفحة رقم 63 من هذا الفصل .

⁽²⁾ انظر في المرجع [م. حشمان-02] ، ص ص 54-50.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

كثيراً ما توحى النظرية أو شكل الإنتشار بوجود علاقة غير خطية، ومن الممكن تحويل بعض الدوال غير الخطية إلى دوال خطية حتى يمكن تطبيق طريقة (OLS)، نفترض أننا سلمنا مقدماً بمعادلة كما يلي:

$$y_t = A \cdot e^{rt+u_t}$$

حيث u_t تشير إلى الحد العشوائي.

وبعد تحويلها عن طريق اللوغاريتم إلى دالة خطية كالتالي :

$$\ln(y_t) = \ln(A) + rt + u_t$$

حيث $\ln(A)$ و r هي معالم يجب تقديرها، وباستعمال طريقة (OLS)، بعد إعادة تسمية المقادير اللوغاريتمية

$$\ln(A) = a, \ln(y_t) = z_t$$

وتصبح المعادلة من جديد في الشكل التالي :

$$z_t = a + rt + u_t$$

وتقدير المعلمتين الأخيرتين يتم الخطوات السابقة، الواردة في نموذج الإتجاه العام الخطي .

$$\hat{r} = \frac{\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})(z_t - \bar{z})}{\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2}$$

. $\hat{a} = \bar{z} - \hat{r} \cdot \bar{t}$:

$$\bar{z} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T z_t$$

كمان r و a هي مقدرات توابع النموذج المحول، ومنه فالتوقع بـ y في الفقرات 1 ثم L المستقبلية يكون كالتالي :

$$\hat{y}_{T+1} = \hat{A} \cdot e^{\hat{r}(T+1)}$$

وعلى العموم :

$$\hat{y}_{T+L} = \hat{A} \cdot e^{\hat{r}(T+L)}$$

ويتمكن الحصول على نفس هذه التوقعات مباشرة، باستعمال العلاقة اللوغاريتمية التالي :

$$\hat{z}_{T+1} = \hat{a} + \hat{r}(T+1)$$

وبالتشابه :

يتم تحويل هذه الأرقام إلى أصلها عن طريق الدالة الأسية وكالتالي :

$$\hat{y}_{T+1} = \exp(z_{T+1})$$

و :

$$\hat{y}_{T+L} = \exp(\hat{z}_{T+L})$$

و الملاحظ اقتصادياً أن هذا النموذج يُنتقد على أساس أن الظواهر الاقتصادية لا تنمو بمقدار مطلق عبر الزمان إلى ما لانهاية،

وذلك لوجود قيود كثيرة اقتصادية أو غير اقتصادية تحد من هذا النمو، لأن تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للحد من

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

ارتفاع الأسعار، أو التحكم في معدلات التضخم، وفي مثالنا المذكور آنفًا فلا تُعد أسعار هذه المواد، أو دخول المستهلكين وحدها المحدد الرئيس للطلب الإستهلاكي على السلعة ، كما أن بعض السلع الجديدة يزداد الطلب عليها بشكل كبير، ثم ما يفتئ أن يصل إلى مستوى الإشباع، أين يتوقف نمو الطلب على هذه السلعة، وهو ما نتعرض له في الدالة اللوجيستيكية .

١-٣- نموذج القطع المكافئ (The Quadratic Trend Models) :

نجد دالة القطع المكافئ، والتي تعتبر امتداداً لنموذج الإتجاه العام الخطي المستعمل في تحليل السلاسل الزمنية، ويكتب

بالشكل التالي :

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + u_t$$

يتميز هذا الأخير من الأول، والثاني في كونه غير خطى المتغيرات، وهذا لا يطرح مشكلة في تقدير معلماته، حيث نعيّد

تسمية t^2 بـ x_t ، ونعيّد كتابة المعادلة من جديد في الشكل التالي : $y_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 t + \hat{\beta}_2 x_t + u_t$ ،

ويعتبر هذا نموذج خطى عام، ويمكن تقدير معالله الثلاثة بواسطة طريقة(OLS)، وبطريقة المصفوفات كما يلي^(٤) :

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T & \sum t & \sum x_t \\ \sum t & \sum t^2 & \sum tx_t \\ \sum x_t & \sum tx_t & \sum x_t^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum y_t \\ \sum ty_t \\ \sum x_t y_t \end{bmatrix}$$

١-٤- النموذج اللوجستيكي^(٢) (The Logistic Models) :

إن التقليد السائد في المرجع القياسي والإحصائية المتناولة لموضوع هذا التابع هو تصويره حسب التابع التالي^(٣) :

$$y = \frac{k}{1 + b e^{-at}}$$

حيث أن : k تمثل عتبة التشبع (الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه الظاهرة في تطورها) ،

a : تمثل معلمة متعلقة بسرعة تطور الظاهرة ،

b : تمثل معلمة متعلقة بمبدأ الزمن ،

y : يمثل قيم الظاهرة المدرosa (المتغير التابع) ،

t : يمثل عنصر الزمن (المتغير المدروس) ،

^(٤) انظر في المرجع [م. حشمان-٠٢] ، ص ٥٥.

^(٢) من بين أهم تطبيقات هذه الدالة التنبؤ بالنمو السكاني، إلا أن الواقع خالف التوقعات بسبب الهجرة الشديدة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الإنعاش الاقتصادي الكبير الذي شهدته الأخيرة خلال تلك الحقبة ، بالإضافة إلى تقدير نمو الاقتصاد القومي، إلا أن هذا الإستخدام قوبل بانتقادات شديدة ذلك أن نمو الأخير لا يمكن أن يدخل مرحلة الإشباع وقد اقتربت هذه الدالة وبسبب الإستعمال الشائع لها في البيولوجيا، من أجل قياس تطور نمو بعض السلع الإستهلاكية العمّرة التي تصل في يوم ما إلى مستوى الإشباع، وذلك على غرار استعماله بيولوجيا لقياس نمو بعض الحشرات في إثناء مغلق .

^(٣) انظر المرجع [ع. ق. بوالسيت-٠١] ، ص ٢٠١.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

تمثل توابع موجبة k, b, a .


إلا أن هناك صياغة أخرى أنساب من الصياغة الأخيرة وهي كما يلي :

$$y = \frac{k}{1 + b e^{-ax}}$$

وحيث أن هذه العلاقة تحتفظ بنفس متغيرات وتتابع العلاقة الأولى ماعدا المتغير المستقل الذي كان يعبر في الأول عن عنصر الزمن (t) فأصبح في الثانية معبراً عن أي عنصر (x).

كما نشير إلى أن التابع اللوجستيكي، وأي كانت صيغته فهو قابل للإشتقاق لا نهائياً، ويقبل نقطة إنعطاف عند النقطة

$\left(\frac{\log b}{a}, \frac{k}{2} \right)$ وذلك كما هو موضح في الشكل التالي :



الشكل (١-١٣) : تطور التابع اللوجستيكي

المصدر : [م.ق.ب.والسبت-٢٠١]. ص ٢٠١.

٢- تقييم النموذج (Diagnostic Checking) : هذه المرحلة تسبق مرحلة التوقع، والتي نلجم إليها من أجل

تقييم النموذج من حيث جودة التوفيق والمعنوية، وفي الأخير قياس دقة التوقع والتي نلجم إليها في نهاية المطاف .

٢-١ - إختبار جودة المعامل : وهو مربع معامل الارتباط الخطى المتعدد، وهو يعرف بأنه عبارة عن نسبة التغيير

الإجمالي في Y ، والذي يفسره الإنحدار المتعدد للمتغير Y على المتغيرين X_1, X_2, X_3 .

إذا كانت معادلة الإنحدار المتعدد كما يلي^(٤) :

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + u_i$$

فإن معامل التحديد المتعدد يكون مساوي لـ :

^(٤) من المرجع [د. سلاقاتور-٨٢٢]، ص ١٦٥ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

$$R^2 = \frac{\sum \hat{y}_i^2}{\sum y_i^2} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2} = \frac{\hat{b}_1 \sum yx_1 + \hat{b}_2 \sum yx_2}{\sum y^2}$$

وحيث أن إضافة متغيرات مستقلة أو مفسرة أخرى يزيد على الأرجح من قيمة مجموع مربعات الإنحدار $RSS = \sum \hat{y}_i^2$ ⁽¹⁾ ، لنفس قيمة إجمالي مجموع الربيعات $TSS = \sum y_i^2$ ⁽²⁾ ، فإن R^2 تزيد، فإذا أخذنا في الإعتبار نقص عدد درجات الحرية مع إضافة متغيرات مستقلة إضافية، فإن قيمة R^2 المعدلة، أو قيمة \bar{R}^2 يمكن حسابها كالتالي :

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k}$$

حيث n : عدد المشاهدات ، و k : عدد المعالم المقدرة .
وعملياً نفضل أن يكون هذا الأخير أقرب ما يمكن من الواحد .

٢-٢ - اختبار المعنوية الإحصائية :

لاختبار معنوية المعالم كل واحدة على حدة نلجأ إلى إحصائية ستودنت (t-Stat) ، والمعطاة بالعلاقة التالية:

$$t_j = \frac{\hat{b}_j - b_j}{S_{\hat{b}_j}} \xrightarrow{} (\frac{1}{2}\alpha, n-K)$$

حيث: $S_{\hat{b}_j}$ تمثل الأخطاء المعيارية للتقديرات المعنوية كما يلي :

$$S_{\hat{b}_1} = \sqrt{s^2 \cdot \frac{\sum x_2^2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1^2 x_2^2)^2}} = \sqrt{\frac{\sum e_i^2}{n-k} \frac{\sum x_2^2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1 x_2)^2}}$$
$$S_{\hat{b}_2} = \sqrt{s^2 \cdot \frac{\sum x_1^2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1^2 x_2^2)^2}} = \sqrt{\frac{\sum e_i^2}{n-k} \frac{\sum x_1^2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1 x_2)^2}}$$

* صيغة الاختبار: نريد اختبار المعلمة b_1 ، كما يلي :

$$H_0 : b_1 = 0$$

$$H_1 : b_1 \neq 0$$

وتصبح الإحصائية في هذه الحالة كما يلي : $t_1 = \frac{\hat{b}_1 - b_1}{S_{\hat{b}_1}}$ ، (كذلك الإحصائية t_2 الخاصة بالمعلمة b_2) ،

وتكون المعلمة المعنوية معنوية إحصائياً إذا كانت ⁽³⁾ : $t_1 > t_{TAB} = t_{\frac{1-\alpha}{2}, n-K}$

وعلى العموم تتحقق المعنوية للمعلمات المعنوية، لما تكون : $t_{cal} > t_{TAB}$.

RSS:Residual Sum Of Squares ⁽⁴⁾

TSS :Total Sum Of Squares ⁽²⁾

$\alpha = 5\%$ هي تلك المجدولة ، وفي كثير من التطبيقات تؤخذ $t_{tab} = t_{\frac{1-\alpha}{2}, n-k}$ ⁽⁵⁾

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

2-3- اختبار المعنوية الكلية : يمكن اختبار المعنوية الإجمالية للإنحدار باستخدام نسبة التباين (المفسّر) إلى التباين (غير المفسّر)، ويتبع هذا التوزيع (FISHER)، بدرجات حرية $1 - k$ و $n - k$ ، حيث أن : n تمثل عدد المشاهدات ، k تمثل عدد المعالم المقدرة:

$$F_{k-1, n-k} = \frac{\sum \hat{y}_i^2 / (k-1)}{\sum e_i^2 / (n-k)} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

فإذا تجاوزت قيمة F المحسوبة القيمة الجدولية، وذلك عند مستوى المعنوية، ودرجات الحرية المحددين، يُقبل الفرض بأن معالم الإنحدار ليست جمِيعاً متساوية للصفر، وأن R^2 مختلف جوهرياً عن الصفر.

2-4- اختبار فرضية عدم الإرتباط الذاتي⁽⁴⁾ بين الباقي :

إن وجود مشكلة الإرتباط الذاتي هذا يُدخل بأحد الإفتراضات التي تقوم عليها طريقة (OLS)، وهي تعني أن خطأ ما حدث في فترة ما، ثم أخذ يؤثر في الأخطاء الخاصة بالفترات التالية بطريقة تؤدي إلى تكرار نفس الخطأ أكثر من مرة، أي أنه قد يوجد هناك خطأ واحد ولكنه يتكرر في كل الفترات التالية بما يؤدي لظهور قيم الحد العشوائي عند مستوى يختلف عن القيم الحقيقية، ومن أجل التحقق من وجود أو عدم وجود هذا الإرتباط الذاتي بين الباقي توجد هناك العديد من الإختبارات التي يمكن استخدامها، ولعل أهمها اختبار داربن - واتسون (Durbin Watson test)، والذي يمكننا

إجراؤه كما يلي⁽²⁾ :

أولاً : نقوم بتحديد d^* المحسوبة (d^*) :

$$d^* = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \approx 2(1-p) \quad , \quad p = \frac{\sum_{i=2}^n e_i - e_{i-1}}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

حيث أن p يمثل معامل الإرتباط الذاتي للمجتمع.

ومن العلاقة $(1-p)^* = 2(p-1)$ يمكننا استخلاص التالي :

1- إذا كان : $p = 0$ أي أن الإرتباط الذاتي منعدم، فإن $d = 2$ ، وهذا يعني أن الفرض الصافي H_0 بشأن معامل الإرتباط الذاتي الحقيقي للمجتمع $0 = p$ يكافئ الفرض $2 = d$.

2- إذا كان : $p = 1$ أي أن الإرتباط الذاتي الحقيقي تمام موجب، فإن $0 = d$ ، وهذا يعني أنه إذا كانت $0 > d > 2$ فإن الإرتباط الذاتي موجباً، وكلما قلت قيمة d مبتعدة عن 2 ومتقربة من الصفر كلما زادت درجة الإرتباط الذاتي الموجب.

⁽⁴⁾ يُشير الإرتباط الذاتي بوجه عام إلى وجود ارتباط بين القيم المشاهدة لنفس المتغير، وفي نماذج الإنحدار عادة ما تشير مشكلة الإرتباط الذاتي إلى وجود ارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي ϵ_1 أو ϵ_2 ، وفي هذه الحالة تكون قيمة معامل الإرتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي (أو معامل التغاير) $r_{\epsilon_1 \epsilon_2}$ غير متساوية للصفر

⁽²⁾ من المرجع [G.VANGREVELINEGHE-73] ، ص ص 74 - 76

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

٣- إذا كان : $p = 1$ أي أن الإرتباط الذاتي الحقيقي قام سالب، فإن $d = 4$ ، وهذا يعني أنه إذا كانت $2 > d > 4$ فإن الإرتباط الذاتي يكون سالباً، وكلما زادت قيمة d مبتعدة عن ٢ ومتقربة من ٤ كلما زادت درجة الإرتباط الذاتي العكسي .

أي أنه إذا كانت قيمة معامل الإرتباط الذاتي p تتراوح بين -١ و +١ فإن قيمة d تتراوح بين ٠ و ٤.

ثانياً : تحديد d الجدولية :

توجد هناك جداول خاصة للكشف عن d تسمى (Darbin-Watson Statistic Tables) .

وتتحدد قيم d الجدولية بعوامل ثلاثة :

أ- عدد المشاهدات n ،

ب- عدد المتغيرات التفسيرية $k - 1$ ،

ج- مستوى المعنوية (α) عند ١ % و ٥ % .

وتوجد هناك قيمتين لـ d كما يلي : $d_U \leftarrow$ حد أعلى .

$d_L \leftarrow$ حد أدنى .

ثالثاً : إجراء الإختبار (DW TEST) :


توجد هناك منطقتين حررتين إذا وقعت في إحداهما d^* المحسوبة يمكن القول أن هناك ارتباط ذاتي، وبمقارنة d^* المحسوبة مع أحد قيمتي d الجدولية نجد أن هناك أكثر من احتمال كما يلي :

أ- إذا وقعت $d^* > d_L$ نرفض فرض العدم $H_0 = p$ ونقبل الفرض البديل $H_1 > p$ ، ويكون هناك ارتباط ذاتي موجب .

ب- إذا وقعت $d^* < d_L$ نرفض فرض العدم $H_0 = p$ ونقبل الفرض البديل $H_1 < p$ ويكون هناك ارتباط ذاتي عكسي .

ج- وفي المقابل إذا كانت $d^* > d_U$ فإننا نقبل فرض العدم ومن ثم لا يوجد هناك مشكلة ارتباط ذاتي من أي نوع .

د- أما إذا كانت $d^* > d_L$ أو $d^* > d_U$ ، فإن الإختبار لا يعطي نتيجة محددة بشأن قبول أو رفض فرض العدم وتسمى هذه بمنطقة عدم القرار، ومن توضيح كافة هذه الإحتمالات كما يلي (٤) :



(٤) انظر في ذلك [ع.ق. عطية- ٤٠٣- ٣٨٦]، ص ص ٣٠٥- ٣٠٧، وكذلك [ع.شريف- ٨١]، ص ص ٣٠٥- ٣٠٧ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

3- التوقع والتمهيد بواسطة النماذج المكيفة :

3-1-3- التوقع⁽¹⁾ : يتميز تطبيق النماذج السابقة، على السلسل الزمنية التي تبرز فيه بشكل جلي مركبة الاتجاه العام (T_t) ، بينما في هذا النوع من النماذج يتلاعُم والسلسل الزمنية التي تتميز بالإستقرار والعشوانية، أي أنها تتذبذب حول وسط حسابي ثابت معين، وبالتالي فإنها حالية من مركبة الاتجاه العام وكذا الفصلية، وفي مرحلة لاحقة تتطور هذه النماذج لتتلاعُم والسلسل الزمنية بمركباتها العشوائية والإتجاه العام ضمن نماذج آنية إن صح التعبير⁽²⁾ .

3-1-1- نماذج المتوسطات المتحركة : ونذكر منها ما يلي :

3-1-1-1- نماذج المتوسطات المتحركة البسيطة⁽³⁾ (N-period Moving Average) : تعتمد هذه الطريقة على حساب متوسط حسابي على أساس عدد معين من الفترات الموالية لآخر فترة زمنية حسب على أساسها الوسط الحسابي ، أي أن التوقع في هذه الحالة هو عبارة عن :

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{1}{N} \sum_{i=-N+1}^t y_i , \text{ أي : } \hat{y}_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \dots + y_{t-N+1}}{N}$$

حيث : \hat{y}_{t+1} التوقع للفترة 1 ، $t+1$

، y_t المستوى الفعلي للفترة t ،

، دليل الفترة الزمنية ، t

N : عدد المستويات التي حسب على أساسها الوسط الحسابي (الأساسي) .

إضافة إلى غياب طريقة تقدير ، ومنه غياب وسائل إحصائية ملائمة للحكم على قوة النموذج الإحصائية والتوقعية ، فإذاً النموذج يُنتقد على أساس أنه يعتبر ، لا في المستقبل ما هي إلا المتوسط الحسابي لقيمه السابقة فقط ، وكذلك يستخدم فقط للتوقع لفترة زمنية واحدة ، إضافة إلى أن النتيجة تتوقف بشكل أساسي على قيمة N التي تختار عفويًا ، ولهذا اقترح أخذها في حالة استعمال معطيات فصلية متساوية لـ ($N = 4$) ، بينما في المعطيات الشهرية تساوي 12 ، وفي الحالات الأخرى تختار بطريقة عفوية ، كما تستخدم فقط في السلسل الزمنية المستقرة ، وتجاوز هذه النقائص ، تم وضع طريقة أخرى تعالج نقائص الطريقة السالفة الذكر ، وهي طريقة المتوسطات المتحركة المرجحة الأساسية .

3-1-1-2- المتوسطات المتحركة المرجحة الأساسية (Exp.Weighted Moving Average) :

على عكس النموذج السابق ، الذي يعطي نفس الوزن للمتغير y في مختلف الفترات الزمنية ، فإن هذا النموذج يخصص الوزن الأكبر للقيم الحالية عن سابقتها بشكل متناظر ، ويعني بهذا أن تأثير y_1 لا يكون أكبر من تأثير y_s ، حيث :

$s > 1$ ، كما أنه تخلص من إشكالية N .

⁽¹⁾ من المرجع [م. حشمان-٢٠٢] ، ص 62

⁽²⁾ نموذج Holt-Winters مثلاً.

⁽³⁾ من المرجع [ع. شرابي-٤٠٠] ، ص ص ٥٦-٥٢ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

التعديل أسرع، وكلما ابتعدت عنه كان أبطأ .
حيث : $\tilde{y}_T = \alpha \sum_{r=0}^{\infty} (1-\alpha)^r y_{t-(r+1)}$ هي معلمة التكيف، فكلما اقتربت من الواحد وكان

واستعمال هذا النموذج في عملية التوقع يكون كالتالي :

$$\hat{y}_{T+1} = \alpha y_T + \alpha(1-\alpha)y_{T-1} + \alpha(1-\alpha)^2 y_{T-2} + \alpha(1-\alpha)^3 y_{T-3} + \dots$$

$$\hat{y}_{T+1}/T = \alpha \sum_{r=0}^{\infty} (1-\alpha)^r y_{t-r} \dots (\mathcal{U})$$

حيث : \hat{y}_{T+1}/T هو توقع \hat{y} للفترة $T+1$ إنطلاقاً من الفترة T . كما نجد أن : $\hat{y}_{T+2} = \hat{y}_{T+1}/T$ وأن : $\hat{y}_{T+L} = \hat{y}_{T+1}$

كما نلاحظ، وإضافة إلى كون توقعات هذا النموذج غير مختلفة عن بعضها البعض، فإن استعمال العلاقة (\mathcal{U}) يُسبب عراقيل كثيرة منها لانهائيّة العلاقة الرياضية تلك، لذلك وجب تبسيطها فنجد :

$$\begin{aligned} \hat{y}_{T+1} &= \alpha y_T + \alpha(1-\alpha)y_{T-1} + \alpha(1-\alpha)^2 y_{T-2} + \alpha(1-\alpha)^3 y_{T-3} \\ &\quad + \dots + \alpha(1-\alpha)^m y_{T-m} \\ &= \alpha y_T + (1-\alpha) \{ \alpha y_{T-1} + \alpha(1-\alpha)y_{T-2} + \alpha(1-\alpha)^2 y_{T-3} + \dots \} \end{aligned}$$

وكون المدار الموجود بين القوسين الكبيرين يساوي $\hat{y}_{T/T-1}$ ، إذا :

$$\begin{aligned} \hat{y}_{T+1} &= \alpha y_T + (1-\alpha) \hat{y}_{T/T-1} \dots (\mathcal{U}) \\ \hat{y}_{T+1} &= \alpha y_T + (1-\alpha) \hat{y}_T \\ &= \hat{y}_T + \alpha(y_T - \hat{y}_T) \\ &= \hat{y}_T + \alpha(e_t) \end{aligned}$$

إن هذه العلاقة الأخيرة، تعتبر أن توقع الفترة القادمة ما هو إلا توقع الفترة السابقة مضافاً إليه مدار التعديل، وهو مكون نسبة من الخطأ (البواقي Residuals)، إلا أنه وبسبب غياب طريقة تقدير للمعامل في العملية هذه، فإنه لا يمكن الحكم على مدى نجاح النموذج المختار في إعطاء قيم للمتغير المعنى في الفترة المدروسة، والتي تقتفي أثر مشاهدات السلسلة الأصلية، نتيجة غياب الأدوات الإحصائية الإختبارية⁽⁴⁾ الضورية للعملية، ولهذا الغرض نقدم فيما يلي طرق تمديد السلسلة الزمنية للأسباب التالية، وبالنسبة للعلاقتين المذكورتين سابقاً :

١ - تمديد⁽²⁾ السلسلة الزمنية داخل العينة ($t = 1, 2, \dots, T$) ، لمعرفة مدى قدرة النموذج على اقتناء أثر السلسلة الزمنية .

٢ - تقدير المعلمة α ، والتي تضمن تدنية مجموع مربعات البواقي :

$$\min RSS = \min \sum e_i^2 = \min \sum (y_t - \hat{y}_t)^2$$

٣ - تسمح هذه العلاقة بانطلاق عملية التوقع من خلال توفير \hat{y}_T ، والتي نستعملها في العلاقة (\mathcal{U}) الأخيرة بدل \tilde{y}_T .

⁽⁴⁾ مثل اختبارات R^2 ، F ، t ، χ^2 . Smoothing Methods⁽²⁾

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

3-2-3- التمهيد (Smoothing) : وتعني به إزالة الحوادث العارضة من السلسلة الزمنية (التذبذبات الحادة و العشوائية) عنها لتسهيل عملية التحليل و التفسير .

3-2-3-1- التمهيد بواسطة المتوسطات المتحركة البسيطة : وهي أبسط طريقة نتناولها فيما يلي :

$$\tilde{y}_t = \frac{1}{n} (y_t + y_{t-1} + \dots + y_{t-n+1})$$

$$\tilde{y}_t = \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n-1} y_{t-r}$$

في حالة المعطيات الفصلية نختار $n = 4$ ، في حالة المعطيات الشهرية $n = 12$ ، أما في الحالات تختار بطريقة عفوية، إلا أن لهذه الطريقة عدة مآخذ منها أنها تمهد السلسلة الزمنية اعتماداً على المشاهدات الماضية، ولم تأخذ المستقبلية بعين الإعتبار⁽⁴⁾ .

3-2-3-2- المتوسطات المتحركة المركبة (Centred Moving Average) :

هذه الطريقة تأخذ بعين الإعتبار الإنقاد السابق :

$$\hat{y}_t = \frac{1}{n} \sum_{r=\left(\frac{n-1}{2}\right)}^{\left(\frac{n-1}{2}\right)} y_{t-r} : \text{فريدة (Odd)}$$

$$\hat{y}_t = \frac{1}{n} \sum_{r=\left(\frac{n}{2}\right)}^{\left(\frac{n}{2}\right)} D_t y_{t-r} : \text{زوجية (even)}$$

حيث : D_t متغير تمثيلي (Dummy Variable) بأخذ :

$$D_t = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{if } r = \pm \frac{n}{2} \\ 1 & \text{if } -\frac{n}{2} < r < \frac{n}{2} \end{cases}$$

3-2-3- طرق التمهيد الأسي:

هذه الطريقة تعتمد أساساً ومشتقة من نموذج براون (Brown) ، والسمى بـ : (EWMA) ، أين تستعمل هذه الطرق في عمليات التوقع الخاصة بالسلسلات الزمنية .

3-2-3-1- نموذج التمهيد الأسي للأحادي⁽²⁾ : هذه الطريقة قابلة للإستعمال في حالة السلسلة الزمنية التي تسلك مساراً عشوائياً حول وسط حسابي ثابت، بمعنى أنها لا تحتوي لا مركبة اتجاه عام، ولا تقلباً فصلياً .

⁽⁴⁾ من المرجع [م. حشمان-02] ، ص 69

Single Exponential smoothing⁽²⁾

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

فالتمهيد بواسطة المتوسط المتحرك يعطي جميع البيانات نفس الأهمية وبالتالي فإن القيم القديمة نوعاً تؤثر نفس التأثير كالقيم الحديثة وهذا قد لا يكون من الناحية العملية صحيحاً، أما التمهيد الأسني فهو على العكس يعطي القيم الأكثر حداثة أهمية أكبر والقيم الأخرى تعطي أهمية تتناقص أسيّا مع قدمها. فمثلاً لو كان لدينا مشاهدات من متسلسلة زمنية z_1, z_2, \dots, z_n فال المتوسط المتحرك من الدرجة m للمشاهدات يحسب من العلاقة التالية :

$$\hat{z}_t = \frac{1}{m} (z_t + z_{t-1} + z_{t-2} + \dots + z_{t-m+1}), t = m, m+1, \dots, n$$

والتي يمكن كتابتها كما يلي :

$$\hat{z}_t = \frac{1}{m} z_t + \frac{1}{m} z_{t-1} + \frac{1}{m} z_{t-2} + \dots + \frac{1}{m} z_{t-m+1}, t = m, m+1, \dots, n$$

$$\hat{z}_t = \beta z_t + \beta z_{t-1} + \beta z_{t-2} + \dots + \beta z_{t-m+1}, t = m, m+1, \dots, n, \beta = \frac{1}{m}$$

أي أن المتوسط المتحرك يعطي جميع البيانات نفس الوزن β .

الآن لو أعطينا البيانات أوزان تتناقص أسيّا مع بُعد المشاهدات عن القيمة الحاضرة z كالتالي :

$$s_t = \alpha z_t + \alpha(1-\alpha)z_{t-1} + \alpha(1-\alpha)^2 z_{t-2} + \dots, t = 1, 2, \dots, n, 0 < \alpha < 1$$

القيمة s هي متوسط موزون بأوزان تتناقص أسيّا لجميع القيم السابقة وهذا ما يسمى بالتمهيد الأسني البسيط ويكتب بشكل

تكراري :

$$s_t = \alpha z_t + \alpha(1-\alpha)s_{t-1}, t = 1, 2, \dots, n, s_0 = \bar{z}$$

وتحل التوقعات كما يلي⁽⁴⁾ :

$$z_n(\ell) = s_n, \ell \geq 1$$

إن هذه التقنية تمتاز بأنها سهلة الإستخدام، إلا أن مسألة تحديد ثابت التمهيد α يبقى المشكل الرئيس لهذه الطريقة، فإذا كانت α قريبة من 1 الصحيح فإننا نكون قد منحنا أهمية كبيرة للمشاهدات الفعلية الأخيرة، وبالعكس كلما كانت α أصغر من 1 الصحيح كلما توزعت الأهمية على عدد كبير من المشاهدات السابقة، ومن أجل معرفة قيمة α التي تعطي أفضل النتائج علينا حساب الإنحراف المعياري للتوقع، ومن ثم اختيار قيمة α المقابلة لأقل انحراف معياري للتوقع⁽²⁾.

3-2-3- نموذج التمهيد الأسني الثنائي⁽³⁾ : إذا كانت السلسلة الزمنية تحتوي إضافة إلى المركبة العشوائية

مركبة اتجاه عام، حيث وبطريقة انحداريه يمكن التعبير عنها كما يلي : $y_t = b_0 + b_1 t + u_t$ ،

أين : $b_0 + b_1 t$ تمثل مركبة الاتجاه العام الخطى، و u_t تمثل المركبة العشوائية، فيمكن تمثيلها بهذه الطريقة على

مرحلتين كما يلي⁽⁴⁾ :

⁽¹⁾ من المرجع [ع.برى-٠٢]، ص ١٧٣.

⁽²⁾ أنظر المرجع [ع.شاربى-٠٠]، ص ٦٦ - ٦٧ .

⁽³⁾ Double Exponential smoothing

⁽⁴⁾ من المرجع [G.Chevillon-٠٤]، ص ٣٠

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه

$$\tilde{y}_T = \alpha y_T + (1-\alpha) \tilde{y}_{T-1} : *$$

* **المرحلة الثانية** : ويتم حساب العلمتين كما يلي :

$$b_1 = \frac{\alpha}{1-\alpha} (\tilde{y}_T - \tilde{\bar{y}}_Y) \quad , \quad b_0 = 2\tilde{y}_T - \tilde{\bar{y}}_T$$

و التوقع يكون كما يلى :

3-3-3- نموذج هولت : يُلْجأ إلى هذه الطريقة في نفس الظروف التي تستعمل فيها التقنية السابقة، وهذا طبعاً لا يعني أنها تعطى نفس النتائج، وت تكون هذه الطريقة من معادلتين وكذا تابثي تمهيد أحدهما خاص بالعشوانية والآخر بالاتجاه العام، و تكتب كما يلي⁽⁴⁾ :

$$\tilde{y}_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(\tilde{y}_{t-1} + r_{t-1})$$

$$r_t = \gamma(\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1}) + (1-\gamma)r_{t-1}$$

وللتخلص من مشكل قيم الإنطلاق، نقترح من بين مجموعة من الصيغ، الصيغتين التاليتين:

$$r_2 = y_2 - y_1 \quad : \text{و} \quad \tilde{y}_2 = y_2 : \text{أو} \quad r_1 = 0 \quad \text{و} \quad \tilde{y}_1 = y_1$$

وبهذا تنطلق عملية التمهيد من الفترة (٢) في الحالة الأولى، ومن (٣) في الثانية، ولأغراض التوقع نكتب تلك المعادلتين

في الصيغة المعدلة التالية :

4-3-2-3- طريقة التفكيك (Decomposition Methods) : تتمثل هذه الطريقة في إزالة أو نزع مركبة

الاتجاه العام من السلسلة الزمنية بطريقة ملائمة، ثم تمهيد السلسلة الناتجة و الخالية من المركبة المنزوعة بطريقة التمهيد الأسوي الأحادي في هذه الحالة، فالقيام بعملية التوقع بطريقة عكسية .

١-٤-٣-٢-٣ - طرق إزالة مركبة الاتجاه العام : هناك طريقتين من أجل استبعاد مركبة الاتجاه العام الخطى

⁽²⁾ خاصية، هما طرفيتي: الفروقات من الدرجة الأولى، والطريقة الانحدارية.

١-١-٤-٣-٢-٣-١- طريقة الفروقات من الدرجة الأولى : تتم بتطبيق العلاقة التالية : $y_i - y_{i-1} = \nabla y$ ، أين

٦) **WY**: هي السلسلة الخالية من الاتجاه العام، فإذا كانت لدينا السلسلة التالية، المعبر عنها بالعلاقة التجميعية كما

يلعب: $y_t = \alpha + \beta X_t + \gamma u_t$ ، أين $\alpha + \gamma t$ تتمثل في مركبة الاتجاه العام، ويتطبق طريقة الفروقات من

$$\nabla v_i \equiv W_i \equiv v_i - v_{i+1}$$

$$W \equiv (\alpha + \beta X + \gamma + u_t) = (\alpha + \beta X + \gamma(t-1) + u_{t-1})$$

$$=\beta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_{-i})+\gamma(t-1)(t-1))+(\mathbf{y}-\mathbf{y}_{-i})$$

$$= \beta(\mathbb{X} - \mathbb{X}_{-1}) + \gamma + V$$

$$= w + \beta z + V$$

وهذه السلسلة الأخبة خالية من الاتجاه العام، أين لدينا :

31 [G.Chevillon-94] \Rightarrow \perp (1)

⁽²⁾ يمكن استعمال وبعد القيام بتعديلها، بسيط لهذه التقنيات مع الاتجاه العام غير الخط

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

٣-٢-٤-١-٢- الطريقة الإنحدارية :

إذا كان لدينا النموذج التالي: $y_t = \alpha + \beta t + e_t$ تمثل المركبة العشوائية، ونريد إبعاد مركبة الإتجاه العام منها بهذه الطريقة كما يلي :

أ- تقدير المعادلة السالفة الذكر بطريقة OLS، والحصول على تقدير مركبة الإتجاه العام $\hat{\alpha} + \hat{\beta}t = \hat{y}$ ، ومنه فإن :

$$y_t = \hat{\alpha} + \hat{\beta}t + e_t$$

ب- الإزالة (وتقى بطرح تقدير الإتجاه العام من السلسلة الزمنية) : $e_t = y_t - (\hat{\alpha} + \hat{\beta}t)$ ، وتكون e_t أي الباقي هي السلسلة الزمنية الجديدة الخالية من الإتجاه العام، وهنا يمكن تمثيل e_t بطريقة التمهيد الأسوي الأحادي المذكور سابقاً، فالتوقع يكون كما يلي :

$$\hat{e}_{T+1} = \alpha e_T + (1-\alpha) \tilde{e}_T$$

و يتم التوقع النهائي وفق العلاقة الشاملة التالية :

$$\hat{y}_{T+1} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}(T+1) + \hat{e}_{T+1}$$

كما نشير في الأخير أن الأغلبية يفضلون استعمال الطريقة الأولى من أجل إزالة مركبة الإتجاه العام .

٤- المركبة الفصلية وكيفية التعامل معها :

رأينا كيفية التعامل مع سلسلة زمنية ذات مركبة اتجاه عام إضافة على العشوائية، فننتقل الآن إلى كيفية التعامل، ثم التوقع بنموذج سلسلة زمنية ذات مركبة فصلية (دورية) إضافة إلى المركبتين السابقتين .

٤-١- طرق إزالة المركبة الموسمية :

يتم التعامل مع إزالة الفصلية بنفس المنهجية التي تعاملنا بها مع الإتجاه العام، حيث تتم إزالتها من السلسلة الزمنية، ثم تُردد إليها للحصول على التوقع النهائي الشامل لكل المركبات الموجودة أصلاً في السلسلة الزمنية، كما يمكن نمذجتها مباشرة وفقاً لطريقة (Holt-Winters) ذات الثلاث معادلات أو طريقة (Buys - Ballot) في حالات خاصة^(١).
وفي السابق، ونظراً لعدم تطور أجهزة الحاسوب الآلي، كان من الصعب نمذجة الفصلية والإتجاه العام آنئياً، كونها تتطلب مجهودات جبارة لحساب المعاملات الثلاثة (α, β, γ) التي سنراها لاحقاً، التي تتطلب تطبيق طريقة البحث التشابكي (Grid Search) لتحديد قيمها، والتي تتضمن تدنية مجموع مربعات الباقي $\sum RSS$ ^(٢)، ومن ثم كانت عملية الإزالة ذات أهمية بالغة، وفيما يلي مجموعة من الطرق، والتي تستعمل لهذا الغرض، والتي يمكن تقسيمتها إلى فئتين، الأولى لا تحسب المؤشرات الفصلية، أما الثانية فتحسبها إضافة لعملية الإزالة .

^(١) من المرجع [م. حشمان-٠٢]، ص ٨٢ .

^(٢) انظر المرجع [ع. شريف-٨٢]، ص ٣٢-٣٣ .

الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه

١-١-٤-١ لا يتم حساب المؤشرات الفضائية : توجد هناك طرفيتين وهما :

لتكن لدينا افتراضاً سلسلة زمنية ذات مرکبتين الإتجاه العام والعشوائية، وفي شكل تجمعي كما يلي :

$$y_t = T_t + \varepsilon_t$$

$$E(\varepsilon_t)^2 = \sigma^2 \text{ ، و } E(\varepsilon_t) = 0$$

$$VAR(y_t) = \sigma^2 \text{ و } E(y_t) = T_t \text{ و منه}$$

فإذا استعما بطريقة المتوسطات المتحركة البسيطة، فإن تباين \tilde{y}_t كما يلي :

$$= \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

ومنه فتباين السلسلة الزمنية المهددة يكون أقل من السلسلة الأصلية.

٤-١-١-٢- طريقة الفروقات : هذه الطريقة تصلح كذلك لإزالة الدورية من السلسلة الزمنية، و تكتب رياضياً كما

پلی:

$$\nabla^h y_t = y_t - y_{t-n}$$

$$B = (1 - B^p) y_t \text{ ، حيث : } B \text{ معامل التأخير}$$

حيث : في المطبيات الفصلية، والمطبيات الشهرية $p = 4$ ، $p = 12$ على الترتيب .

كما يمكن استعمال هذه الطريقة لازالة مركبة الإتجاه العام لما تكون $\mathbf{1} = p$ ، كما رأينا سابقاً، وعملية التوقع في هذه

الحالة (إزالة الفصلية) تتم بطريقة عكسية، ويمكن تلخيصها في المراحل التالية :

في علاقة الفروقات من الدرجة (p) استبدال (t) بـ $(T+1)$ ، كما يلي :

بعد التعويض تصبح :

لـ \hat{S}_T التردد بطريقة ملائمة للحصول على (\hat{S}_{T+1}) ، لأن تكون باستعمال نموذج التمهيد الأسوي الأحادي، مثلاً إن بقيت

السلسلة الزمنية بعد الإزالة عشوائية فقط : $\hat{y}_{T+1} = s\hat{a}_{T+1} + y_{T-p+1}$

١-٤- الطرق التي تزيل الفضالية مع حساب المؤشرات الفضالية :

ويتم فيها استعمال الطرق التالية:

١-٢-١-٤ طريقة النسب الموسمية: وتستعمل هذه الطريقة الجدول و الوسط الحسابي العام لحساب المؤشرات الفصلية(الموسمية)، إلا أنها لا تفرق بين الشكل الجدائي والتجمعي أثناء الحساب، ويمكن تلخيص هذه الطريقة فيما يلي :

C حساب الوسط الحسابي لمشاهدات كل سنة :

$$i = 1, 2, \dots, m$$

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

$$j = 1, 2, \dots, p$$

حيث : i دليل السنة، j دليل الفصل، أو الشهر مثلاً، وحسب المعطيات المستعملة .

● حساب الوسط الحسابي العام كما يلي :

$$\bar{\bar{y}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{y}_{ij}$$

● حساب الوسط الحسابي لكل فصل أو شهر عبر السنوات، لأن تجمع المشاهدات الخاصة بالفصل (الشهر) j لكل السنوات

$$\bar{y}_j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{y}_{ij}, \text{ أي :}$$

● حساب المؤشر الفصلي j كما يلي :

$$S_j = \frac{\tilde{y}_j}{\tilde{\bar{y}}}$$

● حساب السلسلة الزمنية الخالية من المركبة الموسمية كما يلي: $y_{ij}^a = \frac{y_{ij}}{S_j}$ ، والتوقع في هذه الحالة يتم بالشكل التالي:

$$y_{T+1,j}^a = \frac{y_{T+1,j}}{S_j}$$

أين j هنا، أضيف لفرض استبيان المشاهدة المقابلة للمؤشر الفصلي المعنى j ، أي ربط المشاهدة بالمؤشر الفصلي المقابل لها، ومنه يكون التوقع للفترة h كما يلي : $\hat{y}_{T+h,j} = \hat{y}_{T+h,j}^a S_j$.

١-٢-٢- طريقة المتوسطات المتحركة النسبية^(٤) : تمتاز عن سابقتها في أنها تستطيع التفرقة بين الشكلين الجدائي والتجمعي للسلسلة الزمنية، و كما نعلم فإن السلسلة الزمنية تتكون من أربعة مركبات كما يلي :

$$y_{ij} = f(T_{ij}, C_{ij}, S_{ij}, \varepsilon_{ij})$$

وبما أن المؤشرات الفصلية ثابتة (أي أن المؤشر الفصلي الأول لهذه السنة يساوي المؤشر الفصلي الأول للسنة الماضية أو القادمة) في هذه الطريقة، ومن ثم :

$$y_{ij} = f(T_{ij}, C_{ij}, S_{ij}, \varepsilon_{ij})$$

والآن يمكن تلخيص هذه الطريقة في المراحل التالية :

أ- في حالة النموذم الجدائي : تكون السلسلة الزمنية في هذه الحالة كما يلي :

$$y_{ij} = f(T_{ij}, C_{ij}, S_{ij}, \varepsilon_{ij})$$

● بتطبيق طريقة المتوسطات المتحركة المركزة للتمهيد، نقوم بعزل المركبة الفصلية والعشوائية من السلسلة الزمنية، وينتج ما يلي :

$$\tilde{y}_{ij} = T_{ij} \cdot C_{ij}$$

● تقسيم السلسلة الأصلية على الناتجة، فنحصل على المركبتين الفصلية، والعشوائية فقط كما يلي :

$$z_{ij} = S_{ij} \varepsilon_{ij}$$

^(٤) من المرجع [م. حشمان-٠٢] ، ص ٩٠ .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

● حساب المؤشر الفصلي : ويتم ذلك بقسمة مشاهدات الفصل "j" الخاصة بكل سنة للسلسلة الأخيرة على عدد السنوات

$$j = 1, 2, \dots, p, \text{ حيث } S_j = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^{m-1} z_{ij}, m-1$$

● يُشترط أن يكون مجموع المؤشرات الفصصية يعادل عدد المشاهدات الخاصة بكل سنة (p) :

فإذا لم يتحقق الشرط نجوي عملية التحويل التالية لحساب المؤشرات الفصصية المعدلة، فإذا كان لدينا :

$$x = \sum_{j=1}^p S_j \neq p$$
$$\bar{S} = \frac{x}{p} = \frac{\sum S_j}{p}, s_j = \frac{S_j}{\bar{S}}, \text{ و } \text{فإن : } s_j = S_j \left(\frac{p}{x} \right)$$

● يتم حساب السلسلة الزمنية الحالية من الموسمية بقسمة السلسلة الأصلية على المؤشر الفصلي المقابل إن تحقق الشرط

$$y_{ij}^a = \frac{y_{ij}}{s_j}, \text{ أو على المؤشر المعدل إذا لم يتحقق الشرط :}$$

بـ- أما في الحالة التجميعية : $y_{ij} = T_{ij} + C_{ij} + S_j + \varepsilon_{ij}$ ، فيكون لدينا :

$$\tilde{y}_{ij} = T_{ij} + C_{ij} \quad \text{●}$$

$$\tilde{z}_{ij} = S_j + \varepsilon_{ij}, \quad \text{حيث : } \tilde{z}_{ij} = y_{ij} - \tilde{y}_{ij} \quad \text{●}$$

$$S_j = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^{m-1} z_{ij} \quad \text{●}$$

● الشرط : $s_j = S_j - \bar{S}$ ، وإذا لم يتحقق الشرط: $\sum_{j=1}^p S_j = 0$

● حساب السلسلة الحالية من الفصصية كما يلي: $y_{ij}^a = y_{ij} - s_j$.

٤-١-٣- الطريقة الإنحدارية : نفترض أنه لدينا سلسلة زمنية ذات مركبة موسمية بدورية مقدارها 4 ، $p = 4$

وبمركبة عشوائية فقط، وفي شكل تجميعي، ففي هذه الحالة نعبر عن المركبة الفصصية بالمتغيرات التمثيلية

(Dummy variables)، وكالتالي^(٤) :

﴿إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل الأول، $D_{1t} = 1$ ، وبالulos الأخرى $D_{1t} = 0$

﴿إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل الثاني، $D_{2t} = 1$ ، وبالulos الأخرى $D_{2t} = 0$

﴿إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل الثالث، $D_{3t} = 1$ ، وبالulos الأخرى $D_{3t} = 0$

﴿إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل الرابع، $D_{4t} = 1$ ، وبالulos الأخرى $D_{4t} = 0$

ويمكن نمذجة الفصصية في حالة الشكل التجميعي وبصفة عامة كالتالي :

$$y_t = \alpha + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j D_{jt} + u_t$$

^(٤) من المرجع [م. حشمان-٢٠٢]، ص ٩٨.

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

أما في الحالة الجدائية يمكن كتابتها في الشكل التالي :

$$y_t = \alpha \prod_{j=1}^{p-1} \gamma_j^{D_{jt}} \\ \Rightarrow y_t = \alpha \gamma_1^{D_{1t}} \cdot \gamma_2^{D_{2t}} \cdot \gamma_3^{D_{3t}} \cdot e^{u_t}$$

وباستعمال التحويلية اللوغاريتمية، فنحصل على التالي :

$$\ln(w_t) = \ln \alpha + \ln \gamma_1 D_{1t} + \ln \gamma_2 D_{2t} + \ln \gamma_3 D_{3t} + u_t$$

وهذا بافتراض التوزيع الطبيعي للأخطاء، أي : $u_t \sim N(0, \sigma^2)$

ويتم تقدير النموذج السابقين بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، وما يمكن ملاحظته هو غياب المؤشر الموسمى الرابع، وهذا بسبب وجود الحد التابع α في المعادلة، وللحصول على المؤشر الموسمى (P) الرابع هنا نستعين بالعلاقة التالية :

- في الحالة التجمعية : $S_p = - \sum_{j=1}^{p-1} S_j$
- في الحالة الجدائية : $S_p = P - \sum_{j=1}^{p-1} S_j$

وفي حالة كون الحد التابع غير معنوي إحصائيا، فإننا نزيل هذا الأخير ونُنظِّف المتغير التمثيلي (P) الرابع هنا.

ويصبح النموذج التجمعي والجدائي بالترتيب على النحو التالي :

$$y_t = \sum_{j=1}^P B_j D_{jt} + u_t \\ y_t = \left[\prod_{j=1}^P B_j^{D_{jt}} \right] e^{u_t}$$

وفي الأخير، تكون السلسلة الزمنية الخالية من الموسمية هي عبارة عن الباقي الناتجة من عملية التقدير هذه ،

$$\text{أي : } e_t = y_t - \hat{y}_t$$

وتكون عملية التوقع في هذه الحالة، أي بعد إزالة الفصلية متمثلة في إضافة المؤشر الفصلي المقابل(الحالات التجمعيه)، أو بضربه في المشاهدة المعدلة (الحالات الجدائية) في الفترة ($T+L$) والتي تكون قد تحصلنا عليها بطريقة توقعية ملائمة حسب العلاقة الموجودة في الحالات التجمعيه مثلًا، نكتب :

$$\hat{y}_{T+L,j} = \hat{y}_{T+L,j}^a + S_j$$

4-2-النمذجة :

دائماً وضمن نماذج الإستقطاب، يمكن نمذجة الفصلية بشكل مباشر⁽⁴⁾، وسوف نقتصر في هذا المجال على طريقة هولت - وينترز (Holt-Winters).

⁽⁴⁾ لقد تلاشت المعوقات في إجراء الحسابات وذلك بتواجد البرمجيات المتقدمة، أنظر الدراسة التطبيقية .

الفصل الأول : التوقع بالبيانات وأهم طرقه

٤-٢-١- طريقة هولت - وينترز (Holt-Winters) :

و هذه الطريقة تعكس مساهمة كل من Holt و Winters ، بالإضافة إلى معادلة هولت Holt ، تلك الخاصة بالركبة الموسمية ، ويمكن كتابة النموذج الجديد وبشكل من التحويل ، حتى يتجاوب مع المركبات الثلاثة و آنذاك كما يلي :

$$\tilde{y}_t = \alpha(y_t^a) + (1-\alpha)(\tilde{y}_{t-1} + r_{t-1})$$

$$r_t = \gamma(\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1}) + (1-\gamma)r_{t-1}$$

$$s_t = \beta(z_t) + (1-\beta)s_{t-p}$$

حيث في الحالة التجميعية : $z_t = y_t - \tilde{y}_t$ ، $y_t^a = y_t - s_{t-p}$

$$\text{بينما في الحالة الجدائية : } z_t = \frac{y_t}{\tilde{y}_t} \quad y_t^a = \frac{y_t}{s_{t-p}}$$

و تمتاز هذه الطريقة في أنها ذاتية التعديل ، وبالتالي تكون مؤشراتها الفصلية ليست بالضرورة متساوية لمؤشرات السنة التي قبلها أو بعدها ، كما يتم حساب القيم α ، β ، γ على أساس تصغير مجموع مربعات الباقي e_t^2 ، $\sum RSS = \sum e_t^2$ ، أين e_t تساوي : $e_t = y_t - \hat{y}_t$ ، وبدورها \hat{y}_t تحسب في الحالتين الجدائية والتجميعية كما يلي :

$$\hat{y}_t = (y_t + r_s)s_{t-p}$$

$$t = (p+1), T, \hat{y}_t = (\tilde{y}_t + r_s) + s_{t-p}$$

صعوبات ذكر منها :

١- مشكلة نقاط الإنطلاق يمكن حلها إما بوضع كل القيم الإبتدائية متساوية للصفر ، وخاصة في حالة كون عدد المشاهدات كبيراً ، أو بحساب القيم الإبتدائية ، حيث تبدأ عملية التمهيد من الفترة الزمنية $(P+1)$ لذلك وجب توفير القيم

الابتدائية للعملية كما يلي^(١) : $r_p = (y_p - \tilde{y}_p)$ ، كذلك $(\tilde{y}_p = y_p - s_{p-1})$

وأخيراً :

$$S_t = \frac{y_t}{\bar{y}}, \forall t = 1, p$$

بـ- صيغة معادلة التوقع ، وهنا يجب الإشارة إلى الإحتفاظ بالمؤشرات الفصلية الأخيرة لاستعمالها في التوقع المستقبلي ، ووفق ذلك تكون معادلة التوقع في الحالتين التجميعية ، والجدائية على الترتيب .

$$y_{T+h} = (\tilde{y}_T + hr_T) + S_{(T+h)-p}$$

$$y_{T+h} = (\tilde{y}_T + hr_T)S_{(T+h)-p}$$

وفي حالة ($h=1$) ، فإن المعادلتين تصبحان كما يلي :

$$y_{T+1} = (\tilde{y}_T + hr_T) + S_{(T+1)-p}$$

$$y_{T+1} = (\tilde{y}_T + hr_T)S_{(T+1)-p}$$

^(١) من المرجع [G.Anstion-90] ، ص 194.

ملخص الفصل الأول

يرى هنري فايول، و الذي يعتبر الأب الحقيقي لعلم الإدارة أن قوة التوقع بالأشياء قبل حدوثها هو جوهر الإدارة، فالقياس بتوقعات جيدة بالبيعات يسمح للمؤسسة بالتنبئ الأمثل لها والوصول إلى الهدف المطلوب، وذلك باتباع الطرق السليمة والصحيحة والإعتماد على الأسس العلمية والطرق الرياضية والإحصائية لعملية التوقع، حيث أنه وإذا كانت النتائج المتحصل عليها أكبر من البيعات المحققة فعلاً، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التخزين، أما في حالة كون النتائج المتحصل عليها أقل من الطلب الحقيقي، فينجم عن ذلك حدوث فجوات واحتنيقات في الإنتاج، مما يلزم المنشأة بتشغيل العاملين أوقاتاً إضافية من أجل تغطية الطلبيات الضائعة للحفاظ على سمعتها، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان قسط من الأرباح المتوقعة من البيعات بسبب زيادة التكاليف المتمثلة في دفع أجور إضافية للعمال، ولهذا يتطلب نجاح عملية التوقع

بالمبيعات ما يلي :

- ✓ الخبرة والمهارة الكافية في القائمين بعملية التوقع ،
- ✓ توفر المعطيات عن ماضي الظاهرة المدرستة ،
- ✓ تحديد وتحليل العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر في الطلب على المبيعات ،
- ✓ مراقبة المبيعات باستمرار بهدف معرفة الإنحرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وكما رأينا، فبالنسبة لعملية التوقع باستعمال النماذج الإنحدارية، فإنه وكأي نموذج قياسي، نبدأ بتحديد النموذج، ثم تأتي مرحلة التقدير، فاختبار معنوية العلمات بواسطة الأدوات الإختبارية، إلا أن أكبر عائق أمام تطبيق هذه النماذج هو في حجم المعطيات الواجب توفرها والتي تخص معطيات المتغير التابع ومعطيات المتغيرات المستقلة .

كما تطرّقنا إلى نماذج الأوساط المتحركة، المسح الأسوي، تفكير السلسلة الزمنية، إلا أن أكبر نقص يعترى مثل هاته الطرق هي في حالة كون القانون الذي يحكم الظاهرة المدرستة لا يتلاءم والقانون الأساسي المقترن من طرف هذه النماذج .

ولذا جاءت طريقة بوكس- جنكينز من أجل تغطية النقائص التي تعاني منها هذه النماذج، والتي لها ميزات تجعلها تتتفوق على تلك النماذج السالفة الذكر، منها أنها تتطلب توفر معطيات لمتغير واحد مم يُقلص من حجم المعطيات المعالجة مقارنة بنموذج الإنحدار المتعدد مثلاً، كمان التوقع بواسطة هذه النماذج ليس مبني على قواعد ثابتة وإنما هو فن يعتمد على خبرة الباحث في تحديد درجة النموذج المناسب .

إن هذه الميزات هي التي أعطت الأهمية لهذه الطريقة، وهذا ما سوف نراه في الفصل المواري، والذي سوف نتناول فيه هذه النماذج بكثير من التفصيل.

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

«**المبحث الأول : التعريف بمشكلة عدم تبات التباين وأهم**

اختبارات الكشف عليها

«**المبحث الثاني : نمذجة عدم تبات التباين المشروط**

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

تمهيد :

من خلال دراستنا للنماذج العشوائية للسلسلات الزمنية SARIMA، أو النماذج الموسعة ARMA، حيث أن هذه النماذج تقوم بنمذجة مجموعة من المشاهدات المختلفة بناءً على ماضي هذه المشاهدات، أي :

$$Y_t = f(Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots) + \varepsilon_t$$

أين ε_t عبارة عن تشويش أبيض (ضجة بيضاء)، وتحت الفرضيات المعيارية، والتي تفرض تباين التباين $V(\varepsilon_t) = \sigma^2$.

لكن في المقابل وفي بعض الحالات، فإن الفرضية الأساسية للنماذج السابقة، والتي تنص على تباين التباين ليست صحيحة دائمًا، حيث أنها لا تستطيع تتبع أثر السلسلة الزمنية التي تميز بأنها قابلة للتقلب (Volatility)، حيث تتوقع أن اتجاه مكونات هذه السلسلة الآن ليس هو نفسه غداً، أو الشهر القادم، وهكذا .

هذا السلوك هو ما يُعرف بعدم تباين التباين (Heteroscedasticity)، وهذا ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل في هذا الفصل، وسوف نبدأ في البحث الأول بالتعريف بمشكلة عدم تباين التباين، واختبارات الكشف عنها، وفي البحث الثاني سوف نتناول أشكال النماذج ARCH - GARCH التي تأخذ في الحسبان عدم تباين التباين المشروط، وسوف نبدأ بالنموذج ARCH .

المبحث الأول : التعريف بمشكلة عدم تباين التباين وأهم اختبارات الكشف عليها

تقوم طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) في أحد أهم افتراضاتها على ثبات الحد العشوائي، ويُعرف هذا الإفتراض بالإنتشار المتساوي (Homoscedasticity) أو (Equal Squatter)، وإذا توافر هذا الإفتراض فإن (σ^2) الذي يشير إلى تباين قيم الباقي حول الخط المقدر، أو إلى تشتت القيم المشاهدة للمتغير التابع حول الخط المقدر يكون ثابتاً، أي يوجد تباين ثابت لجميع القيم المشاهدة حول خط الإنحدار المقدر، وفي حالة احتلال هذا الفرض تبرز لنا مشكلة ما يعرف بعدم تباين التباين (Heteroscedasticity)، وسوف نتعرض إلى التعريف بمشكل عدم تباين التباين، ثم إلى معايير الكشف عن هذه المشكلة .


١- تعريف مشكلة عدم تباين التباين : تتمثل مشكلة عدم تباين التباين في تغيير تباين الحد العشوائي مع تغيير قيم المتغير التفسيري، حيث أن هذا الإرتباط هو الذي يؤدي لعدم ثبات الحد العشوائي، وبالتالي يتربّط عليه الإخلال بأحد أهم افتراضات طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، وهو ثبات تباين الحد العشوائي^(٤)، ففرضية ثبات أو تجانس تباين التباين (Homoscedasticity) لجميع المشاهدات هي إحدى الفرضيات الأساسية التي يقوم النموذج الخطي العام والبسيط .

^(٤) انظر فرضيات نموذج الإتجاه العام الخطي، الصفحة رقم: ٤٢ من الفصل الأول .

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

إن افتراض تباين الخطأ لا يكون بالضرورة قائم على أساس موضوعية بالنسبة للبيانات الإحصائية الخاصة بالمتغيرات الإقتصادية، مثل ذلك البيانات المقطعيه الجزئية (Microeconomic Data)، فتشتت مشاهدات البيانات المقطعيه الجزئية الخاصة بالمتغير التابع قد يختلف من مستوى إلى آخر من مستويات المتغير، أو المتغيرات المستقلة، مثل ذلك البيانات الخاصة بدخل وإنفاق العوائل على المواد الغذائية، حيث نجد أن العوائل ذات الدخول المرتفعة تتمتع بمرونة كبيرة في الإنفاق على المواد الغذائية، إذ بمقدورها الإنفاق بحدود كبيرة تفوق معدل إنفاق فئتها إن وجدت إلى ذلك الرغبة والضرورة، كمانها في حالة عدم اندفاعها في الإستهلاك الغذائي، فإن إنفاقها يمكن أن يكون ضئيل جداً بالمقارنة مع معدل إنفاق فئتها على الغذاء، أما إنفاق العوائل ذات الدخول القليلة على المواد الغذائية فإنه يقع عادة ضمن حدود ضيقة، فالمعالاة في الإنفاق على المواد الغذائية أمر غير ممكن بسبب ضآلة ميزانية الأسرة، كمان خفض الإستهلاك إلى حدود دنيا تحت معدل استهلاك فئتها يسبب لها الهلاك البيولوجي.

وعليه فإن التشتت، وبالتالي التباين عند قيم الدخول (X_i) الكبيرة يكون أكبر من التشتت وبالتالي التباين عند قيم (X_i) الصغيرة، وهكذا نجد بأن فرضية تجانس تباين الخطأ تصبح عديمة الجدوى في مثل هذه الحالات .
والشكل البياني التالي ^(٤) يبين اختلاف التشتت عند مختلف مستويات المتغير المستقل .



المصدر : من المرجع [ع. شريف-٢٠١٨]، ص 276.

وبإبطال فرضية تباين الخطأ ، يعني أن هناك تبايناً للخطأ خاص بكل مشاهدة (i) كالآتي :

$$E(U_i)^2 = \sigma_i^2$$

ويطلق على ذلك تسمية عدم تباين التباين (Heteroscedasticity)، ويترتب على ذلك إبطال المعادلة (٣)، والتي ندرجها أدناه للمرة الثانية ^(٢) :

^(٤) من المرجع [ع. شريف-٢٠١٨]، ص 278.

^(٢) أنظر في الصفحة رقم: 47 من الفصل الأول .

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

$$E(U'U) = \sigma^2 \cdot I_n$$

إذ وكما هو معروف أن هذه المعادلة قائمة على الفرضين التاليين :

$$(1) E(U^2) = \sigma^2 \dots \dots$$

$$(2) E(U_i U_j) = 0 \dots \dots$$

وبالغاء الفرض الأول، وبالبقاء على الفرض الأخير، نحصل على حالة عدم تباين الخطأ، وتصبح قيمة

E(U'U) كالتالي :

$$E(U'U) = \sigma^2 \cdot \Omega = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix} \dots \dots \dots \quad (1-3)$$

حيث المصفوفة (Ω) تنطوي على توابع معلومة وموجبة، وهي مصفوفة محددة موجبة (Positive Define Matrix)، وذلك أن جميع محدداتها المصغرة الرئيسية موجبة، وسنرمز لعناصرها بالرمز الآتي:

$$\Omega = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{\lambda_n} \end{bmatrix} \dots \dots \dots \quad (2-3)$$

من المعادلتين (1-3) و (2-3) يتبيّن بأن :

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 \left(\frac{1}{\lambda_i} \right)$$

فإبطال المعادلة (2) يعني أن تقدير المربعات الصغرى لا يمكن أن يكون أفضل تقدير غير متخيّز (BLUE)⁽⁴⁾، ذلك أن

تقدير (OLS) يكون أفضل تقدير خطى غير متخيّز عند تحقق المعادلة المذكورة آنفاً، والذي يطلق عليه مصطلح

(Homoscedasticity)، وباختلال هذا الإفتراض تظهر مشكلة تغيير تباين الحد العشوائي التي تسمى

(Heteroscedasticity)، ومع وجود هذه المشكلة فإن المعلمات المقدرة بواسطة طريقة المربعات الصغرى العاديّة (OLS)

تتصف بعدم الكفاءة وإن كانت تتصرف بعدم التخيّز والإتساق، ويترتب عن هذه المشكلة آثاراً تتمثل فيما يلي⁽²⁾ :

أ - تبقى المعلمات المقدرة باستعمال طريقة OLS تتصرف بعدم الإتساق والتخيّز، ولكنها تفقد صفة الكفاءة .

ب - تصبح التباينات المقدرة، وكذلك التغيرات (Covariance) الخاصة بالمعلمات المقدرة متخيّزة وغير متسقة، ولذا فإن اختبارات الفروض لا تصبح دقيقة أو ملائمة .

⁽⁴⁾ هي اختصار لـ : Best Linear Unbiased Estimator

⁽²⁾ من المرجع [ع.ق. عطية-02] ، ص 438.

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

ج - بالرغم من أن التوقعات القائمة على أساس المعلمات المقدرة باستخدام طريقة OLS تظل غير متحيزة، إلا أنها تفقد صفة الكفاءة، وهو ما يعني أنها تكون أقل مصداقية من التوقعات الأخرى التي تُبنى على طرق تخلو من مشكلة عدم تباين التباين.

2- اختبارات الكشف عن مشكلة عدم تباين التباين :

توجد هناك العديد من الإختبارات للكشف عن هذه المشكلة وسوف نتعرض لبعض منها فيما يلي :

2-1- إختبار (Goldfeld - Quandt Test) :

لقد تم اقتراح هذا الإختبار من طرف كل من (Goldfeld - Quandt) سنة 1965 ، وتقوم فكرة هذا الإختبار على أنه لو ظل تباين الباقي متساوياً عبر المشاهدات كلها، فإن هذا التباين بالنسبة لجزء من العينة سوف يكون مساوياً لتباين جزء آخر من نفس العينة، ولذا تُقسم العينة إلى ثلاث أقسام ويُستبعد القسم في المنتصف، ثم يتم حساب تباين الباقي بالنسبة للجزء الأول الجزء الثالث، ويتم إختبار مدى تساويهما باستخدام إختبار (FISHER)، وتمثل خطوات الإختبار فيما يلي⁽¹⁾ :

1- نقوم بتحديد متغير يعتقد أن تباين الباقي (σ_{μ}^2) على علاقة ارتباطية به، وقد يكون هذا المتغير أحد المتغيرات التفسيرية في النموذج أو قد يكون متغير مستحدث من أحد هذه المتغيرات التفسيرية كالتربيع، أو اللوغاريتم الطبيعي، ونفترض أن هذا المتغير هو (z).

2- نقوم بترتيب البيانات وفقاً لترتيب قيم (z) تصاعدياً (أي بيانات جميع المتغيرات التابعة و المستقلة).

3- نقوم بتقسيم عدد مشاهدات العينة (n) إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول حجمه (n_1) ، والجزء الثالث (n_3) ، والجزء الوسط يتراوح بين ($n_1 + 1$) إلى ($n - n_2$) ، ولكن يتبع أن يكون (n_1) ، (n_2) أكبر من عدد المعلمات المقدرة في كل مرة حتى تكون درجات الحرية (df) أكبر من الصفر .

4- نقوم بتقدير معادلة انحدار مستقلة للجزء الأول والأخير من العينة .

5- نحصل على مجموع مربعات الأخطاء كما يلي :

$$ESS_1 = \sum_{t=1}^{n_1} e_t^2$$

$$ESS_2 = \sum_{t=n-n_2+1}^n e_t^2$$

6- نقوم تحديد F_C^* المحسوبة باستخدام الصيغة التالية :

$$F_C^* = \frac{\hat{\delta}_2^2}{\hat{\delta}_1^2} = \frac{ESS_2 / (n_2 - k)}{ESS_1 / (n_1 - k)}$$

حيث: k تمثل عدد المعلمات المقدرة في الانحدار بما فيها المعلمة التقاطعية .

7- نريد إختبار هل هناك اختلاف جوهري بين $\hat{\delta}_1^2$ و $\hat{\delta}_2^2$ ، ومن ثم تكون الفروض محل الإختبار كما يلي :

⁽¹⁾ من المرجع [ع.ق.م. عطية-٢٠٠]، ص ٤٤٠

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

فرض العدم : $H_0: \hat{\delta}_1^2 = \hat{\delta}_2^2$ (تبات تباين الباقي) ،

في مقابل الفرض البديل H_1 (تغير تباين الباقي) .

و لعمل ذلك نبحث عن $(F_{n_1-k}^{n_2-k})_{\alpha}$ في الجداول عند مستوى المعنوية الإحصائية $\alpha: 5\% \text{ أو } 10\%$ ونقارنهما ، فإذا كانت $F_c > F_t$ نرفض الفرض العددي ، ونقبل الفرض البديل القائل بوجود تغير في التباين ، والعكس صحيح .

ويلاحظ أنه في إذا كانت $(F_C < 1)$ عند المقارنة مع F_T ، ذلك لأن الفرض البديل عادة ما يكون: $\hat{\delta}_2^2 > \hat{\delta}_1^2$.

٢-٢-إختبار (Breush - Pagan Test) ^(١):

لقد تم تقديم هذا الإختبار في سنة 1979 ، وهو يعتمد على فكرة مضاعف لاغرانج (Lagrange Multiplier) ، وإذا افترضنا أن تباين الباقي (δ_t^2) يتغير مع تغير عدد المتغيرات التفسيرية (Z_t) التي يوجد بعضها أو كلها بالنموذج الأصلي ، حيث :

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \dots + \beta_k X_{kt} + u_t$$

$$\delta_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 Z_{1t} + \alpha_2 Z_{2t} + \dots + \alpha_p Z_{pt}$$

فإن هذه المشكلة تكون موجودة إذا كانت $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ معنوية إحصائياً .

وبالطبع تختفي المشكلة إذا كانت $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0$ ، ولذا فإن فرض العدم في هذه الحالة يكون كما يلي :

$$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_p = 0$$

و لإجراء الإختبار السابق نتبع الخطوات التالية :

١- نقوم بتقدير معادلة الإنحدار الأصلية باستخدام طريقة OLS .

$$\hat{Y}_t = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2t} + \hat{\beta}_3 X_{3t} + \dots + \hat{\beta}_k X_{kt} + e_t$$

٢- نقوم بالحصول على الباقي (e_t) ، حيث أن :

$$e_t = Y_t - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2t} - \hat{\beta}_3 X_{3t} - \dots - \hat{\beta}_k X_{kt}$$

ثم نقوم بحساب تباين الباقي باستخدام الصيغة التالية :

$$\hat{\delta}^2 = \frac{\sum e_t^2}{n}$$

٣- نقوم بتقدير مايسمي بالإنحدار المساعد ، وذلك بغرض إختبار مدى وجود علاقة جوهرية بين $(\hat{\delta}^2)$ (مثل تباين الحد العشوائي) ، والمتغيرات (Z) التي تمثل بعضاً ، أو كل المتغيرات التفسيرية بالنموذج الأصلي ، أو بعض مشتقاتها ، أي نقوم بتقدير التالي :

^(١) من المرجع [ع.ق. عطية-٤٥٠] ، ص ٤٤٥

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

$$\frac{e_t^2}{\delta_t^2} = \alpha_0 + \alpha_1 Z_{1t} + \dots + \alpha_p Z_{pt} + V_t \dots \dots \dots \quad (3-3)$$

٤- يتم إختبار فرض عدم كما يلي :

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0$$

و يمكن إثبات أنه في حالة العينات الكبيرة، وفي ظل فرض عدم السابق فإن نصف مجموع مربعات الإنحدار المقدر

الصيغة (3-3) له توزيع χ^2 عند درجات حرية (p) (عدد المعلمات المقدرة في صيغة الإنحدار المساعد) و مستوى المعنوية ١% أو ٥% .

٥- في حالة : $\left[\frac{RSS}{2} \right] > \chi^2_{p,\alpha}$

:^(٤) إختبار (White)

مم يؤخذ على اختبار (Breush - Pagan Test) الأخير، أنه حساس جدًا لاختلال افتراض التوزيع الطبيعي، كما يتطلب هو واختبار (Goldfeld - Quandt) معرفة أسباب مشكلة عدم ثبات التباين، ومن خصائص هذا الإختبار أنه:

أ- لا يتطلب معلومات سابقة عن أسباب مشكلة عدم تساوي الانتشار (عدم ثبات التباين)،

ب- لا يعتمد على افتراض اعتدال التوزيع ،

ج- يصلح عادة للعينات كبيرة الحجم، أي يصلح للعينات من الحجم ٣٠، أو أكثر وتمثل خطوات إجراء هذا الإختبار فيما يلي:

١- تقدير دالة الإنحدار الأصلية باستخدام طريقة OLS :

$$\hat{Y}_t = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2t} + \hat{\beta}_3 X_{3t} + \dots + \hat{\beta}_k X_{kt} + e_t$$

٢- الحصول على قيم الباقي (e_t) على النحو التالي :

$$e_t = Y_t - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2t} - \hat{\beta}_3 X_{3t} - \dots - \hat{\beta}_k X_{kt}$$

٣- تقدير انحدار مساعد بين (e_t^2) من ناحية، و المتغيرات ($X_{2t}, X_{3t}, \dots, X_{kt}$) ، ($X_{2t}^2, X_{3t}^2, \dots, X_{kt}^2$) من ناحية أخرى، أي تقدير الصيغة :

$$e_t^2 = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 X_{2t} + \hat{\alpha}_2 X_{3t} + \hat{\alpha}_3 X_{2t}^2 + \hat{\alpha}_4 X_{3t}^2 + \dots + \hat{\alpha}_6 X_{2t} X_{3t} + V_t$$

٤- نقوم بتقدير (NR^2) ، حيث: N تمثل حجم العينة ، R^2 يمثل معامل التحديد غير المعدل للإنحدار المساعد الخاص بالعادلة الأخيرة .

٥- نقوم باختبار فرض عدم التالي : $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_3 = 0$ ، وذلك بمقارنة (NR^2) مع χ^2 عند مستوى معنوية ٥% أو ١% ، ودرجات حرية = عدد المعلمات الإنحدارية في صيغة الإنحدار المساعد (أي مع استبعاد المعلمة التقاطعية)،

^(٤) من المرجع [W.GREENE-٠٥]، ص ٢١٥

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

وإذا كان $NR^2 > \chi^2_{5,0.05}$ يتم رفض فرض العدم (H_0) ، وتوجد مشكلة ثبات التباين، وإذا كان العكس لا توجد هذه المشكلة، حيث تشير إلى أنه إذا قبلنا فرض العدم فإن هذا يعني أن : ثابت $\alpha_1 = \delta\varphi = 0$.

٤-٢- اختبار بارك (Park Test) :

من أجل إجراء هذا الإختبار يتعين القيام بما يلي^(١) :

نقوم بتقدير الصيغة الأصلية باستخدام طريقة (OLS) :

$$Y_t = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2t} + \hat{\beta}_3 X_{3t} + \dots + e_t$$

ثم نحصل على مربعات الباقي (e_t^2) ، ونقدر معادلة انحدار بينها وبين أحد المتغيرات التفسيرية، أو كلها على النحو التالي :

$$e_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \dots + V_t$$

فإذا كانت (α_i) ، أو بعضها لها معنوية إحصائية يكون هناك مشكلة انتشار غير متساوي (عدم ثبات التباين) .

^(١) من المرجع [ع.ق.م. عطية-٥٠]، ص ٤٤٩

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

المبحث الثاني : نمذجة عدم تباث التباين المشروط (Conditional Heteroscedasticity)

من أجل نمذجة عدم تباث التباين (Heteroscedasticity) في سنة 1982⁽¹⁾ باقتراح Robert F. Engle، قام (Heteroscedasticity) في مجلة "Econometrica"⁽²⁾، وهذا في مقالة علمية نشرت في مجلة "Econometrica" تحت عنوان : " Conditional Heteroscedasticity with Estimates Of the Variance Of U.K Inflation" وهذا بالأأخذ بعين الاعتبار عدم تباث التباين المشروط في النموذج، وبإظهار المدار الجبري للتشويش الأبيض بواسطة الإنحراف المعياري المشروط كما يلي :

$$Y_t = f(Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots) + \sigma_{(Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots)}$$

وسوف نقوم في هذا الفصل بالتعرف على هاته النماذج إنطلاقاً من النموذج ARCH من تعريف شكله، وذكر خصائصه، وكذا النموذج من الدرجة الأولى، ثم نعرّج على النموذج المعمم GARCH، وسوف نتعرّف على شكل النموذج، وذكر خصائصه، وكذا النموذج من الدرجة الأولى GARCH(1,1).

١ - نموذج ARCH(q)

سوف نبدأ أولاً بالتعريف بشكل النموذج، وذكر خصائصه كما يلي :

١-١- التعريف بشكل النموذج ARCH(q) :

نعتبر نموذج خطى ذي الانحدار الذاتي من الشكل ARCH(q) كالتالي⁽³⁾ :

$$Y_t = E(Y_t | Y_{t-1}) + \varepsilon_t$$

أين يكون ε_t عبارة عن تشويش أبيض ضعيف، حيث : $E(\varepsilon_t) = 0$ ، و $E(\varepsilon_t \varepsilon_s) = 0$ في حالة $t \neq s$.

وكنتيجة لشروط الفروق المضافة $E(Y_t | Y_{t-1}) = 0$ ، نفترض أن هذه الباوقي يمكن تقديمها من الشكل

كما يلي⁽⁴⁾ :

$$\varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t} , \quad h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 \dots \dots \quad (4-3) \quad \text{حيث :}$$

⁽¹⁾ صاحب جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 2003 معاً مع البريطاني Clive Granger عن دورهما في إيجاد نماذج التحليل الاقتصادي، وخاصة تحليل السلسلة الزمنية (نماذج ARCH)، والذين قاما بتطويرهما ابتداءً من بدايات سنوات الثمانينيات خاصة منها السلسلة الزمنية التي تهتم بتطورات الناتج الداخلي الخام (PIB)، أسعار معدلات الفائدة، البورصات.

⁽²⁾ ولد R.F. Engle سنة 1942 في سيراكوز (Syracuse) في ولاية نيويورك (New York)، كانت بدايات دراسته في علم الفيزياء، ثم انتقل إلى دراسة الاقتصاد في جامعة كورنيل، وحالياً فهو يشتغل أستاذًا في الإدارة المالية في جامعة نيويورك.

⁽³⁾ هي اختصار لـ Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity

⁽⁴⁾ من المرجع [C.HURLIN-04]، ص 21.

هناك بعض المراجع التي ترمز بـ σ_t^2 للتباین المشروط، وكذلك للأخطاء بالرمز a_t ، و ε_t ، وبالتالي يكون النموذج ARCH(q) كما يلي :

$$\varepsilon_t = a_t \sigma_t , \quad \sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i a_{t-i}^2$$

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

أين يكون z_t عبارة عن التشويش الأبيض بمتوسط يساوي الصفر، وتبالين يساوي 1، أي : $(0, 1) \sim z_t$

$$E(\varepsilon_t | \varepsilon_{t-1}) = 0 \quad , \quad V(\varepsilon_t | \varepsilon_{t-1}) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$$

وذلك : أي أن النموذج يكون كما يلي⁽¹⁾ :

$$\begin{cases} Y_t = \varepsilon_t \\ E(\varepsilon_t | \varepsilon_{t-1}) = 0 \\ E(\varepsilon_t^2 | \varepsilon_{t-1}) = h_t = c + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 , \alpha_q \neq 0. \end{cases}$$

كما يجب توفر الشرطين التاليين $\alpha_0 > 0$ ، إن المعاملات α_i يجب أن تتطابق مع الشروط القياسية من أجل ضمان أن التباين الغير المشروط ε_t يكون متمثلاً. حيث يفترض أن z_t يتبع التوزيع الطبيعي المعياري أو توزيع ستودنت المعياري (t - Stat).

1-2- النموذج ARCH من الدرجة الأولى : ARCH(1)

سوف نبدئ أولاً بتعريف النموذج، ثم ذكر خصائصه كما يلي :

1-2-1- التعريف بالنماذج ARCH(1)

يكون النموذج $\{\varepsilon_t\}$ خطياً في ARCH(1) إذا كان يكتب في الصيغة التالية⁽²⁾ :

$$\varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t} , \quad h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 , \quad \alpha_0 > 0, \alpha_1 \geq 0 \dots \dots \quad (5-3)$$

حيث $\{\varepsilon_t\}$ عبارة عن نموذج يمثل تشويشاً أبيضاً (ضجة بيضاء)، و z_t عبارة عن تغيرات جميع القيم في وحدة الزمن t ،

حيث : $\varepsilon_t | \varepsilon_{t-1} \sim N(0, h_t)$.

1-2-2- خصائص النماذج ARCH(1)

نقوم بدراسة النموذج من الدرجة الأولى ARCH(1) الموضح في الشكل التالي⁽³⁾، ومن ثم يمكننا تعميمها على النموذج

1-2-2- خصائص النماذج ARCH(q)

$$\text{أولاً: } \varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t} , \quad h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$$

أين : $\alpha_0 > 0$ وكذلك $\alpha_1 \geq 0$ ، فيكون المتوسط الغير المشروط ε_t مساوياً للصفر، وذلك لأن :

$$E(\varepsilon_t) = E[E(\varepsilon_t | \varepsilon_{t-1})] = E[h_t E(z_t)] = 0$$

ثانياً : من ناحية أخرى، فإن التباين الغير مشروط ε_t يُقدم على الشكل التالي :

⁽¹⁾ من المرجع [J.J.DROESBEKE-94] ، ص 53.

⁽²⁾ من المرجع [M.V.ASOKAN-01] ، ص 5.

⁽³⁾ من المرجع [R.S.TSAY-02] ، ص 83-85.

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

$$Var(\varepsilon_t) = E(\varepsilon_t^2) = E[E(\varepsilon_t^2 | \varepsilon_{t-1})] = E[\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2] = \alpha_0 + \alpha_1 E(\varepsilon_{t-1}^2)$$

وذلك لأن ε عبارة عن سلسلة مستقرة بوسط مساو للصفر، أي: $E(\varepsilon_t) = 0$ ، وتبالين تابث أي :

$$Var(\varepsilon_t) = Var(\varepsilon_{t-1}) = E(\varepsilon_{t-1}^2)$$

فيكون لدينا إذن: $Var(\varepsilon_t) = \alpha_0 / (1 - \alpha_1)$ ، $Var(\varepsilon_t) = \alpha_0 + \alpha_1 E(\varepsilon_{t-1}^2)$ ، وذلك لأن تابين ε يجب أن يكون موجباً، بشرط أن يكون $1 < \alpha_1$.

ثالثاً : في بعض الحالات يكون من الضروري وجود درجات عليا لـ ε ، ومن ثم فإن α_1 يجب كذلك أن يكافي بعض القيود الإضافية، وكمثال نفرض أن العزم الرابع لـ ε يكون منتهياً، حيث وتحت الفرضيات الطبيعية لـ ε في العلاقة (3-5)، فيكون لدينا الآتي :

$$E(\varepsilon_t^4 | \varepsilon_{t-1}) = 3E[\varepsilon_t^2 | \varepsilon_{t-1}]^2 = 3(\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2)^2$$

إذن :

$$E(\varepsilon_t^4) = E[E(\varepsilon_t^4 | \varepsilon_{t-1})] = 3(\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2)^2 = 3E[\alpha_0^2 + 2\alpha_0\alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_1^2\varepsilon_{t-1}^4]$$

إذا كانت ε مستقرة من الدرجة الرابعة بـ $(m_4 = E(\varepsilon_t^4))$ ، كمانه لدينا :

$$\begin{aligned} m_4 &= 3[\alpha_0^2 + 2\alpha_0\alpha_1 Var(\varepsilon_t) + \alpha_1^2 m_4] \\ &= 3\alpha_0^2 \left(1 + 2\frac{\alpha_1}{1 - \alpha_1}\right) + 3\alpha_1^2 m_4 \end{aligned}$$

وينتج لدينا ما يلي :

$$m_4 = \frac{3\alpha_0^2(1 + \alpha_1)}{(1 - \alpha_0)(1 - 3\alpha_1^2)}$$

حيث أن لهذه النتيجة الأخيرة تطبيقان هامان :

- ١- بمان العزم من الدرجة الرابعة لـ ε يكون موجباً، فإننا نجد أن قيمة α_1 تتحقق الشرط أن $0 < 1 - 3\alpha_1^2$ ، بالقياس إلى $0 < \alpha_1^2 < \frac{1}{3}$.

بـ - معامل التفريط الغير مشروط لـ ε يكون كال التالي :

$$\frac{E(\varepsilon_t^4)}{[Var(\varepsilon_t)]^2} = 3 \frac{\alpha_0^2(1 + \alpha_1)}{(1 - \alpha_0)(1 - 3\alpha_1^2)} \times \frac{(1 - \alpha_1)^2}{\alpha_0^2} = 3 \frac{1 - \alpha_1^2}{1 - 3\alpha_1^2} > 3$$

وهكذا، فإن زيادة التفريط لـ ε موجبة، وأن شكل توزيعها بطيء بالمقارنة مع التوزيع الطبيعي .

هذه الخاصية مقبولة لعموم نماذج ARCH، إلا أن هذه الصيغة تصبح أكثر صعوبة في حالة الرتب العليا للنموذج . وشرط $0 \leq \alpha_1 \leq 1$ في العلاقة السابقة (3-4) يعتبر الشرط الأساس من أجل ضمان أن التابين المشروط h_t يكون موجباً، وذلك من أجل كل قيمة لـ t .

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

١-٣-٢-١- شرط استقرارية النموذج : ARCH(1)

إنطلاقاً من شرط استقرارية النموذج ARCH(q) كما يلي :

$$\sum_{i=1}^q \alpha_i < 1 , \text{ هذا الشرط الأخير الذي يضمن إيجابية التباين، وبالتالي استقرارية النموذج (q)، وبالتالي}$$

فإن شرط استقرارية النموذج من الدرجة (الرتبة) الأولى تكون كما يلي :

$$0 < \alpha_1 < 1 .$$

١-٣-٢-٢- مآخذ النموذج (q) : ARCH(q)

على الرغم من الميزات التي يتميز بها هذا النظام، إلا أن له مآخذ وهي :

- إن النموذج يفترض أن البوافي الموجبة أو السالبة لها نفس التأثير على المتغير التابع، وذلك لأنها متعلقة بالبوافي المربعة السابقة. لكن في الواقع، أن بعض السلسلات الزمنية تستجيب حتماً لتغيير إشارة البوافي عكس فرض النموذج، خاصة منها السلسلة المالية .
- أنه في الواقع مقيد؛ وكمثال، فإن مقدار α_1^2 الخاص بالنماذج ARCH(1) تكون محصورة في المجال $[0, \frac{1}{3}]$ في حالة كون السلسلة الزمنية لها العزم من الدرجة الرابعة (m_4) منتهي، كما نشير على أن القيد الأخير يصبح أكثر صعوبة في حالة الدرجات (الرتب) العليا للنموذج .
- إن نموذج ARCH لا يمدنا إلا بالتغييرات الميكانيكية التي تحدث في التباين المشروط، ولا يبين الأسباب الدافعة لهاته التغييرات .
- إن نموذج ARCH من المحتمل أن يكون غير مجيء للتوقع للتغيرات التي تطرأ في السلسلة الزمنية، وذلك بسبب أنه يستجيب بصفة متباطئة للتغيرات العزولة لبوافي السلسلة الزمنية .

١-٤- بناء نموذج : ARCH

من أجل القيام ببناء هذا النموذج نقوم بثلاث خطوات وهي متشابهة مع بناء أي نموذج قياسي كما يلي:

- ١) تحديد النموذج القياسي كما تم ذلك لنموذج ARMA للسلسلة الزمنية الخام، وذلك لإزالة أي ارتباط خططي للمعويات وباستخدام بوافي السلسلة الزمنية للنموذج لاختبار أثر ARCH .
- ٢) تعبيين درجة (رتبة) ARCH، وتقدير النموذج .
- ٣) تشخيص توفيق (fitted) نموذج ARCH بدقة .

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

١-٤-١ - نمذجة واختبار النموذج :

يمكن استعمال الباقي مربعة (ϵ_t^2) لنموذج الإنحدار الذاتي AR من أجل اختبار عدم تبات التباين، فإذا كان لدينا عبارة عن بواقي خاصة بالنموذج $ARMA(p,q)$ ، حيث يوجد هناك اختباران يستعملان هنا، الإختبار الأول هو اختبار $Ljung-Box$ للباقي مربعة ϵ_t^2 ، والمقدم من طرف (Mcleod and Li) سنة 1983 ، أما الإختبار الثاني لعدم تبات التباين المنشروط هو اختبار (R.F.ENGLE) القائم من طرف (Lagrange Multiplier) في سنة 1982 لإنحدار الباقي المربعة ذات الفجوات الزمنية من الدرجة (q) ، إنطلاقاً من بواقي نموذج الإنحدار المساعد (Auxiliary Regression) ، الإختبار يحسب عن طريق العلاقة NR^2 ، أين يكون R^2 عبارة عن معامل التحديد للإنحدار المساعد ، و N عبارة حجم العينة للسلسلة الزمنية الأصلية، كمان الفرض العدمي (H_0) يتم رفضه إذا كانت قيمة الإختبار تفوق القيمة الحرجة لاختبار كاي - تربيع (χ^2) حيث (q) درجات الحرية، حيث أن هذا الإختبار الأخير يساوي استعمال إحصائية F الذي يستعمل لاختبار الفرض التالي: $\alpha_i = 0$ حيث أن ($i = 1, \dots, q$) في الإنحدار الخطى التالي :

$$\epsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q \epsilon_{t-q}^2 + e_t, \quad t = q+1, \dots, N$$

أين: e_t يعني الباقي، q عبارة عن عدد صحيح موجب ، و N عبارة عن حجم العينة .

$$\text{ولتكن ما يلي : } SSR_0 = \sum_{t=q+1}^N (\epsilon_t^2 - \bar{\epsilon})^2, \quad \text{أين تكون متوسط العينة لـ } \bar{\epsilon}.$$

$$\text{و : } SSR_1 = \sum_{t=q+1}^N \hat{\epsilon}_t^2, \quad \text{حيث أن } \hat{\epsilon}_t \text{ عبارة عن بواقي المربعات الصغرى لنموذج الإنحدار الخطى السابق ، ويكون لذينا} \\ \text{إذن (2) :}$$

$$F = \frac{(SSR_0 - SSR_1)/q}{SSR_1/(N-2q-1)}$$

حيث أن هذا الإختبار يكون قريباً من توزيع كاي - تربيع (χ^2) حيث (q) درجة الثقة تحت فرضية العدم ، حيث وفي حالة كون توزيع F معنوي إحصائياً ، وأن هناك وجود لعدم تبات التباين لـ ϵ_t^2 ، حيث تقوم باستعمال دالة الإرتباط الذاتي الجزئية (PACF) للباقي مربع (ϵ_t^2) من أجل تحديد درجة النموذج ARCH ، حيث أنه لذينا من نموذج التباين المنشروط السابق ما يلي :

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q \epsilon_{t-q}^2$$

من أجل عينة محددة ، حيث أن ϵ_t^2 عبارة عن مقدار غير متحيز لـ h_t .

⁽¹⁾ من المرجع [M.V.ASOKAN-01] ، ص 9.

⁽²⁾ من المرجع [R.S.TSAY-02] ، ص 87.

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

إذن، فإن ε_t^2 تكون على شكل علاقة خطية مع $\varepsilon_{t-1}^2, \dots, \varepsilon_{t-q}^2$ في أسلوب مشابه لنموذج الإنحدار الذاتي AR من الدرجة q . كما نذكر بأن ε_t^2 بصفة عامة ليست مقدراً كفؤاً لـ h_t ، ولكنها تفييناً كتقدير تقريبي في تعريف الدرجة q . ومن جهة أخرى، نعرف h_t كما يلي: $h_t = \varepsilon_t^2 + \eta_t$ ، حيث أن $\{\eta_t\}$ ليست عبارة عن سلسلة مرتبطة بوسط معروف، فالنموذج ARCH يصبح من الشكل التالي :

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2 + \eta_t$$

من أجل النموذج AR(q)، نتوقع بأن $\{\eta_t\}$ ليست سلسلة تتميز بأنها متتابعة من المتغيرات التي تكون مستقلة ولها توزيعات متطابقة IID⁽¹⁾، فإن دالة الإرتباط الذاتي الجزئية (PACF) لـ ε_t^2 هي إذن الوسيلة المناسبة من أجل تحديد الدرجة q للنموذج ARCH(q)، وذلك لأن $\{\eta_t\}$ ليست توزيع متطابق، مما نشير في الأخير إلى أن الدالة (PACF) لـ ε_t^2 ليست لها جدوى كبيرة في حالة كون حجم العينة صغير.

٤-٢-تقدير معلمات النموذج :

توجد هناك دالة معقولية عظمى تستعملان من أجل تقدير معلمات النموذج ARCH، وتحت الفرضيات التوزيع الطبيعي فإن دالة المعقولية العظمى للنموذج من الدرجة q : (ARCH(q)) تكون من الشكل التالي⁽²⁾ :

$$\begin{aligned} f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_T | \alpha) &= f(\varepsilon_T | F_{T-1}) f(\varepsilon_{T-1} | F_{T-2}) \dots f(\varepsilon_{q+1} | F_q) f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q | \alpha) \\ &= \prod_{t=q+1}^T \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_t^2}} \exp\left[-\frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma_t^2}\right] \times f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q | \alpha) \end{aligned}$$

أين $\alpha' = (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_q)$ ، وكذلك $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_q)$ فإنها تعني دالة الكثافة الإحتمالية المشتركة لقيم $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_T$. بعدها يكون كاملاً، في أحياناً كثيرة يتناقص بالمقارنة مع دالة المعقولية العظمى السابقة، خاصة إذا كانت حجم العينة كبيراً، هذه النتيجة الأخيرة في استعمال المعقولية العظمى المشروطة :

$$f(\varepsilon_{q+1}, \dots, \varepsilon_T | \alpha, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q) = \prod_{t=q+1}^T \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_t^2}} \exp\left[-\frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma_t^2}\right]$$

حيث أن التقدير يتم بواسطة تعظيم دالة المعقولية السابقة كتقدير المعقولية العظمى (MLE) المشروط بالتوزيع الطبيعي. إن تعظيم دالة المعقولية العظمى المشروطة يساوي إلى تعظيم اللوغاريتم الخاص بها، حيث أنه سهل التعامل معه، ومنه فإن دالة المعقولية العظمى المشروطة تكون من الشكل التالي :

$$f(\varepsilon_{q+1}, \dots, \varepsilon_T | \alpha, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q) = \sum_{t=q+1}^T \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln(h_t) - \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_t^2}{h_t}$$

IID: Independent Identically Distributed⁽⁴⁾

⁽²⁾ من المراجع [R.S.TSAY-02]، ص ص 89-88.

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

بمأن الحد الأول $\ln(2\pi)$ لا يتضمن أيًّا من المعلمات، فإن لوغاريتم دالة المعقولية يصبح بالشكل التالي :

$$\log(\varepsilon_{q+1}, \dots, \varepsilon_T | \alpha, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q) = - \sum_{t=q+1}^T \left[\frac{1}{2} \ln(h_t) + \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_t^2}{h_t} \right] .$$

$h_t = \alpha + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2$

أين يكون $z_t = \sqrt{h_t}$ ، حيث تكون z_t عبارة عن درجات الحرية، وكذلك :

$Var(v_t) = v / (v-2)$ ، وذلك من أجل $v > 2$ ، حيث تستعمل $z_t = x_v / \sqrt{v/(v-2)}$ ، فتكون دالة الكثافة الإحتمالية لـ z_t كما يلي :

$$f(z_t | v) = \frac{\Gamma((v+1)/2)}{\Pi(v/2) \sqrt{(v-2)\pi}} \left(1 + \frac{z_t^2}{v-2} \right)^{-(v+1)/2} , v > 2 \dots \dots \quad (6-3)$$

أين يكون لدينا من المعادلة (6-3) الأخيرة $\Gamma(x)$ هي عبارة عن دالة قاما (GAMMA) الإعتبارية ⁽⁴⁾، وبأخذ $\varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t}$ ، فنحصل على دالة المعقولية المشروطة لـ ε_t كما يلي :

$$f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_T | \alpha, A_q) = \prod_{t=q+1}^T \frac{\Gamma((v+1)/2)}{\Pi(v/2) \sqrt{(v-2)\pi}} \frac{1}{\sqrt{h_t}} \left[1 + \frac{z_t^2}{(v-2)h_t} \right]^{-(v+1)/2} .$$

$A_q = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_q)$

أين تكون $v > 2$ ، وكذلك $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_q)$

بالرجوع إلى التقديرات التي تعظم (Maximize) دالة المعقولية السابقة بوصفها مشروطة تحت توزيع ستودنت (t-Stat). إن درجات الثقة لهذا التوزيع الأخير يمكن تعبيتها مسبقاً أو تقديرها مع المعلمات الأخرى، حيث في كثير من الأحيان تستعمل القيمة 3 و 6 إذا كانت درجات الثقة v لتوزيع ستودنت (t-Stat) محددة، فتكون إذن اللوغاريتم دالة المعقولية المشروطة كما يلي :

$$\log(\varepsilon_{q+1}, \dots, \varepsilon_T | \alpha, A_q) = - \sum_{t=q+1}^T \left[\frac{v+1}{2} \ln \left(1 + \frac{\varepsilon_t^2}{(v-2)h_t} \right) + \frac{1}{2} \ln(h_t) \right] \dots \quad (7-3)$$

إذا كانت الإرادة في تقدير المعلمة v مشتركة مع المعلمات الأخرى، إذن فإن لوغاريتم دالة المعقولية تتضمن درجات الحرية

$$\begin{aligned} f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_T | \alpha, v, A_q) \\ = (T-q)[\ln(\Gamma((v+1)/2)) - \ln(\Pi(v/2)) - 0.5 \ln((v-2)\pi)] \\ + \log(\varepsilon_{q+1}, \dots, \varepsilon_T | \alpha, A_q) \end{aligned}$$

أين الحد الثاني معطى في العلاقة السابقة (7-3).

⁽⁴⁾ حيث إن الدالة تساوي ما يلي :

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty y^{x-1} e^{-y} dy$$

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

٤-٣-١- اختبار النموذج :

بالنسبة لنموذج ARCH(q)، فإن الخطأ المعياري يكون من الشكل التالي :

$$\tilde{\epsilon}_t = \frac{\epsilon_t}{\sqrt{h_t}}$$

حيث يكون عبارة عن سلسلة من المتغيرات العشوائية ذات توزيع مستقل ومتطابق (IID) يتبع كلا من التوزيع الطبيعي، أو توزيع t ستودنت . ولذلك، فإن الإختبار الملائم لتوفيق النموذج ARCH يكون بواسطة إختبار السلسلة $\{\tilde{\epsilon}_t^2\}$. وكذلك من المهم التذكير أن إحصائية Ljung—Box لسلسلة $\tilde{\epsilon}_t^2$ يمكن استعمالها لاختبار وتشخيص النموذج الملائم كما يمكن استعمال كذلك السلسلة $\tilde{\epsilon}_t^2$ التي تمثل الباقي مربعة كذلك لاختبار قبول النموذج .

٤-٤-١- التوقع باستعمال النموذج ARCH(q) :

من أجل التوقع بواسطة النموذج ARCH، فإننا نستعمل كذلك نفس المبادئ المستعملة في النموذج AR.

باعتبار نموذج ARCH(q)، فإن الفترة الأولى من التوقع لـ h_{m+1} كما يلي ^(١):

$$h_m(1) = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_m^2 + \dots + \alpha_q \epsilon_{m+q}^2$$

وللفترة الثانية من التوقع فيكون :

$$h_m(2) = \alpha_0 + \alpha_1 h_m(1) + \alpha_2 \epsilon_m^2 + \dots + \alpha_q \epsilon_{m+q}^2$$

أما فيما يتعلق بالفترة ℓ فإن أفق التوقع لـ $h_{m+\ell}$ يكون كما يلي:

$$h_m(\ell) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i h_m(\ell-i)$$

أين: $h_m(\ell-i) = \epsilon_{m+i}^2$ في حالة $0 \leq \ell \leq q$.

٥-١- مشكلة نماذج ARCH :

مع أن النموذج ARCH يتميز بالبساطة في تركيبه، إلا أن غالبية تطبيقاته بالنسبة للفجوات الزمنية الطويلة في علاقة التباين المشروط فإنها تكون ضرورية بالنسبة لغالبية الحالات، وهذا هو السبب الرئيس الذي يؤدي إلى ظهور مشكلة سلبية التباين وعدم استقرار السلسلة الزمنية الذي هو شرط أساس لاستعمال هذا النموذج .

ومن أجل تجنب هذا الإشكال، استوجب تثبيت بنية الفجوات الزمنية المتباينة، أي إيجاد بديل لهذا النوع من النماذج، والذي يأخذ بعين الاعتبار كونه ذو ذاكرة كبيرة، وقابل للتكييف مع النماذج ذات الفجوات الزمنية الطويلة . ولذا فقد قام (T.Bollerslev) في سنة 1986 باقتراح النموذج العام لنماذج ARCH، والذي يُعرف بنموذج

^(١) من المرجع [R.S.TSAY-02]، ص 90

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

GARCH⁽¹⁾ ، والذي يأخذ بعين الاعتبار الذاكرة الطويلة ، ويكون قابلاً للتكييف مع النماذج ذات البنية المتباطئة بفجوات زمنية .

٢- النموذج : GARCH(p,q)

إن انتقالنا من النموذج ARCH إلى GARCH يشبه انتقالنا من النموذج القاعدي للسلالس الزمنية الذي يُعرف بالنموذج الإنحداري AR إلى النموذج العام المعروف ARMA ، حيث تم اقتراح هذا النموذج من طرف T.Bollerslev) في سنة 1986 ، والذي يُعرف بنماذج GARCH(p,q) .

١- التعريف بالنموذج : GARCH(p,q)

سوف نبدأ بالنموذج العام، ثم إلى النموذج من الدرجة الأولى كما يلي :

١-١-٢- شكل النموذج : GARCH(p,q)

لتكن لدينا ε_t تدل على علاقة غير متصلة لنموذج سلسلة عشوائية ، وإذا كان ε_t عبارة عن تغير ثابت لجميع المقادير على

امتداد الزمن t ، فإن النموذج GARCH(p,q) يعطى بالشكل التالي⁽²⁾ :

$$\varepsilon_t | \psi_{t-1} \sim N(0, h_t)$$

$$\varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t} \quad , \quad h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^p \beta_i h_{t-i} \dots \dots \quad (8-3)$$

حيث أن المقدار ε_t يتبع الشكل GARCH(p,q) إذا كان ما يلي :

$$\varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t}$$

وأن z_t عبارة عن تشويش أبيض ضعيف، ويكون $0 > \alpha_0$ و $\alpha_i \geqslant 0$ حيث : $i = 1, \dots, q$

وكذلك : $\beta_i \geqslant 0$ ، حيث : $i = 1, \dots, p$ ، كمان $1 < \sum_{i=1}^{\max(p,q)} (\alpha_i + \beta_i) < 1$ ، كما نشير هنا إلى أن $\alpha_i = 0$

في حالة $i > q$ ، $\beta_i = 0$ في حالة $p > i$ ، كما نلاحظ أنه وفي حالة $p = i$ ، فإن النموذج GARCH(p,q) يتتحول إلى النموذج الأول ARCH(q) .

إن نموذج ARCH(q) ، والذي تناولناه في السابق يقوم بنمذجة التباين المشروط بشكل خاص على شكل دالة خطية للبواقي المربيعة متباطئة بفجوات زمنية محددة فقط مرفوعة للدرجة الثانية، أما نموذج GARCH(p,q) الذي أمامنا فإنه يدخل في الحسبان الفترات السابقة للتباين كذلك بالإضافة إلى البواقي المتباطئة بفجوات زمنية مرفوعة للدرجة الثانية

⁽¹⁾ هي اختصار لـ Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity

⁽²⁾ من المرجع [M.V.ASOKAN-٠١] ، ص ١٠ .

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

٢-١-٢- خصائص النموذج : GARCH(p,q)

إن هذا النموذج يتمتع بالخصائص التالية كما يلي :

أولاً : من أجل فهم خواص النموذج GARCH ، من المفيد استعمال الصيغة المبتكرة التالية^(٤) :

$$h_t = \varepsilon_t^2 - \eta_t = \varepsilon_t^2 - h_t$$

وباستعمال الصيغة المتباينة بفجوة زمنية: $h_{t-i} = \varepsilon_{t-i}^2 - \eta_{t-i}$ ، حيث أن $i = 0, \dots, p$ ، ومنه يمكننا صياغة

المعادلة (٣-٣) السابقة كما يلي :

$$(3-3) h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{\max(p,q)} (\alpha_i + \beta_i) \varepsilon_{t-i}^2 + \eta_t + \sum_{i=1}^p \beta_i \eta_{t-i} \dots \dots$$

حيث يمكننا بسهولة اختبار أن $\{\eta_t\}$ عبارة عن سلسلة ذات وسط معروف : $E(\eta_t) = 0$ ، وتبالين مشترك مساو للصفر كذلك $Cov(\eta_t, \eta_{t-i}) = 0$ ، من أجل $i \geq 1$.

يجب الإشارة إلى أنه وبصفة عامة ، فإن $\{\eta_t\}$ لا تكون سلسلة من المتغيرات التي تكون مستقلة ولها توزيعات متطابقة ، أي ليست (Independent Identically Distributed).

كما نلاحظ أن المعادلة الأخيرة (٣-٣) عبارة عن نموذج ARMA للسلسلة المرفوعة للدرجة الثانية ε_t^2 .

وهكذا فإن النموذج GARCH(p,q) يمكننا تطبيقه في صورة نموذج ARMA للسلسلة ε_t^2 المرفوعة للدرجة الثانية ، وباستعمال المتوسط الغير مشروط لنموذج ARMA ، فيكون لدينا الآتي:

$$E(\varepsilon_t^2) = \frac{\alpha_0}{1 - \sum_{i=1}^{\max(p,q)} (\alpha_i + \beta_i)}$$

بشرط أن مقام العلاقة السابقة موجباً.

ثانياً : كذلك إذا كان لدينا $0 > 2\alpha_1^2 - (\alpha_1 + \beta_1)^2 - 1$ ، فإن:

$$\frac{E(\varepsilon_t^4)}{[E(\varepsilon_t^2)]^2} = \frac{3[1 - (\alpha_1 + \beta_1)^2]}{1 - (\alpha_1 + \beta_1)^2 - 2\alpha_1^2} > 3$$

^(٤) انظر المرجع [R.S.TSAY-٠٢] . ص ٩٣

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

٣-١-٢- شروط استقرارية النموذج GARCH(p,q)

إن النموذج GARCH(p,q) المعروف في العلاقة (٩-٣) يكون مستقرًا إذا تحقق ما يلي^(١) :

$$E(\varepsilon_t) = 0 \quad ■$$

$$V(\varepsilon_t) = \alpha_0 \left(1 - \sum_{i=1}^q \alpha_i - \sum_{i=1}^p \beta_i \right)^{-1} \quad ■$$

من أجل $t \neq s$ ، إذا وفقط إذا كان:

$$\sum_{i=1}^q \alpha_i + \sum_{i=1}^p \beta_i < 1$$

٢-٢- النموذج GARCH(1,1)

كما فعلنا في النماذج السابقة سوف نبدأ بتعريف النموذج، ثم نذكر شرط استقراريته.

١-٢-٢- شكل النموذج GARCH(1,1) :

إن هذا النموذج يعطي بالشكل التالي :

$$\varepsilon_t | \psi_{t-1} \sim N(0, h_t), \quad \varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t}$$

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

وذلك الشروط التالية المتعلقة بالمعلمات : $\alpha_0 > 0, \alpha_1 > 0, \beta_1 > 0$

كما يمكن تقديمها على النحو التالي :

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1) \varepsilon_{t-1}^2 + \mu_t - \beta_1 \mu_{t-1}$$

أين تكون : $\mu_t = \varepsilon_t^2 - V(\varepsilon_t | \psi_{t-1}) = \varepsilon_t^2 - h_t$

المشاهدات التاريخية لنفس المتغير للنموذج ε_t المعروف والثابت في الزمن $V(\varepsilon_t) = E(\varepsilon_t^2)$ ، وانطلاقاً من النموذج

ARMA ، فإن متوسط النموذج معروف على الشكل التالي^(٢) :

$$V(\varepsilon_t) = E(\varepsilon_t^2) = \alpha_0 \Phi(1)^{-1} = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 - \beta_1}$$

أين $L(\varepsilon_t^2) = 1 - (\alpha_1 + \beta_1)L$ تعني كثير الحدود الإنحدار الذاتي للنموذج ARMA(1,1).

^(١) من المرجع [M.V.ASOKAN-٠١] ، ص ١٠ .

^(٢) أنظر المرجع [R.S.TSAY-٠٢] ، ص ٩٣ .

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

٢-٢-٢- شروط استقرارية النموذج : GARCH(1,1)

إنطلاقاً من شروط استقرارية النموذج GARCH(p,q) ، فإن النموذج GARCH(1,1) يكون مستقرّاً إذا وفقط إذا

تحقق شروط الإستقرارية من الدرجة الثانية كما يلي :

$$\alpha_1 + \beta_1 < 1$$

٢-٣- إختبار توزيع النموذج : GARCH(p,q)

إن الإختبار يعتمد على مبدأ مضاعف لاغرانج (Lagarnge Multiplier) ، وباعتبار أن الفرض العددي H_0 لبواقي

النموذج ARCH(q) في مقابل الفرض البديل H_1 أن البوافي معينة من طرف النموذج GARCH(p,q).

إن الإختبار الإحصائي يكون مساوياً لـ NR^2 ، أين يكون R^2 معامل التحديد للإنحدار المساعد، و N عبارة عن عدد المعطيات للسلسلة الأصلية . إن الفرض العددي يُرفض في حالة تجاوز قيمة الإختبار للقيم الحرجة لتوزيع كاي تربيع χ^2 ، حيث p تمثل درجات الحرية .

٢-٤- التوقع باستعمال النموذج : GARCH(p,q)

بالنسبة للنماذج من GARCH(p,q) ، فإن طريقة التوقع الخاصة بهذه النماذج تشبه إلى حد كبير تلك المطبقة في النماذج

^(١) ARMA(p,q)

باعتبار النموذج GARCH(1,1) ، وبافتراض أن أساس التوقع (Origin Forcasts) هي m ، وبالنسبة للفترة الأولى

من التوقع تكون كالتالي ^(٢) :

$$h_{m+1} = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_m^2 + \beta_1 h_m$$

أين h_m معروفة في المؤشر الزمني m ، وبناءً على ذلك ، فإن الفترة أو المرحلة الأولى تكون كالتالي :

$$h_m(1) = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_m^2 + \beta_1 h_m$$

من أجل المراحل المتعددة ، سوف نستعمل $\varepsilon_t^2 = z_t^2 h_t$ ، وسوف نعيد كتابة معادلة النموذج GARCH(p,q) كما يلي :

$$h_{t+1} = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1) h_t + \alpha_1 h_t (z_t^2 - 1)$$

حيث أن : $t = m + 1$ ، فإن صيغة العلاقة تصبح كما يلي :

$$h_{m+2} = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1) h_{m+1} + \alpha_1 h_{m+1} (z_{m+1}^2 - 1)$$

^(١) أنظر الفصل الثاني من هذه المذكرة .

^(٢) من المرجع [R.S.TSAY-٠٢] ، ص ص ٩٤-٩٥ .

الفصل الثالث : التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH

بمأن : $E(z_{m+1}^2 - 1 | z_m) = 0$ ، فإن المرحلة الثانية من التوقع حيث أساس التوقع هو m يكون كما يلي :

$$h_m(2) = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1) h_m(1)$$

وبصفة عامة يكون لدينا ما يلي :

$$h_m(\ell) = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1) h_m(\ell-1) , \ell > 1 \dots \dots \quad (10-3)$$

هذه النتيجة هي بكل دقة نفسها في النموذج من الشكل ARMA(1,1) مع كثير الحدود B بالتعويض في المعادلة (10-3)، بأخذ المرحلة ℓ ، فإن علاقة التوقع يمكن كتابتها في الشكل التالي :

$$h_m(\ell) = \frac{\alpha_0 [1 - (\alpha_1 + \beta_1)^{\ell-1}]}{1 - \alpha_1 - \beta_1} + (\alpha_1 + \beta_1)^{\ell-1} h_m(1)$$

إذن :

$$\ell \rightarrow \infty , h_m(\ell) \rightarrow \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 - \beta_1}$$

بشرط أن تكون $1 < \alpha_1 + \beta_1$. ونتيجة فإن المراحل المتعددة بالنسبة للتوقع بواسطة نماذج ARCH(1,1) يقارب التباين اللامشروط بمعلومية المشاهدات التاريخية لنفس المتغير لـ «أثناء التوقع بالأفق الذي ينتهي إلى مala نهاية بشرط أن يكون تباين الباقي $Var(\varepsilon_t)$ موجوداً .

ملخص الفصل الثالث

على الرّغم من انتشار استعمال نماذج ARMA و النماذج الموسعة ARIMA-SARIMA في مجال التوقع باستعمال السلالس الزمنية، إلا أن لها قصوراً يتمثل في أنها مبنية على أساس افتراض تبات التباين، إلا أنه وفي الواقع فإن الكثير من السلالس الزمنية القياسية تتميز بعدم تبات التباين المشروط، الأمر الذي دفع بالاقتصادي الأمريكي (R.F.ENGLE) في سنة 1982 إلى اقتراح نموذج ARCH، والذي يأخذ في الإعتبار عدم تبات التباين، كما قام (T.BOLLERSLEV) في سنة 1986 ، باقتراح الشكل المعتم ل لهذا النموذج وهو نموذج GARCH نظراً للنقائص الموجودة في النموذج ARCH، وهذا ما تعرضنا له في هذا الفصل مبتدئين بالتعريف بعدم تبات التباين المعروف بـ(Heteroscedasticity)، والإختبارات من أجل كشفه، ثم إلى نموذج ARCH وشكله وخصائصه، ثم بناء هذه النماذج وذلك اعتماداً على المنهجية العادلة لأي نموذج قياسي عادي من تعريف شكل النموذج، تقدير معلمات النموذج، فاختبار ملاءمة النموذج، ثم التوقع باستعمال النموذج المختار، وفي الأخير استعرضنا ماخذ النموذج تمهدأً للمرور إلى النموذج المعتم GARCH الذي لديه نفس منهجة نموذج ARCH، حيث يُندمج التباين على شكل مركبة خطية للبواقي مرفوعة للدرجة الثانية متباطئة بفجوات زمنية، بالإضافة إلى التباين المشروط متباطئ هو الآخر بفجوات زمنية .

حيث أن استعمال نماذج ARCH تم في العديد من الدراسات ذكر منها : الدراسة التي قام بها كل من [Engle , Hendry , Trumbull (1985)] حول هيكلة معدلات الفائدة، تغيرات مداخل البورصة

[Engle , Lilien , Robins (1987)]، تغيرات أسعار الصرف من طرف كلا من :

.⁽⁴⁾ [Bollerslev , Ghysles (1996)]

وفي الأخير نشير إلى أن ما تطرقنا إليه في هذا الفصل هي نماذج بوكس- جنكز الخطية ذات المتغير الواحد (Linear Univariate Time Series Models) ، ونشير إلى أنه توجد هناك نماذج متعددة التغيرات (Multivariate Models)⁽²⁾ ، والتي لها تطبيقات ذات أهمية كبيرة في الجانب المالي، فهي تلعب دوراً كبيراً في اختيار محفظة الأوراق المالية وفي حصة الأصول المالية، كما تستعمل كذلك من أجل حساب القيم المعرضة للمخاطر (VAR) Value At Risque للأصول المالية المتعددة .

⁽⁴⁾ أنظر المرجع [W.GREENE-05] ، ص 231 .

⁽²⁾ من أجل التعرف على هاته النماذج، أنظر المرجع [R.S.TSAY-02] إبتداءً من الصفحة 357 .

الفصل الثاني : طريقة بوكس - جنكينز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

- » المبحث الأول : مفاهيم عن السلسل الرزمنية
- » المبحث الثاني : النماذج الخطية للسلسل الرزمنية
- » المبحث الثالث : منهجية بوكس - جنكينز في تحليل السلسل الرزمنية الخطية
- » المبحث الرابع : التوقع وقياس دقتة

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

تمهيد :

هناك العديد من الأبحاث التي اهتمت بدراسة السلسلة الزمنية قبل قيام العالمن الأمريكيان جورج بوكس Gwilym Jenkins «George Box»، وجوليام جنكنز «Time Series Analysis Forecasting and Control»، حيث أصبحت هذه النماذج بفضلهما بعد ذلك أكثر انتشاراً^(١)، وكذلك إمكانية استخدامها لمعالجة السلسلة الزمنية ذات المركبة الموسمية والمعروفة بنماذج SARIMA^(٢)، حيث أن لهاته النماذج العديد من الإستخدامات ، منها التوقع بالبيانات مستخدمين في ذلك بيانات الماضي عن هاته البيانات دون الحاجة إلى البحث عن سلسلة زمنية أخرى مثل دخول المستهلكين ، الأسعار ، ... إلخ ، وهذا عبر المرور بالمراحل الأربع ، ابتداءً بتعريف النموذج ، ثم مرحلة تقدير معلماته ، فتشخيص النموذج والتأكد من ملاءمته ، وذلك بالإستعانة بمجموعة من الإختبارات الإحصائية المختلفة ، وأخيراً تأتي مرحلة التوقع باستعمال النموذج المناسب . ولكن سوف نبدأ أولاً بالتعرف على المفاهيم الأولية عن السلسلة الزمنية .

المبحث الأول : مفاهيم عن السلسلة الزمنية

قبيل التطرق إلى طريقة تحليل السلسلة الزمنية لبووكس- جنكنز ، لا بد لنا أن نُعرّج على بعض المفاهيم الأساسية ، والتي سوف تساعدنا فيما بعد للتعرف على هذا الأسلوب ، حيث سوف نتطرق أولاً إلى مفهوم السياق أو النموذج العرضي ، الإستقرارية ، اختبارات السكون أو الإستقرارية ، والتي الإرتباط الذاتي الكلية (ACF) و الجزئية (PACF) ، وكذلك منحنى دالة الإرتباط الذاتي أو ما يسمى بـ (Correlogram) (ACF) ، (PACF) ، (الدالتين) (Stochastic Process) :

إن السياق العرضي يُعرف رياضياً بأنه عبارة مجموعة من المتغيرات العشوائية مرتبة عبر الزمن ، الذي يمكن أن تكون مستمرة أو منقطعة ، فنرمز للمتغير العشوائي في الزمن t بالرمز $X(t)$ إذا كان الزمن مستمراً ($t \in (-\infty, +\infty)$) ، وبالرمز X إذا كان الزمن منقطع أي ($t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)^(٣) ، وكمثال نذكر السلسلة الزمنية التالية ولتكن :

$$\{e_t : t \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}\} \text{ ذات المتوسط المساوي للصفر ، والتباين ذي القيمة المنتهية } < \sigma^2 \}$$

^(١) من المرجع [و.فاندل-٩٢] ، ص ١٩.

^(٢) هي اختصار لـ : Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average

^(٣) من المرجع [C.CHATFIELD-٩٦] ، ص ٨ .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

فنقول أن هذه السلسلة عبارة تتبع غير مترابط ($\sigma^2, 0$) للمتغيرات العشوائية^(١). حيث ولنفرض أن (e_t) تتبع التوزيع الطبيعي وفق المجال (٥٠٠-٤٠٠)، وتكون دالة التباين لـ (e_t) معطاة كما يلي :

$$\gamma_e(h) = \begin{cases} \sigma^2, & h = 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

وبسبب أهمية هذه السلسلة الزمنية، فإننا نرجئ الرمز (e_t) تسلسل الباقي العشوائية الغير مترابطة بمتوسط معادل وتبالين موجب ومنتهي^(٢).

٢- الاستقرارية (Stationarity) :

يُقال عن سلسلة زمنية معينة ولتكن y_t ، حيث : $y_t \in z$ بواسطة مؤشر الزمن $\{z\}_{t=2, \dots, T}$ ، أنها مستقرة إذا تحقق ما يلي^(٣) :

- (i) $E|y_t|^2 < \infty$ ، for all $t \in z$
 - (ii) $Ey_t = m$ ، for all $t \in z$
 - (iii) $\gamma_k(r, s) = \gamma_k(r + t, s + t)$ for all $r, s, t \in z$
- $$[\gamma_k(r, s) = Cov(y_r, y_s) = E(y_r - Ey_r)(y_s - Ey_s)] , r, s \in z$$

حيث أن $Cov k$ يشير إلى التغير عند الفجوة (k) بين قيمتين من قيم y تفصل بينهما فجوة زمنية طولها (k) ، فإذا كانت $k = 0$ ، فإن :

$$Cov 0 = \gamma_0 = \frac{\sum_{t=k}^N (y_t - \bar{y})(y_t - \bar{y})}{N} = \frac{\sum_{t=k}^N (y_t - \bar{y})^2}{N}$$

وإذا كان $k = 1$ ، فإن $Cov 1$ يشير إلى التغير بين القيم المتتالية لنفس المتغير ، والتي تفصل بينهما فجوة زمنية واحدة ، أي بين y_t و y_{t+1} ، وفيما يلي ندرج شروط استقرارية سلسلة زمنية تدعى الاستقرارية من الدرجة الثانية^(٤).

٤- الاستقرارية في الدرجة الثانية (Stationarity in Second Order)

- $E[y_t]$ مستقل في الزمن .
- $var[y_t]$ عبارة عن قيمة ثابتة ، موجب ومستقل في الزمن .
- $Cov[y_t, y_s]$ عبارة عن دالة منتهية في $[s-t]$ ، لكن ليس t وكذلك ليس في s .

^(١) في أحيان أخرى يقال عن هذه السلسلة أنها سلسلة زمنية تمثل تشويشاً أبيضاً (White Noise Series).

^(٢) انظر المرجع [W.A.FULLER-٩٦] ، ص ٥.

^(٣) من المرجع [P.J.BROKWELL-٩١] ، ص ١٢.

^(٤) من المرجع [W. GREENE-٠٥] ، ص ٥٩٥.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنر لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

٢-١- اختبارات السكون (Tests of Stationarity)

يوجد هناك العديد من المعايير المستخدمة في اختبار صيغة السكون في السلسلة الزمنية، ومنها ما يلي :

٢-١-١- دالة الارتباط الذاتي (ACF) :

تتمثل هذه الدالة عند الفجوة الزمنية k كما يلي^(١) :

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$$

حيث أن : γ_k يمثل التغير عند الفجوة الزمنية k .

أما γ_0 فيمثل التباين، وبرصد γ_k في شكل الإنتشار عند الفجوات الزمنية المختلفة فنحصل على شكل ارتباط العينة أو

ما يسمى بـ (Sample Correlogram) وتتراوح قيمة معامل الارتباط الذاتي ρ_k كأي معامل ارتباط ذاتي بين -١ و +١ ،

ويتطلب استقرار السلسلة الزمنية هنا أن يكون ρ_k مساوياً للصفر أو لا يختلف عنه بالنسبة لأي فجوة زمنية $0 < k < N$.

وفي حالة تمتع بيانات السلسلة الزمنية بالإستقرار، فإن معاملات الارتباط الذاتي للعينة غالباً ما يكون لها توزيع طبيعي

وسطه الحسابي صفرًا وتباعنه $\frac{1}{N}$ ، حيث أن N حجم العينة، ومن ثم فإن حدود فترة الثقة عند مستوى معنوية ٥٪

لعينة كبيرة الحجم تكون هي : $\sqrt{\frac{1}{N}} \pm 1.96$ ، ومن ثم فإذا كان ρ_k يقع داخل هذه الحدود ، فإننا نقبل فرض عدم

السائل بأن هذا المعامل يساوي الصفر، وإذا كان يقع خارج هذه الحدود فإننا نرفض فرض عدم ويكون ρ_k مختلفاً جوهرياً

عن الصفر، وعادة ما يتم حساب معاملات الارتباط الذاتي بحيث تساوي ربع $\left(\frac{1}{4}\right)$ حجم العينة^(٢).

٢-١-٢- اختبار جذر الوحدة للاستقرار (The Unit Root test of Stationarity) :

من أجل عرض هذا الاختبار، نبدأ بنموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الأولى والذي يسمى بـ :

First Order AutoRegressive Model (AR(1)) :

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \dots \quad (1-2)$$

حيث يشير الحد y_{t-1} إلى الخطأ العشوائي والذي يفترض فيه ما يلي :

١- وسطه الحسابي معدوم ،

ب- تباعنه ثابت ،

ج- قيمة غير مترابطة وعندئذ يسمى بـ خطأ العشوائي (White Noise Error Term) ، ويلاحظ أن معامل

AR(1) في العلاقة (1-2) يساوي واحد، وإذا كان هذا هو الأمر في الواقع، فإن هذا يؤدي إلى وجود مشكلة جذر الوحدة

الذي يعني عدم استقرار بيانات السلسلة، حيث يوجد هناك اتجاه في البيانات .

ولذا إذا قمنا بتقدير السلسلة التالية :

^(١) من المرجع [ع.ق.عطية-٠٢] ، ص ٦١٨

^(٢) انظر خصائص الدالة ACF

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\dots + \varepsilon_t = p \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (2-2)$$

وبحسب الوسيط أو القيمة p ، هناك 3 حالات ممكنة وهي كما يلي :

- إذا كان : $|p| > 1$ فإن السلسلة مستقرة ، أي أن المشاهدات الحالية لها أثر أكبر من المشاهدات الماضية على y_t ،
- إذا كان : $p = 1$ فإن السلسلة غير مستقرة ، أي أن المشاهدات الحالية والماضية لهما نفس التأثير على y_t ، في هذه الحالة يجب تحديد درجة التكامل للسلسلة ،
- إذا كان : $|p| < 1$: فإن السلسلة y_t غير مستقرة، تباينها يزداد بصفة هندسية مع t ، أي أن المشاهدات الماضية لها ترجيح أكبر مقارنة مع المشاهدات الحالية^(٤).

وتُعرف السلسلة التي يوجد بها جذر يساوي الواحد بسلسلة السير العشوائي (Rondom Walk Time Series) وهي أحد الأمثلة للسلسلات الزمنية الغير ساكنة . ويمكن صياغة المعادلة (2-2) في الصيغة التالية :

$$\Delta y_t = (p - 1) \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3-2)$$

$$\Delta y_t = M \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t$$

حيث أن : $M = p - 1$ ، ولقد تم الحصول على الصيغة (3-3) بطرح y_{t-1} من طرف المعادلة (2-2) للحصول على الفروق الأولى للمتغير y_t ، حيث أن : $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$.

والآن أصبح فرض العدم $H_0: M = 0$ ، في مواجهة الفرض البديل $H_1: M \neq 0$. ويُلاحظ أنه إذا ثبت في الواقع أن $M = 0$ ، فإن :

$$\Delta y_t = \varepsilon_t$$

وعندئذ، يُقال أن سلسلة الفروق الأولى من سلسلة السير العشوائي ساكنة أو مستقرة^(٢) .

ولاختبار مدى استقرار أو سكون السلسلة نتبع الخطوات التالية :

I - نقوم بحساب ما يسمى بـ $\pi(tau)$ ^(٣) ، وهذا بعد تقدير العلاقة (2-2) ، حيث أن π تساوي \hat{p} مقسومة على الخطأ المعياري لها .

إذا كانت π_{CAL} (المحسوبة) $< \pi_{TAB}$ (الجدولية) ، فإننا نرفض فرض العدم $H_0: M = 0$ ونقبل الفرض البديل $H_1: M \neq 0$ ، وبالتالي تكون السلسلة الزمنية المعنية مستقرة أو ساكنة .

^(١) انظر المرجع [G.BRESSON-95]، ص 419.

^(٢) أي أن السلسلة تكون متكاملة من الرتبة الأولى intgrated of order one أي I(1) ، أما إذا كانت السلسلة مستقرة من الرتبة الثانية intgrated of order two ، فإن السلسلة الأصلية تكون مستقرة من الدرجة الثانية أي I(2) ، وإذا كانت السلسلة الأصلية مستقرة أو ساكنة يُقال أنها متكاملة من الرتبة صفر أي I(0) .

^(٣) لا نستطيع مقارنة $\pi(tau)$ بقيمة π الجدولية حتى في العينات الكبيرة لأنها لا تتبع هذا التوزيع ، وإنما نبحث عن $\pi(tau)$ الجدولية في جداول معدة خصيصاً بواسطة Dicky & Fuller (DF-test) ولهذا يُعرف هذا الإختبار باختبار Dicky & Fuller .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

أما إذا كانت π_{CAL} (المحسوبة) $> \pi_{TAB}$ (الجدولية)، فإننا نقبل فرض العدم H_0 ، وتكون السلسلة الزمنية المعنية غير مستقرة أو غير ساكنة .

ولقد جرت العادة على إجراء هذا الإختبار باستخدام عدد من صيغ الإنحدار تتمثل في الآتي⁽¹⁾:

$$\Delta y_t = \lambda y_{t-1} + \varepsilon_t \dots \quad (4-2)$$

$$\Delta y_t = A_1 + \lambda y_{t-1} + \varepsilon_t \dots \quad (5-2)$$

$$\Delta y_t = A_1 + A_2 T + \lambda y_{t-1} + \varepsilon_t \dots \quad (6-2)$$

مع مراعاة أنه تم إدخال الحد الثابت A_1 في الصيغة (2-5)، وإدخال حد الاتجاه العام (*Trend*) يتمثل في الزمن (*T*) في الصيغة الأخيرة (6-6)، وفي كل هاته الصيغ فإن فرض العدم هو $H_0: \lambda = 0$ في مواجهة الفرض البديل $\lambda \neq 0$ ، وفي حالة وجود مشكلة الإرتباط الذاتي بالحد العشوائي ε_t ⁽²⁾، فإن الصيغة الملائمة للإستخدام لإجراء هذا الإختبار تصبح كما يلي :

$$\Delta y_t = A_1 + A_2 T + \lambda y_{t-1} + \rho \sum_{m=1}^k \Delta \varepsilon_{t-m} + \varepsilon_t \dots \quad (7-2)$$

ونستخدم في الصيغة (7-2) الأخيرة الفروق ذات الفجوة الزمنية $\Delta \varepsilon_{t-m}$ ، حيث أن :

$$\Delta y_{t-1} = y_{t-1} - y_{t-2}, \Delta y_{t-2} = y_{t-2} - y_{t-3}, \dots$$

ويتم إدراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية بالصيغة (7-2) حتى تختفي مشكلة الإرتباط الذاتي بين الباقي، حيث أنه ودائما يكون فرض العدم هو $H_0: \lambda = 0$ ، في مواجهة الفرض البديل $\lambda \neq 0$ ، وفي حالة تطبيق الإختبار على الصيغة الأخيرة (7-2)، فإن الإختبار يسمى باختبار Augmented Dicky - Fuller (ADF) Test

3- سلسلة التشويش الأبيض الضجة البيضاء (White Noise Series) :

إن سلسلة الضجة البيضاء أو عملية الضجة البيضاء هي عبارة عن متتابعة من المشاهدات غير المترابطة (وأحياناً نفترض أنها متتابعة من المتغيرات العشوائية التي تكون مستقلة ولها توزيعات متطابقة (IID: Independent, Identically Distributed)

، بمتوسط صفر وتبين (σ^2) ثابت، أي :

$$1) E(\varepsilon_t) = 0 \forall t$$

$$2) Cov(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = \begin{cases} \sigma^2, & \forall s, t = s \\ 0, & \forall s, t \neq s \end{cases}$$

ويرمز لها بالرمز $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$.

⁽¹⁾ من المرجع [ع. عطية-02]، ص 623.

⁽²⁾ يتم الكشف عن وجود الإرتباط الذاتي بين الباقي بواسطة إحصائية داربن - واتسون (DW-STAT) ، ففي حالة كون قيمتها بعيدة بشكل كبير عن القيمة 2 فإن هذا يدل على وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين الباقي .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

٤- مميزات السلسلة الزمنية الاقتصادية :

١-٤ - دالة الإرتباط الذاتي (ACF)^(٤) : توضح هذه الدالة الإرتباط الموجود بين المشاهدات في فترات مختلفة، وهي ذات أهمية بالغة في إبراز بعض الخصائص الهامة للسلسلة الزمنية، حيث يُعرف الإرتباط الذاتي من الدرجة h كما يلي^(٢):

$$\begin{aligned}\rho_h &= \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-h})}{\sqrt{\text{Var}(y_t) \text{Var}(y_{t-h})}} \\ \rho_h &= \frac{E(y_t - \mu_y)(y_{t-h} - \mu_y)}{\sqrt{E(y_t - \mu_y)^2 (y_{t-h} - \mu_y)^2}} \\ &= \frac{\gamma_h}{\sigma_y^2 \cdot \sigma_y^2} = \frac{\gamma_h}{\sigma_y^2}\end{aligned}$$

إذن:

$$= \frac{\gamma_h}{\gamma_0}$$

ومقدرات هذه التباينات والتباينات المشتركة، ثم معاملات الإرتباط الذاتي الخاصة بالعينة تكون:

$$\hat{\rho}_h = \frac{\hat{\gamma}_h}{\gamma_0} = r_h$$

حيث أن : $\hat{\gamma}_h = T^{-1} \sum_{t=h+1}^T (y_t - \bar{y})(y_{t-h} - \bar{y})$ ، وهو مقدر دالة التباين الذاتي (Auto Covariance).

في حالة كون السلسلة الزمنية مستقرة ، فإن دالة الإرتباط الذاتي تتضاءل بصفة أسيّة نحو الصفر . إذن من الملاحظ أن دالة الإرتباط الذاتي يقيس درجة الإرتباط بين متغيرات السلسلة الزمنية $\{y_t, \forall t \in Z\}$ ، وبين السلسلة الأصلية $\{y_{t-h}, \forall t \in Z\}$ المنحازة بدرجة h .

١-٤-٤ - خصائص الإرتباط الذاتي :

لله الإرتباط الذاتي متناظر حول الصفر، أي أن : $\rho_h = \rho_{-h}$ ،

لله الإرتباط الذاتي محصور بين القيمتين $+1$ و -1 ، أي أن : $-1 \leq \rho_h \leq +1$ ،

لله عندما تكون $h = 0$ ، فإن $\rho_0 = 1$ ، وبالتالي نقول أن ارتباط السلسلة تام ،

لله اختيار درجة التأخير ، حسب عدد المشاهدات المتاحة والمحددة بالعلاقة التالية : $(h = \frac{T}{4})$.

^(٤) هي اختصار لـ : Auto Correlation Function

^(٢) من المرجع [م. حشمان-٥٢] ، ص ١٢١.

الفصل الثاني : طريقة بوكس-جنكнер لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

٤-٢- دالة الارتباط الذاتي الجزئية (PACF) ^(١)

تعطي مقدار الترابط بين y_t و y_{t-k} بعد إزالة الترابط الناتج بين المتغيرات $y_{t-k+1}, y_{t-k-1}, \dots, y_{t-1}$ الواقعه بينهما ، ويرمز لها عند التخلف k بالرمز ϕ_{kk} ، وأحد طرق حسابها تقوم على حساب معامل الإنحدار الجزئي ϕ_{kk} في التمثيل:

$$(2) \quad y_t = \phi_{k1}y_{t-1} + \phi_{k2}y_{t-2} + \dots + \phi_{kk}y_{t-k} + \varepsilon_t$$

وبشكل عام فهذه الدالة تعرف كما يلي :

$$\phi_{kk} = \begin{cases} \begin{array}{ll} 1 & , \quad k=0 \\ \rho_1 & , \quad k=1 \end{array} \\ \\ \begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-2} & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{k-3} & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ \hline \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & \rho_1 & \rho_k \\ \hline 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-2} & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{k-3} & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ \hline \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & \rho_1 & \rho_k \\ \hline \end{array} , \quad k=2,3,\dots \end{cases}$$

حيث يرمز | إلى محدد المصفوفة .

إلا أن التعريف الأخير يتميز بصعوبة الإستخدام عند قيم k الكبيرة ، ولهذا فإن هناك تعريفاً آخر لحساب (PACF) تكرارياً ، حيث تحسب ϕ_{kk} تكراريا من العلاقات التالية :

$$\phi_{00} = 1 , by definition$$

$$\phi_{k1} = \rho_1$$

$$\phi_{kk} = \frac{\rho_k - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-j} \rho_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-j} \rho_j} , \quad k=2,3,\dots$$

حيث : $\phi_{kj} = \phi_{k-j,j} = \phi_{kk} \phi_{k-j,k-1}$ ، $j=1,2,\dots,k-1$

$$y_t = \phi_{11}y_{t-1} + \varepsilon_t : \phi_{11}$$

وبضرب في المعادلة ب y_{t-1} ، وبأخذ التوقع نجد أن : $E(y_{t-1}y_t) = \phi_{11}E(y_{t-1}y_{t-1}) + E(y_{t-1}\varepsilon_t)$

أي أن : $\phi_{11} = \rho_1$ ، حيث أن $E(y_{t-1}\varepsilon_t) = 0$ ، وبالقسمة على $\rho_0 = \rho_1$ نجد أن :

^(١) هي اختصار لـ Partial Auto Correlation Function

^(٢) من المرجع [ع.برى-٢٠٢] . ص ١٦

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

3-4- منحنى دالة الإرتباط الذاتي (Correlogram) :

هذا المنحنى هو تمثيل بياني لدالة الإرتباط الذاتي (ACF)، ولدالة الإرتباط الذاتي الجزئية (PACF)، هذا التمثيل البياني يسمح لنا بمعرفة :

للح الكشف عن وجود المركبة الموسمية ،

للح اختبار استقرار السلسلة الزمنية، والذي يتجلّى في أن معاملات دالة الإرتباط الذاتي تتلاشى بسرعة، أي قبل الدرجة

والتي تعادل $\left(\frac{T}{4}\right)$ كما هو متفق عليه ،

للح الكشف عن وجود ارتباط المتغيرات الداخلية ،

للح تحديد وسائل النموذج⁽¹⁾ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s ،

ولتسهيل تحليل المنحنى البياني للدالة (ACF) نضع مجال ثقة لقيم المقررة، وذلك بالإعتماد على تباين \hat{p} ، و المحدد بالعلاقة التالية :

$$Var[\hat{p}(k)] \approx \frac{1}{N} \left[1 + 2 \sum_{i=1}^k \hat{p}^2(i) \right]$$

وباعتبار أن $p(k)$ تتبع في توزيعها القانون الطبيعي، فإن مجال الثقة لـ $p(k)$ بدرجة ثقة $\alpha = 95\%$ محدد بـ :

$$\pm 1,96 \sqrt{Var[\hat{p}(k)]}$$

وبالتالي يمكن إختبار عشوائية السلسلة الزمنية $[E(y_t) = 0]$ ، وذلك بوجود كل قيم $p(k)$ بداخل هذا المجال ،

وبالنسبة لدالة الإرتباط الذاتي الجزئية (PACF) أيضا تتبع توزيعا طبيعيا مقدر بـ :

$$Var[\hat{r}(k)] \approx \frac{1}{T} \quad . \quad \pm 1,96 \sqrt{Var[\hat{r}(k)]}$$

ويحدد مجال الثقة بـ :

4-4- الدالة (ACF) لعملية الضجة البيضاء :

إن دالة التغير الذاتي لعملية الضجة البيضاء هي من الشكل :

$$\gamma_k = Cov(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = \begin{cases} \sigma^2 & , k = 0 \\ 0 & , k \neq 0 \end{cases}$$


ومنه نجد الدالة (ACF) كما يلي :

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \begin{cases} 1 & , k = 0 \\ 0 & , k \neq 0 \end{cases}$$

⁽¹⁾ هي اختصار لـ : Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

ولها الشكل التالي^(١) :



الشكل (١-٢) : الدالة ACF لعملية التشويش الأبيض

٤-٥- الدالة (PACF) لعملية الضجة البيضاء :

تكون دالة (PACF) لعملية الضجة البيضاء كما يلي :

$$\begin{cases} \phi_{00}=1 & , \text{by definition} \\ \phi_{kk} = \phi_1 = 0 \end{cases}$$


وبالتعويض في تعريف الدالة عن ϕ_{kk} ، فنجد :

$$\phi_{22} = \phi_{33} = \dots = 0$$

وهكذا :

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1 & , k=0 \\ 0 & , k \neq 0 \end{cases}$$

وتأخذ الشكل التالي^(٢) :



الشكل (٢-٢) : الدالة PACF لعملية التشويش الأبيض

^(١) من المرجع [ع. بري-٠٢] ، ص ١٥.

^(٢) لاحظ أن كلا من ACF و PACF لعملية الضجة البيضاء تساوى الصفر من التخلف الأول ، وهذه خاصية جميع المتغيرات العشوائية غير المترابطة أو المستقلة ، ولاختبار عدم الترابط بين قيم مشاهدة متغير عشوائي نستخدم ACF لذلك .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

٤-٦- الدالة (ACF) للعينة :

تُعطى بالعلاقة التالية^(١) :

$$\bar{y} = n^{-1} \sum_{t=1}^n y_t , \quad r_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (y_t - \bar{y})(y_{t+k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2} , \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

وهي مُقدّر (Estimator) لدالة الترابط الذاتي أي $\rho_k = r_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$, وبما أنها مُقدّر فهي إذاً تتغيّر عشوائياً من عينة لأخرى ولهذا فإن لها الخواص العينية التالية :

أ- إذا كانت $k > q$, فإن $r_k = 0$:

$$V(r_k) \cong \frac{1}{n} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^q \rho_k^2 \right) , \quad k > q$$

وفي الحالة الخاصة عندما $k > q$, $r_k = 0$, $\rho_k = 0$ فإن $V(r_k) \cong \frac{1}{n}$

ب- لقيم n الكبيرة و $\rho_k = 0$, فإن r_k يكون لها تقرّباً توزيع طبيعي، وبالتالي نستطيع القيام بالاختبار التالي :

$$\begin{cases} H_0 : \rho_k = 0 \\ H_1 : \rho_k \neq 0 \end{cases}$$

وذلك باستخدام الإحصائية :

$$\frac{|r_k|}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} |r_k|$$

وذلك عند مستوى معنوية ($\alpha = 0.05$), حيث يتم رفض H_0 إذا كانت $\sqrt{n} |r_k| > 1.96$

أ- تحت الفرضية $\rho_k = 0 \forall k$, فإن $H_0 : \rho_k = 0$

ب- تُقدّر التباينات لدالة الترابط الذاتي للعينة كالتالي :

$$\hat{V}(r_k) \cong \frac{1}{n} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^q r_k^2 \right) , \quad k > q$$

^(١) من المراجع من المراجع [ع. بري-٠٢] ، ص ١٩.

الفصل الثاني : طريقة بوكس - جنكنتر لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

٤-٧-٦ الدالة (PACF) للعينة :

تعطى الدالة (PACF) للعينة لسلسلة زمنية y_1, y_2, \dots, y_n ، حيث يرمز لها بالرموز r_{kk} بالعلاقة التالية^(٤) :

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1 & , \quad k=0 \\ r_1 & , \quad k=1 \\ \\ \left| \begin{matrix} 1 & r_1 & \dots & r_{k-2} & r_1 \\ r_1 & 1 & \dots & r_{k-3} & r_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ r_{k-4} & r_{k-2} & \dots & r_1 & r_k \end{matrix} \right| & , \quad k=2,3,\dots \\ \left| \begin{matrix} 1 & r_1 & \dots & r_{k-2} & r_1 \\ r_1 & 1 & \dots & r_{k-3} & r_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ r_{k-4} & r_{k-2} & \dots & r_1 & r_k \end{matrix} \right| & , \quad k=2,3,\dots \end{cases}$$

ولحساب دالة الترابط الذاتي الجزئي للعينة تكرارياً:

$r_{00} = 1$, by definition

$$r_{11} = r_1$$

•

$$r_{kk} = \frac{r_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{k-1,j} r_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} r_{k-1,j} r_j}, k = 2, 3, \dots$$

حيث $j=1,2,\dots,k-1$ ، $r_{kj}=r_{k-1,j}-r_{kk}r_{k-1,j-1}$

وهي أيضاً مقدر (Estimator) للدالة (PACF) للعينة، أي ... $r_k = \hat{\rho}_k$ ، وبمانها مقدر فهـي إذاً تتغير عشوائياً من عينة لأخرى ، ولهذا فإن لها الخواص العينية التالية :

$$\therefore V(r_{kk}) \cong \frac{1}{n} \quad , k > 0 - 1$$

بـ- لقيم n الكبيرة فإن r_{kk} يكون لها تقريراً توزيع طبيعي، وبالتالي نستطيع القيام بالاختبار التالي:

⁽¹⁾ من المراجع من المراجع [ع. بري-02] ، ص 21.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\begin{cases} H_0 : \phi_{kk} = 0 \\ H_1 : \phi_{kk} \neq 0 \end{cases}$$

وذلك باستخدام الإحصائية :

$$\frac{|r_{kk}|}{n^{\frac{1}{2}}} = n^{\frac{1}{2}} |r_{kk}|$$

وذلك عند مستوى معنوية ($\alpha = 0.05$) ، حيث يتم رفض الفرض العدلي H_0 إذا كانت $n^{\frac{1}{2}} |r_{kk}| > 1.96$

ج- تحت الفرضية $H_0 : \phi_{kk} = 0 \forall k$

$$Corr(\phi_{kk}, \phi_{k-s, k-s}) \cong 0 \quad \text{فإن } s \neq 0$$

د- تُقدر التباينات لدالة الترابط الذاتي للعينة كالتالي :

$$V(r_{kk}) \cong \frac{1}{n}, \quad k > 0$$

8-4 - مفاهيم أساسية :

أ- **معامل التأخير (Lag)** (Forwardshift Operator) : يرمز له بالرمز L ، وتقع فكرة معامل التأخير تقوم على تجاوز y_t إلى y_{t-1} كما يلي :

$$L^1 y_t = y_{t-1}$$

ويكون كما يلي :

ب- **معامل الفروق (Difference Operator)** : الفروقات من الدرجة الأولى كما يلي :

$$\nabla y_t = (1 - L)y_t = y_t - y_{t-1}$$

وذلك :

ج- **عامل التجميم (Sum Operator)** : يرمز له S ، حيث أن :

هذه المفاهيم تسهل كتابة العلاقات والمعادلات المتعلقة بالسلسلة الزمنية .

المبحث الثاني: النماذج الخطية للسلسل الزمنية

إن الهدف من دراسة هذه النماذج هو بناء نماذج خطية للظاهرة العشوائية، واستعمالها في ميدان التوقع، وهذا يكون على أساس شرح أو تفسير سلوك متغير ما من خلال خصائصه البارزة والمتمثلة في ماضي هذا المتغير المدروس.

١ - نماذج الانحدار الذاتي^١

١-١ - نموذج الإنحدار الذاتي من الدرجة الأولى^(٢) ARMA(1,0) = AR(1) : فنقول عن بيانات سلسلة زمنية معينة^(٣) تتولد بناءً على عملية انحدار ذاتي من الرتبة (الدرجة) الأولى، إذا أمكن التعبير عن المشاهدة الحالية للسلسلة y ، كدالة خطية في المشاهدة السابقة لها بالإضافة إلى تغيير سابق يُرمز له بالرمز ϵ_t ، فإذا رمزنا للمشاهدة السابقة بالرمز y_{t-1} ، فيُمكّننا التعبير عن هذه العملية كما يلي :

$$(4) y_t = \delta + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (8-2)$$

وأنها مستقلة عن μ ، أي أننا سوف نفترض أن :

وستفترض هنا استقلال التغيرات العشوائية $\{X_i\}$ ، وأنها تتبع توزيعاً معتدلاً متواسطه الصفر، وتبينه تابث ويساوي σ^2 حيث تمثل $\#$ معلمة الإنحدار الذاتي التي يجب تقديرها، والتي تصف أثر تغير μ بوحدة واحدة على y .

: AR(1) - شرط السكون النموذج (1-1-1)

لا يمكننا تقدير الوسط الحسابي، التباين، ومعلمات الارتباط الذاتي إذا كانت السلسلة الزمنية غير ساكنة، وبالتالي فإن شرط السكون هذا يؤدي إلى فرض شروط على معالم عملية الإنحدار الذاتي، وبالتالي سوف تقوم بتقدير الوسط الحسابي والتباین لنموذج الإنحدار الذاتي من الدرجة الأولى السابق.

بمأن المعلمة $\frac{1}{1}$ لا تؤثر في الوسط الحسابي للسلسلة الزمنية الممثلة في المعادلة (2-8)، أي يمكن حساب الوسط الحسابي سواءً كانت $\frac{1}{1}$ موجبة أو سالبة، كبيرة أم صغيرة، فإن شرط ثبات الوسط الحسابي لا يؤدي إلى فرض أية قيود على المعلمة $\frac{1}{1}$ ، ولإيضاح ذلك دعنا نبرز ما يلي، حيث و باستعمال فكرة معامل التأخير، فيمكننا كتابة المعادلة (2-8) كما

$$y_t = \delta + \phi_1 L^1 y_t + \varepsilon_t \quad \text{پلی:}$$

٤) من خلال المعادلة نلاحظ أن المتغير التابع y_t يعتمد على قيمته السابقة y_{t-1} ، ولهذا سُمي هذا التمونج باسم الإنحدار الذاتي (Auto Regressive).

AR(1) :First- order Auto Regressive Model (2)

(٣) نفترض أن السلسلة الزمنية ساكنة أو مستقرة ، أو أنه قد تم تحويلها إلى سلسلة ساكنة أو مستقرة .

⁴ من المرجع [م. حشمان-02] ، ص 131 .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكشن لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\Rightarrow y_t = \frac{\delta}{(1-\phi)} + \frac{\varepsilon_t}{(1-\phi)L}$$

$$E(y_t) = \mu = \frac{\delta}{1-\phi}$$

وحتى يكون μ حلًّا نهائياً يُشرط أن تكون $1 - \phi \neq 1$ ، بينما شرط الإستقرارية يتمثل في أن تكون $1 - \phi_1 < 1$.
و بافتراض أن هذا النموذج مستقر، نبحث الآن عن التباين γ_0 ، و من أجل تسهيل العملية نفترض أن $\delta = 0$

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= E(y_t)^2 = E(\phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t)^2 \\ &= \phi_1^2 \gamma_0 + \sigma_\varepsilon^2 \\ &= \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-\phi_1^2}\end{aligned}$$

ولكي يكون التباين غير سالبًا، فإن المقدار $(1-\phi_1^2)$ يجب أن يكون غير سالب أيضاً ، وهذا يعني أن :

$$\phi_1^2 \leq 1 \quad \text{أو} \quad |\phi_1| < 1$$

حيث أنه إذا كان $|\phi_1| = 1$ ، فإن $Var(y_t)$ يكون لا نهائي ، وفي هذه تكون السلسلة غير ساكنة . ولكي يكون التباين غير سالب ونهائي، يجب فرض القيد التالي على قيمة ϕ_1 ، وهو $|\phi_1| < 1$ ^(١).

١-١-٢- بعض الملامم الخاصة لعملية AR(1) :

كمأنه يمكن التعرّف على أي شخص بواسطة بصمات أصابعه، فإنه يمكن التمييز بين عملية AR ، وأية عملية أخرى باستخدام خصائص معينة لها ، وهذه الخصائص هي كما يلي :

١-١-٢-١- التغایر الذاتي والإرتباط الذاتي :

كما هو معلوم فإن التغایر بين متغيرين عشوائيين معروف كما يلي :

$$Cov(x, y) = E[(x - Ex)(y - Ey)]$$

حيث أن Ex تشير إلى الوسط الحسابي للمتغير x ، وأن Ey إلى الوسط الحسابي للمتغير y ، والتغایر الذاتي (Auto Covariance) y_t عند فجوة زمنية مقدارها ١، ويرمز لها بالرمز γ_1 ، هو التغایر بين y_t و y_{t-1}

والمعروف كما يلي :

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= Cov(y_t, y_{t-1}) = E(y_t y_{t-1}) = E[(\phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t) y_{t-1}] \\ &= \phi_1 E(y_{t-1} y_{t-1}) + E(y_{t-1} \varepsilon_t) \\ &= \phi_1 \gamma_0\end{aligned}$$

وتوقع المقدار الثاني معدوم، كون الخطأ الضمني y_{t-1} هو ε_{t-1} ، وبالتالي فإن : $E(\varepsilon_{t-1} \varepsilon_t) = 0$ لاختلاف الفترة الزمنية (أنظر المعادلة (١١-٢)).

^(١) من المرجع [و.فاندل-٩٢]، ص ٦٦.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\gamma_2 = E(y_t y_{t-2}) = E[(\phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t) y_{t-2}]$$

$$= \phi_1 \gamma_1$$

$$= \phi_1 (\phi_1 \gamma_0) = \phi^2 \gamma_0$$

$$\gamma_3 = \phi_1 \gamma_2$$

$$= \phi_1 (\phi^2 \gamma_0)$$

$$= \phi^3 \gamma_0$$

$$وبحفة عامة يكون لدينا : \gamma_k = \phi_1^k \gamma_0 \quad , \quad k = 1, k$$

1-2-2- دالة الذاكرة (Memory Function) :

تعتبر الدالة القوية (Long Memory) لعملية الإنحدار الذاتي من الملامح المميزة لهذه العملية ، حيث نفترض أننا نكتب

المعادلة (2-8) الممثلة لنموذج AR(1) بدالة التغيرات العشوائية السابقة ، وذلك بحذف مشاهدات y_t السابقة على النحو

التالي ، وذلك بوضع الصيغة : $y_{t-1} = \phi_1 y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}$

في المعادلة (2-8) فنحصل على المعادلة التالية :

$$y_t = \phi_1^2 y_{t-2} + \varepsilon_t + \phi_1 \varepsilon_{t-1} \dots \dots \quad (12-2)$$

وبوضع الصيغة الأخرى التالية :

$$y_{t-2} = \phi_1 y_{t-3} + \varepsilon_{t-2}$$

في المعادلة (2-12) نحصل على التالي :

$$y_t = \phi_1^3 y_{t-3} + \varepsilon_t + \phi_1 \varepsilon_{t-1} + \phi_1^2 \varepsilon_{t-2}$$

وبالاستمرار في هذه العملية ، يمكن التعبير عن نموذج AR(1) كما يلي :

$$y_t = \varepsilon_t + \phi_1 \varepsilon_{t-1} + \phi_1^2 \varepsilon_{t-2} + \phi_1^3 \varepsilon_{t-3} + \dots$$

أي أن النموذج AR(1) يمكن كتابته كمجموع للتغير العشوائي الحالي بالإضافة على عدد لا نهائي من الحدود التي تتضمن

تغيرات عشوائية سابقة ، أي أن المشاهدة الحالية ما تزال متأثرة بالتغيرات العشوائية (ε_t) والتي حدثت في الماضي

البعيد ، وبالتالي يمكن الإدعاء بأن العملية AR(1) لها ذاكرة لا نهائية ، وإذا كانت العملية ساكنة فإن $\phi_1 = 0$ ، وبالتالي

يخفي تأثير التغيرات العشوائية السابقة تدريجياً ، وبالطبع فإن هذا لا يتحقق بالنسبة لعملية غير ساكنة .

1-2-3- الدالة ACF (للمودج AR(1)) :


تكون معاملات الدالة ACF (للمودج AR(1)) ممثلاً في : $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \phi_1^k \quad , \quad k > 0$

^(*) انظر المرجع [م. حشمان- ٢٠٢] ، ص ١٧٣.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية


حيث عندما تكون $\phi_1 = 1$ فإن $\rho_0 = \phi_1$ ، وبسبب القيد المشروط على ϕ_1 من أجل الإستقرارية ، تبدأ الدالة (ACF) في التناقض حتى تنعدم أو تقترب ، لكن من الصعوبة تحديد درجة النموذج الإنحداري من المعلومات التي توفرها دالة الإنحدار الذاتي ، كونها تبقى مستمرة التدهور (مضمحلة) في حالة الإستقرار ولا تنعدم بسرعة ، وفيما الشكل البياني لهذه الدالة ^(٤) :

- عندما تكون $\phi_1 > 1$:



الشكل (3-2): الدالة ACF للنموذج AR(1) عندما تكون $\phi_1 > 1$

- عندما تكون $\phi_1 < 0$:



الشكل (3-3): الدالة ACF للنموذج AR(1) في حالة $\phi_1 < 0$

4-2-1-1- الدالة AR(1) (PACF) للنموذج

تكون هذه الدالة معرفة كما يلي ^(٢) :

$$\phi_{00} = 1 \quad , \text{by definition}$$

$$\phi_{11} = \rho_1 = \phi_1 \quad , \text{by definition}$$

$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \phi_1 \\ \phi_1 & \phi_1^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \phi_1 \\ \phi_1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{0}{1 - \phi_1^2} = 0$$

⋮

^(٤) من المرجع [ع.برى-٠٢] ، ص ٢٦.

^(٢) الصفحة ٣٧ من المرجع السابق .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\phi_{kk} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & \rho_k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \phi_1 & \dots & \phi_1 \\ \phi_1 & 1 & \dots & \phi_1^2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \phi_1^{k-1} & \phi_1^{k-2} & \dots & \phi_1^k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \phi_1 & \dots & \rho_{k-1} \\ \phi_1 & 1 & \dots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \phi_1^{k-1} & \phi_1^{k-2} & \dots & 1 \end{vmatrix}} = \frac{0}{|| > 0}$$


إن محدد البسط تساوي صفرًا لأن العمود الأخير يساوي العمود الأول مضروباً في ϕ_1 ، وتنكتب الدالة (PACF) على الشكل

التالي :

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1 & , k > 0 \\ \phi_1 & , k = 1 \\ 0 & , k \geq 2 \end{cases}$$

ولها الشكل البياني التالي ^(٤) :

١- عندما تكون $\phi_1 > 0$:




الشكل (٢-٥) : الدالة PACF للنموذج AR(1) في حالة $\phi_1 > 0$

^(٤) لاحظ أنه لا يتم رسم كلا من $\phi_{00} = 1$ و $\rho_0 = 1$ في الأشكال البيانية الممثلة للدلائل ACF و PACF على التوالي ، أنظر كذلك في الجزء التطبيقي من هذه المذكورة .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

بـ- عندما تكون $\phi_1 < 0$



الشكل (2-6): الدالة PACF للنموذج AR(1) في حالة $\phi_1 < 0$

1-2- نموذج الإنحدار الذاتي من الدرجة الثانية⁽¹⁾ : ARMA(2,0)=AR(2)

يمكن تعليم النموذج (2-8) ليحتوي على مشاهدة حديثة منذ فترتين ذات تأثير على المشاهدة الحالية ، فإننا نتوسيع في المعادلة السالفة الذكر لتتضمن y_t ، أي أنه يمكن التعبير عن y_t كما يلي :

$$y_t = \delta + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t \dots \dots \quad (13-2)$$

حيث تمثل ϕ_1 ، ϕ_2 معالم النموذج الإنحداري الذاتي الواجب تقديرها .

1-2-1 - شروط السكون للنموذج AR(2)

يمكن كتابة النموذج باستعمال فكرة معامل التأخير (L) ، فيكون ما يلي :

$$\begin{aligned} y_t &= \delta + \phi_1 L y_t + \phi_2 L^2 y_t + \varepsilon_t \\ \Rightarrow y_t &= \frac{\delta}{1 - (\phi_1 + \phi_2)} + \frac{\varepsilon_t}{(1 - L\phi_1 - \phi_2 L^2)} \end{aligned}$$

حيث أن المتوسط ثابت و يساوي : $E(y_t) = \mu = \frac{\delta}{1 - (\phi_1 + \phi_2)}$ ، ذلك أن التوقع الرياضي للطرف الثاني يساوي الصفر (لأن $E(\varepsilon_t) = 0$).

وبدراسة الجذور الخاصة (Characteristic Roots) لهذا النموذج فيمكننا استنتاج الشرط الضروري للإستقرار

والمتمثل فيما يلي⁽²⁾ : $\phi_1 + \phi_2 < 1$ وعلى العموم بالنسبة للنموذج AR(p) كما يلي :

$$\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \dots + \phi_p < 1$$

كمأن تباينات النموذج AR(2) تتمثل فيما يلي :

AR(2):Second Order of Auto Regressive Model⁽¹⁾

⁽²⁾ ومن الشروط الأخرى يجب أن يتتوفر أيضا ما يلي :

$$\phi_2 - \phi_1 < 1$$

$$|\phi_2| < 1$$

$$|\phi_1| < 2$$

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\begin{aligned}
 \gamma_0 &= E(y_t) = E[(\phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t) y_t] \\
 &= \phi_1 \gamma_1 + \phi_2 \gamma_2 + \sigma^2_\varepsilon \\
 \gamma_1 &= E[(\phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t) y_{t-1}] \\
 &= \phi_1 \gamma_0 + \phi_2 \gamma_1 \\
 \gamma_2 &= E[(\phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t) y_{t-2}] \\
 &= \phi_1 \gamma_1 + \phi_2 \gamma_2
 \end{aligned}$$

ومنه فإن:

$$\gamma_3 = \phi_1 \gamma_2 + \phi_2 \gamma_1$$

وعلى العموم فإن:

$$^{(1)} \gamma_k = \phi_1 \gamma_{k-1} + \phi_2 \gamma_{k-2} \dots \quad (14-2)$$

١-٢-٢-١- بعض الملامم الخاصة لنموذج AR(2)

كما فعلنا في النموذج AR(1) فسوف نتناول العناصر التالية :

١-٢-٢-١-١- التغابير الذاتي والإرتباط الذاتي :

$$\begin{aligned}
 \text{إنطلاقاً من المعادلة (14-2) الأخيرة يكون لدينا التالي، حيث أن } \rho_k &= \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \\
 \rho_1 &= \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 \gamma_0 + \phi_2 \gamma_1}{\gamma_0} \\
 &= \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} \\
 \rho_2 &= \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = \frac{\phi_1 \gamma_1 + \phi_2 \gamma_0}{\gamma_0} \\
 &= \phi_1 \rho_1 + \phi_2 \\
 &= \phi_1 \left(\frac{\phi_1}{1 - \phi_2} \right) + \phi_2 \\
 &= \left(\frac{\phi_1^2}{1 - \phi_2} \right) + \phi_2
 \end{aligned}$$

. $\rho_3 = \phi_1 \rho_2 + \phi_2 \rho_1$. ويكون :

. $\rho_k = \phi_1 \rho_{k-1} + \phi_2 \rho_{k-2}$ وعلى العموم يكون لدينا:


^(٤) من المرجع [م. حشمان- ٥٢] ، ص ١٣٦ .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

1-2-2-2-1 الدالة ACF للنموذج AR(2)


فيما يلي شكلين يمثلان حالتين هما لدالتي ارتباط ذاتي (ACF) لعملية AR(2) في الحالتين التاليتين :

أ-الحالة الأولى : $\phi_1 = 0.4, \phi_2 = 0.4$



الشكل(7-2) : الدالة ACF للنموذج AR(2) في حالة : $\phi_1 = 0.4, \phi_2 = 0.4$

ب-الحالة الثانية : $\phi_1 = 1.5, \phi_2 = -0.8$



الشكل(8-2) : الدالة ACF للنموذج AR(2) في حالة : $\phi_1 = 1.5, \phi_2 = -0.8$

1-2-3-2-2-1 الدالة PACF للنموذج AR(2)

إنطلاقاً من معادلة (PACF) للنموذج من الدرجة الأولى AR(1)، فتكون للنموذج من الدرجة الثانية AR(2) كما يلي :

$$\phi_{00} = 1 \quad , \quad \text{By Definition}$$

$$\phi_{11} = \rho_1 = \phi_1 \quad , \quad \text{By Definition}$$

$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} \neq 0$$

$$\phi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1 + \phi_2 \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \phi_1 \rho_1 + \phi_2 \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \phi_1 \rho_2 + \phi_2 \rho_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_3 & 1 \end{vmatrix}} = 0$$

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

وذلك لأن العمود الأخير في محددة البسط هو تركيب خطى من العمودين الأول والثاني، كذلك يكون لدينا التالي :

$$\phi_{kk} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & \rho_k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & \rho_k \end{vmatrix} = \phi_1 \rho_0 + \phi_2 \rho_1}{\begin{vmatrix} \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \dots & 1 \end{vmatrix} = \phi_1 \rho_{k-1} + \phi_2 \rho_{k-2}} \quad | \quad | > 0$$

$$= 0 \quad , k = 3, 4, \dots$$


وذلك أيضاً لنفس السبب السابق، إذا كان ما يلي :

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1 & , k = 0 \\ \rho_1 & , k = 1 \\ \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} & , k = 2 \\ 0 & , k \geq 3 \end{cases}$$

أي أنه عموماً $\phi_{kk} = 0 \iff k > 2$

وفيما يلي شكلين بيانيين لدالتي ترابط ذاتي جزئي (PACF) لعملية AR(2) كما يلي ⁽²⁾ :

أ- الحالة الأولى : $\phi_1 = 0.4, \phi_2 = 0.4$




الشكل(9-2) : الدالة PACF للنموذج AR(2) في حالة : $\phi_1 = 0.4, \phi_2 = 0.4$

⁽¹⁾ من المرجع [M.TENANHAUS-94] ، ص 291.

⁽²⁾ من المرجع [ع.برى-02] ، ص ص 43-44 .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

بـ- الحالة الثانية : $\phi_1 = 1.5, \phi_2 = -0.8$



الشكل(2-10) : الدالة PACF للنموذج AR(2) في حالة : $\phi_1 = 1.5, \phi_2 = -0.8$

أي أن الدالة PACF للنموذج AR(2) تنعدم بعد الفجوة الزمنية المساوية لـ 2 .

١-٣-١ - نموذج الإنحدار الذاتي من الدرجة : $p:AR(p)$

إن هذا النموذج من الشكل التالي^(١) :

$$y_t = \delta + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

وبإدخال معامل الإزاحة للخلف (L) يكون لدينا ما يلي :

$$y_t = \delta + \phi_1 L^1 y_t + \phi_2 L^2 y_t + \dots + \phi_p L^p y_t + \varepsilon_t$$

$$\Rightarrow (\phi_1 L^1 y_t - \phi_2 L^2 y_t - \dots - \phi_p L^p y_t) y_t = \delta + \varepsilon_t$$

$$\Phi(L) y_t = \delta + \varepsilon_t$$

حيث أن : $\Phi(L) = (\phi_1 L^1 - \phi_2 L^2 - \dots - \phi_p L^p)$ و ε_t عبارة عن صدمات عشوائية، أي أن :

١-٣-٢ - شرط السكون للنموذج : $AR(p)$

حتى يكون هذا النموذج مستقرًا يكفي أن يكون قابل للإنعكاس، أي يمكن كتابته على شكل نموذج لصدوات عشوائية نهائي ، وبعبارة أخرى ، إذا كانت جذور كثير الحدود (B) أكبر من الواحد القيمة المطلقة، أي $|G_i| < 1$ ^(٢)،

$$\Phi(B) = (1 - G_1 B)(1 - G_2 B) \dots (1 - G_p B)$$

١-٣-٣ - بعض الملامم الخاصة لعملية $AR(p)$:

كما فعلنا في النماذج السابقة ، فإننا سوف نتناول في النموذج المعمم ما يلي :

١-٣-٤ - الدالة ACF للنموذج : $AR(p)$

إن هذه الدالة من الشكل التالي^(٣) :

$$P_k = \phi_1 P_{k-1} + \phi_2 P_{k-2} + \dots + \phi_p P_{k-p}$$

^(١) من المرجع [م. حشمان-٠٢]، ص ١٣٠.

^(٢) من المرجع [G.BRESSON-٩٥]، ص ٢٢.

^(٣) من المرجع [م. حشمان-٠٢]، ص ١٣٦ .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

وباستعمال معاملات G_i لكثير الحدود (L^p) ، فإنه يمكن إثبات أن الدالة (ACF) يمكن إعطاؤها بالصيغة التالية ^(١) :

$$\rho_k = \sum_{i=1}^p A_i G_i^k$$

حيث أن A_i عبارة عن قيم ثابتة .

ومن شرط الاستقرارية $|G_i| < 1$ ، فإن الدالة AR(p) للنموذج (ACF) تمتد لانهائيًا وتكون من التخامدات الأساسية والتخامدات الجيبيّة .

١-٣-٢-٢-٣-الدالة PACF للنموذج:

إن نموذج الإنحدار الذاتي من الدرجة p ، (وذلك باستبدال رمز المتغير التابع z_t ، والحد التابع إلى μ ، والحد العشوائي كذلك إلى μ_t) كما يلي ^(٢) :

$$z_t = \mu + \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \dots + \phi_p z_{t-p} + 0 z_{t-p-1} + \dots + 0 z_{t-k} + \mu_t$$

وبالتالي فإن $\phi_{kk} = 0$ من أجل كل $k > p$

أي أن الدالة AR(p) للنموذج (PACF) تتكون من أصفار لقيم التخلفات (Lags) $k > p$:

$$\phi_{11} = \phi_{22} = \phi_{33} = \dots = \phi_{pp} \neq 0$$

$$\phi_{p+1,p+1} = \phi_{p+2,p+2} = \dots = 0$$

ويسمى هذا قطعاً في دالة الترابط الذاتي الجزيئي بعد التخلف $k > p$.

٢- نماذج المتوسطات المتحركة MA:

من الممكن التوسيع في نموذج (1) AR باستخدام التغييرات العشوائية التي حدثت في الماضي لمعرفة ما إذا كان من الممكن الوصول إلى تمثيل أفضل لبيانات السلسلة الزمنية ، وعلى وجه التحديد ، يمكن تعديل نموذج (1) AR كما يلي :

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} \dots \quad (15-2)$$

حيث تمثل ε_t التغيير العشوائي في الفترة $t-1$ ، كما تسمى θ_1 معلمة المتوسطات المتحركة التي يجب تقديرها ، وتصف هذه المعلمة تأثير التغيير العشوائي السابق على y_t .

٢-١- نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الأولى MA(1) = ARMA(0,1) ^(٣) :

يمكن الحصول على نموذج خاص من المعادلة (14) ، وذلك بحذف المتغير السابق y_{t-1} ، ويتم التعبير عن المشاهدة الحالية y_t كدالة خطية في التغيير العشوائي الحالي ε_t والسابق ε_{t-1} ، ويمكن التعبير رياضياً عن نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الأولى ^(٤) كما يلي :

^(١) من المرجع [M.TENENHAUS-94] ، ص 289.

^(٢) من المرجع [C.GOURIEROUS-95] ، ص 149.

^(٣) MA(1) :First-Order Moving Average Model

^(٤) حيث تحدد درجة المتوسطات المتحركة كما هي في نماذج الإنحدار الذاتي بعدد العالم الواجب تقديرها في النموذج المعنى . وفي هذه الحالة ، نجد أن عدد معالم النموذج يساوي عدد التغييرات العشوائية السابقة الموجودة في النموذج المستخدم في تمثيل عملية السلسلة .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$^{(1)} y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} \dots \dots \quad (16-2)$$

حيث تمثل θ_1 معلمة نموذج التغيرات المتحركة، وكما فعلنا في عملية الإنحدار الذاتي، فإننا نفترض أن التغيرات العشوائية مستقلة عن بعضها البعض، وأن لها توزيع متعدد متواسطه الصفر وتباعيته σ^2 ثابت ، أي أنها تحقق المعادلتين (9-2) و (10-2).

١-١-٢- شرط الانعكاس لنموذج (1): MA(1)

كما في جزء (١-١-١) الذي تعرّفنا فيه على الشروط المفروضة على معالم نموذج الإنحدار الذاتي AR(1) نتيجة لضرورة تحقيق سكون النموذج ، سوف نقوم هنا كذلك بتحقيق نفس الهدف ، وذلك بإجراء نفس الحسابات لعملية MA(1).

حيث أنه وبالنسبة لهذا النموذج وباستخدام الشروط الخاصة بالتغييرات العشوائية و المحددة في المعادلات (9-2) و (10-2)، فنجد أن الوسط الحسابي لهذه العملية يساوي الصفر، وأن تباعييها ثابت ، أي أن :

$$\begin{aligned} E y_t &= E(\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}) = E \varepsilon_t + \theta_1 E \varepsilon_{t-1} = 0 \\ \text{var}(y_t) &= E[(\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1})^2] \\ &= E(\varepsilon_t^2 + 2\theta_1 \varepsilon_{t-1} \varepsilon_t + \theta_1^2 \varepsilon_{t-1}^2) \\ &= (1 + \theta_1^2) \sigma_\varepsilon^2 \end{aligned}$$

وذلك باستخدام المعادلة (11-2) نجد أن: $E(2\theta_1 \varepsilon_{t-1} \varepsilon_t) = 0$ ، وبالتالي يمكن إثبات أن التغاير بين y_t و y_{t-1} ثابت كما يلي (٢) :

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= Cov(y_t, y_{t-1}) = E[(y_t - u)(y_{t-1} - u)] \\ &= E[(\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-2})] \\ &= E(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \theta_1 \varepsilon_t \varepsilon_{t-2} + \theta_1^2 \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-2}) \\ &= \theta_1 \sigma_\varepsilon^2 \\ \gamma_2 &= Cov(y_t, y_{t-2}) = E[(y_t - u)(y_{t-2} - u)] \\ &= E[(\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} + \theta_2 \varepsilon_{t-3})] \\ &= 0 \end{aligned}$$

ونتيجة لثبات التباين والتغاير ، فإن الإرتباط الذاتي ثابت أيضاً .

لذا نجد أن شرط السكون لا يفرض أي قيد على قيمة θ_1 ، وعلى الرغم من ذلك ، فإذا كانت $|\theta_1| > 1$ ، فإن هذا يؤدي إلى تفسير غير واقعي للمعادلة (17-2) ، وهو أن تأثير مشاهدات الماضي ، أي تأثير مشاهدات s 's السابقة ، يتزايد كلما عدنا إلى الوراء في الزمن . فليس من الواقع في شيء الإعتقد بأن تأثير مشاهدة حدثت في الماضي البعيد على المشاهدة الحالية أكبر من تأثير مشاهدة حدثت في الماضي القريب ، لذا فإن $|\theta_1|$ يجب أن تتحقق الشرط $|\theta_1| < 1$ ، ويُطلق على هذا الشرط إسم

^(٤) من المرجع [J.D.HAMILTON-94] ، ص 48.

^(٥) الصفحة 49 من المرجع السابق .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

" شرط انعكاس عملية MA(1)" .⁽¹⁾

2-1-2- مميزات خاصة لعملية MA(1) :

يمكن التمييز بين عملية المتغيرات المتحركة والعمليات الأخرى باستخدام التغير الذاتي ، معاملات الإرتباط الذاتي ، ودالة الذاكرة لهذه العملية ، وستقوم في هذا الجزء بفحص ملامح MA(1) .

2-1-2-1- دالة الذاكرة :

إن دالة الذاكرة هي التوقع البياني لمعاملات الذاكرة ، وهي معاملات حدود الخطأ عند تمثيل القيمة الحالية للسلسلة الزمنية ، وبدلالة الأخطاء السابقة فقط ، وبالتالي يمكن الحصول على دالة ذاكرة عملية MA مباشرة من تعريف العملية نفسها .

حيث يتضح لنا أنه بالنسبة لعملية MA ، أن التغير العشوائي في الفترة الزمنية t ، وهو ϵ_t ، يؤثر في الفترة الزمنية t وال فترة $t+1$ ، ولكنه لا يؤثر في مشاهدة أية فترة زمنية بعد الفترة $t+1$ ، فعند الفترة الزمنية t سيكون تأثير التغير العشوائي ϵ_t سيكون كاملاً ، ولكن هذا التأثير يتناسب مع θ_1 في الفترة الزمنية $t+1$ ، ولذا نجد أن ذاكرة عملية MA(1) تدوم لفترة واحدة فقط .

2-1-2-2- التغير الذاتي والدالة (ACF) لنموذج MA(1) :

بصفة عامة و كنتيجة ما يلي⁽²⁾ :

$$\begin{cases} k \leq q \Rightarrow \gamma_j \neq 0 \\ k > q \Rightarrow \gamma_j = 0 \end{cases}$$

حيث q تمثل درجة النموذج (MA(q)) .

وبالتالي ، وتبعاً لما سبق ، تكون الدالة (ACF) لنموذج معين هي :

$$Corr(y_t, y_{t-j}) = \frac{Cov(y_t, y_{t-j})}{\sqrt{\text{var } y_t} \sqrt{\text{var } y_{t-j}}} = \frac{\gamma_j}{\sqrt{\gamma_0} \sqrt{\gamma_0}} = \rho_j$$

إذن ، فلما تكون $j=1$ ، يكون لدينا :

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\theta_1}{(1+\theta_1^2)}$$

وفي حالة $j=2$ يكون لدينا :

$$\rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = 0$$

⁽¹⁾ من المرجع [و.فاندل-92]، ص 77 .

⁽²⁾ من المرجع [م.حشمان-02]، ص 125 .


الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

وعومماً نجد :

$$(1) \rho_k = \begin{cases} \frac{\theta_1}{1+\theta_1^2}, & k=1 \\ 0, & k>1 \end{cases}$$


وبمقارنة معاملات الإرتباط الذاتي لعملية MA(1) مع معاملات الإرتباط الذاتي لعملية AR(1) السابقة، نلاحظ أن معاملات الإرتباط الذاتي لنموذج AR(1) تقترب من الصفر تدريجياً، بينما معاملات الإرتباط الذاتي لنموذج MA(1) تساوي الصفر فجأة لأن $\rho_1 \neq 0$ ، بينما نجد أن $\rho_k = 0$ لجميع قيم $k > 1$ ، ولها الشكل الموالى في الحالتين التاليتين :

١- عندما : $\theta_1 = 0.8$



الشكل(١١-٢) : الدالة ACF لنموذج MA(1) في حالة : $\theta_1 = 0.8$

ب- عندما : $\theta_1 = -0.8$



الشكل(١٢-٢) : الدالة ACF لنموذج MA(1) في حالة : $\theta_1 = -0.8$

^(٦) من المرجع [م. حشمان-٠٢] ، ص ص ١٢٦-١٢٧.

^(٧) من المرجع [ع. بري-٠٢] ، ص ٤٦.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

1-2-3- الدالة PACF للنموذج MA(1)

يتم اشتقاق هذه الدالة كما يلي⁽¹⁾:

$$\phi_{00} = 1 \quad , \quad \text{By Definition}$$

$$\phi_{11} = \rho_1 \quad , \quad \text{By Definition}$$

$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \\ \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \\ \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 0 \\ \end{vmatrix}}{1 - \rho_1^2} = \frac{-\theta_1^2}{1 + \theta_1^2 + \theta_1^4} = \frac{-\theta_1^2(1 - \theta_1^2)}{1 - \theta_1^6}$$


$$\phi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_3 & \rho_1 \\ \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & 0 \\ 0 & \rho_1 & 0 \\ \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & 0 \\ 0 & \rho_1 & 0 \\ \end{vmatrix}}{1 - 2\rho_1^2} = \frac{\rho_1^3}{1 - 2\rho_1^2} = \frac{-\theta_1^3(1 - \theta_1^2)}{1 - \theta_1^8}$$

وبشكل عام تكون كما يلي :

$$\phi_{kk} = \frac{-\theta_1^k(1 - \theta_1^2)}{1 - \theta_1^{2(k+1)}} \quad , \quad k > 0$$

وتأخذ الشكلين التاليين المقابلين لكل حالة كما يلي :

أ- عندما $\theta_1 = -0.8$




الشكل(2-13): الدالة PACF للنموذج MA(1) في حالة $\theta_1 = -0.8$

⁽¹⁾ من المرجع [ع.برى-02]، ص 47.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

بـ - عندما $\theta_1 = 0.8$



الشكل(١٤-٢) : الدالة PACF للنموذج MA(1) في حالة $\theta_1 = 0.8$

٢-٢- نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الثانية $MA(2) = ARMA(0,2)$ ^(٤) :

يمكن التوسيع في نموذج MA(1) ليتضمن عدداً آخر من التغيرات العشوائية السابقة ليصبح هناك متغيرين عشوائيين كما يلي :

$$(18-2) \quad y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} \dots$$

حيث أن ε تمثل صدمات عشوائية .

١-٢-٢- شروط استقرارية النموذج $MA(2)$

انطلاقاً من المعادلة (١٨-٢) السابقة نجد ما يلي :

إن متوسط النموذج $E(y_t) = \mu$ ، ذلك أن $E(\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}) = 0$ (أنظر المعادلة (٩-٢)) .

أما تبايناته فتكون معطاة بالشكل التالي^(٥) :

$$\gamma_0 = \sigma_\varepsilon^2 (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)$$

$$\gamma_1 = \sigma_\varepsilon^2 \theta_1 (1 + \theta_2^2)$$

$$\gamma_2 = \sigma_\varepsilon^2 \theta_2$$

$$\gamma_3 = \gamma_4 = \dots = \gamma_q = 0$$

إذن فهذا النموذج يكون دوماً مستقراً، وبالتالي فشروط الاستقرارية لا تفرض أي قيد على معلمات النموذج ، أما شروط

الإنعكاس فإنها تكون كما يلي^(٦) :

$$|\theta_1| + |\theta_2| < 1 \quad , \quad |\theta_1| - |\theta_2| < 1 \quad , \quad |\theta_2| < 1$$

MA(2):Second Order Moving Average Model^(٤)

^(٤) من المرجع [م. حشمان-٠٢]، ص ١٢٨

^(٥) الصفحة ١٢٨ من المرجع السابق .

^(٦) من المرجع [G.BRESSON -٩٥] ، ص ٣٧

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

2-2-2- مميزات خاصة لعملية MA(2)

سوف نتناول الدالتين ACF و PACF للنموذج MA(2) كما يلي :

2-2-2-1 - الدالة ACF للنموذج :

من العلاقة :

$$Corr(y_t, y_{t-j}) = \frac{Cov(y_t, y_{t-j})}{\sqrt{\text{var } y_t} \sqrt{\text{var } y_{t-j}}} = \frac{\gamma_j}{\sqrt{\gamma_0} \sqrt{\gamma_0}} = \rho_j$$

فيكون لدينا التالي :

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\theta_1 \sigma_e^2 (1 + \theta_2)}{\sigma_e^2 (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} \\ &= \frac{\theta_1 (1 + \theta_2)}{(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} \end{aligned}$$

أما دالة الإرتباط الذاتي من الدرجة الثانية فتكون كما يلي :

$$\begin{aligned} \rho_2 &= \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = \frac{\theta_2 \sigma_e^2}{\sigma_e^2 (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} \\ &= \frac{\theta_2}{(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} \end{aligned}$$


أما من الدرجة الثالثة ف تكون كما يلي :

$$\rho_3 = \frac{\gamma_3}{\gamma_0} = 0$$

أي أن الدالة ACF للنموذج MA(2) تندع بعد الفجوة الزمنية 2 ، وفيما يلي شكلان يمثلان الدالة ACF في الحالتين

التاليتين :

أ- الحالة الأولى : $\theta_1 = 0.4, \theta_2 = 0.4$




الشكل(15-2) : الدالة ACF للنموذج MA(2) في حالة : $\theta_1 = 0.4, \theta_2 = 0.4$

⁽⁴⁾ من المرجع [م. حشمان-02]، ص129.

الفصل الثاني : طريقة بوكس - جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

بـ- الحالة الثانية $\vartheta_1 = 1.5, \vartheta_2 = -0.8$




الشكل (16-2): الدالة ACF للنموذج (2) في حالة $\theta_1 = 1.5, \theta_2 = -0.8$

-2-2-2-2 : MA(2) للنموذج PACF الدالة

من الصعب جداً إيجاد شكل مغلق لدالة الترابط الذاتي الجزئي لهذا النموذج ، ولهذا سوف نستخدم تعريف الدالة


PACF لحسابها ورسمها تكراريا لقيم المعلمتين التاليتين على التوالي^(٤) :

أ- الحالة الأولى :



الشكل (١٧-٢) : الدالة PACF للنموذج (2) MA في حالة $\theta_1 = 0.4, \theta_2 = 0.4$

بـ- الحالة الثانية :



الشكل(2-18): الدالة PACF للنموذج MA(2) في حالة :

⁽⁴⁾ من المرجع [ع. بري-02]، ص 51.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

2-3- نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة q⁽¹⁾ : MA(q)

إذا كان النموذج (2-16) يتضمن عدداً أكبر من التغيرات العشوائية السابقة، حيث يمكن التعبير عن هذه العملية من الدرجة q، ويُشار إليه بالرمز MA(q)، كما يلي⁽²⁾ :

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

كما يمكننا كتابة هذا النموذج باستعمال فكرة مشغل الإزاحة (B : Backward)، كما يلي :

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 B \varepsilon_t + \theta_2 B^2 \varepsilon_t + \dots + \theta_q B^q \varepsilon_t$$

$$y_t = \mu + (1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q) \varepsilon_t$$

$$y_t = \mu + \theta(B) \varepsilon_t$$

$$\theta(B) = (1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q)$$

ومن شروط استقرارية السلسلة الزمنية أن يكون وسطها غير مترابط مع الزمن، وتباينها نهائي، حيث أن وسط هذه

السلسلة الزمنية تحت هذه الفرضيات يساوي μ ، وهو مستقل عن الزمن، وتباينها كما يلي :

$$Var(y_t) = \sigma^2 = E(y_t - \mu)$$

$$= E(\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q})^2$$

$$= \sigma^2 (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_q)$$

وباستعمال الفرض: $\sum_{i=1}^q \theta_i^2 = 0$ ، وهو مقدار نهائي، أي :

أي أن النموذج MA(q) هو نموذج مستقر، وبالتالي فإن شروط الاستقرارية لا تفرض أي قيد على المعالم

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ ، ودالة ذاكرة النموذج MA(q) هي التوزيع البياني للقيم $1, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ ، وهذا يعني أن

تأثير التغير العشوائي يُحسم بـ q من الفترات فقط.

2-3-1- شروط انعكاس النموذج MA(q) :

إن اشتقاق شرط انعكاس هذا النموذج ليس بسيطاً كما هو الحال عند اشتقاق شرط انعكاس النموذج من الدرجة الأولى ، ذلك

أنه يتضمن دوال غير خطية المعالم كما يلي، وباستعمال معامل التأخير :

$$y_t = \mu + \theta(B) \varepsilon_t$$

$$\Rightarrow y_t - \mu = \theta(B) \varepsilon_t$$

$$\Rightarrow y_t = \theta(B) \varepsilon_t$$

$$\Rightarrow \varepsilon_t = \theta^{-1}(B) y_t$$

⁽¹⁾ هي اختصار لـ Moving Average Of Order q

⁽²⁾ أنظر المرجع [J.D.HAMILTON-94] ، ص 51 .

⁽³⁾ من المرجع [م. حشمان-02] ، ص 124 .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\theta(B) = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \cdots - \theta_q B^q) = (1 - \pi_1 B)(1 - \pi_2 B) \cdots (1 - \pi_q B)$$

$$\prod_{j=1}^q (1 - \pi_j B)$$

إذن :

$$\varepsilon_t = \left[\sum_{j=1}^q \frac{h_j}{(1 - \pi_j B)} \right] y_t$$

وبالتالي، وحتى يكون النموذج $MA(q)$ نموذج انعكاسي يجب أن تكون جذور المعادلة المتجانسة $0 = \theta(B)$ أكبر من الواحد الصحيح بالقيمة المطلقة، وبعبارة أخرى $|\pi_j| < 1$.

2-3-2- مميزات خاصة لعملية $MA(q)$:

كما فعلنا في السابق سوف نتناول الدالتين ACF و $PACF$ للنموذج $MA(q)$ كما يلي :

2-3-2-1- الدالة ACF للنموذج $MA(q)$:

إن دالة الإرتباط الذاتي تندفع (تُبتر) مباشرة بعد الدرجة q كما يلي :

وانطلاقاً من معادلة التباين للنموذج $MA(q)$ التالية⁽²⁾ :

$$\begin{aligned} \gamma_j &= E[(\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q})(\varepsilon_{t-j} + \theta_1 \varepsilon_{t-j-1} \\ &\quad + \theta_2 \varepsilon_{t-j-2} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-j-q})] \\ &= E[(\theta_j \varepsilon_{t-j}^2 + \theta_{j+1} \varepsilon_{t-j-1}^2 + \theta_{j+2} \varepsilon_{t-j-2}^2 + \cdots + \theta_q \theta_{q-j} \varepsilon_{t-q}^2)] \\ \Rightarrow \gamma_j &= \begin{cases} [\theta_j + \theta_{j+1} + \theta_{j+2} + \cdots + \theta_q \theta_{q-j}] \sigma^2 & , \quad \text{for } j = 1, 2, \dots, q \\ 0 & , \quad \text{for } j > q \end{cases} \end{aligned}$$

وكذلك التباين المشترك يعطى بالشكل التالي :

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= \sigma^2 + \theta_1 \sigma^2 + \theta_2 \sigma^2 + \cdots + \theta_q \sigma^2 \\ &= (1 + \theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_q) \sigma^2 \quad , \quad \text{for } j = 1, 2, \dots, q \end{aligned}$$

ومنه فإن الدالة ACF تُعطى بالشكل :

$$\rho_j = \begin{cases} \frac{\theta_j + \theta_{j+1} + \theta_{j+2} + \cdots + \theta_q \theta_{q-j}}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2 + \cdots + \theta_q^2} & , \quad j = 1, 2, \dots, q \\ 0 & , \quad j > q \end{cases}$$

أي أن دالة الإرتباط الذاتي ACF تتكون من أصفار لقيم التخلفات $j > q$ ، أي :

$$p_1 = p_2 = p_3 = \cdots = p_q \neq 0$$

$$\phi_{q+1, q+1} = \phi_{q+2, q+2} = \cdots = 0$$

⁽¹⁾ من المرجع [G.BRESSON-95] ، ص 33-34.

⁽²⁾ من المرجع [J.D.HAMILTON-94] ، ص 51.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

ويسمى هذا قطعاً في دالة الترابط الذاتي بعد التخلف $k > q$ ⁽¹⁾.

3-2-2- الدالة PACF للنموذج : MA(q)

إن دالة الإرتباط الذاتي الجزئي PACF للنموذج MA(q) تمتد لانهائياً وتكون من خليط من التخامدات الأسيّة والتخامدات الجيبية.

3- نماذج الإنحدار الذاتي و المتواترات المتحركة المختلطة ARMA(p,q)⁽²⁾:

حيث يفترض أنه إذا كان النموذجين AR(p) و MA(q) مستقرين في وحدة الزمن ، وبالتالي فالنموذج المختلط ARMA(p,q) يكون مستقر تعريفاً⁽³⁾.

3-1- النموذج ARMA(1,1)

إن هذا النموذج هو عبارة عن دمج كلًّا من النموذجين AR(1) و MA(1) كما يلي :

$$y_t - \phi_1 y_{t-1} = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} \dots \dots \quad (18-2)$$

أي أن :

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} \dots \dots \quad (19-2)$$

ومن المهم معرفة أن استخدام نماذج الإنحدار الذاتي والمتواترات المتحركة المختلطة يؤدي إلى تخفيف كبير في معالم النموذج، فيمكن إثبات إمكانية إعادة صياغة (18-2) في صورة عملية MA(∞) ، وذلك بالحذف المتتالي للعناصر y_{t-1} ، y_{t-2} ، وهكذا . وبالمثل يمكن إعادة صياغة هذا النموذج في صورة عملية AR(∞) ، وذلك بالحذف المتتالي للعناصر ε_{t-1} ، ε_{t-2} ، وهكذا . وحيث أن تكلفة تمثيل عملية السلسلة في صياغة إنحدار ذاتي فقط أو في صياغة متواترات متحركة فقط تتمثل في عدد كبير جدًا من المعامل الواجب تقديرها، وأيضاً في عدم استغلال البيانات بكفاءة .

3-1-1- قيود على معالم النموذج : ARMA(1,1)

سوف نقوم بحساب الوسط الحسابي والتغيرات الذاتية للعملية الممثلة في (18-2) لمعرفة القيود الناجمة عن شرطي السكون والإعكاس المفروضة على المعلمتين ϕ_1 و θ_1 ، ويمكن حساب التباين بتربيع الطرف الأيمن ثم أخذ التوقع الرياضي لنجد أن :

⁽¹⁾ لاحظ الإزدواجية (Duality) بين النموذجين AR و MA.

⁽²⁾ Mixed Auto Regressive Model

⁽³⁾ انظر المرجع [B.COUTROT-84] ، ص ص 61 - 66

الفصل الثاني : طريقة بوكس-جنكнер لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\begin{aligned}
 \gamma_0 &= \text{Var}(y_t) \\
 &= E(y_t^2) = E\left\{y_t(\phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1})^2\right\} \\
 &= E\left\{(\phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1})(\phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1})\right\} \\
 &= E(\phi_1^2 y_{t-1}^2 + \varepsilon_t^2 + \theta_1^2 \varepsilon_{t-1}^2 + 2\phi_1 y_{t-1} \varepsilon_t + 2\theta_1 \phi_1 y_{t-1} \varepsilon_{t-1} + 2\theta_1 \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}) \\
 &= \phi_1^2 E(y_{t-1}^2) + \sigma_\varepsilon^2 + \theta_1^2 \sigma_\varepsilon^2 + 2\theta_1 \phi_1 E(y_{t-1} \varepsilon_{t-1})
 \end{aligned}$$

ولقد تم الحصول على السطر الأخير باستخدام الشرطين (10-2) و (11-2)، ومن أجل حساب $E(y_{t-1} \varepsilon_{t-1})$ نلاحظ أن :

$$y_{t-1} = \phi_1 y_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-2}$$

لذا فإن استخدام الشرطين (10-2) و (11-2) يبيّن أن :

$$E(y_{t-1} \varepsilon_{t-1}) = \sigma_\varepsilon^2$$

وباستخدام هذه المعادلة الأخيرة ، وكذلك شرط السكون الذي يشير إلى أن :

$$\text{var}(y_t) = \text{var}(y_t^2) = \text{var}(y_{t-1}^2)$$

فنجد أن :

$$\gamma_0 = \text{Var}(y_t) = \frac{1 + \theta_1^2 + 2\theta_1 \phi_1}{(1 - \phi_1^2)} \sigma_\varepsilon^2$$

وحتى تكون القيمة الأخيرة γ_0 موجبة ونهائية يجب أن تكون $|\phi_1| < 1$ ، وهو ما يسمى بشرط الاستقرار ، وهناك شرط آخر وهو شرط الإنقلاب $|\theta_1| < 1$ ، وهناك شرط آخر يسمى شرط الامتساخ (Degeneracy Condition) ، وهو $\phi_1 \neq \theta_1$ ، وهذا الشرط يضمن عدم امتساخ النموذج إلى نموذج أقل درجة ففي حالة كون $\phi_1 = \theta_1$ ، فمن العلاقة $(1 - \phi_1 B)y_t = \delta + (1 - \theta_1 B)\varepsilon_t$ ، وبالقسمة على $(1 - \phi_1 B)$ نجد أن النموذج يصبح على الشكل التالي :

$$\text{ARMA}(0,0) \text{ وهو } \delta = y_t - \theta_1 \varepsilon_t \text{ ، حيث أن } \theta_1 \neq 1.$$

وبالمثل ، يمكننا حساب التغير الذاتي عند فجوة زمنية مقدارها 1 فنجده أن :

$$\begin{aligned}
 \gamma_1 &= E(y_t y_{t-1}) = E(\phi_1 y_{t-1}^2 + \varepsilon_t y_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} y_{t-1}) \\
 &= \phi_1 \gamma_0 + \theta_1 \sigma_\varepsilon^2
 \end{aligned}$$

وذلك أن $E(\varepsilon_t y_{t-1}) = 0$ من المعادلة (11-2).

وأخيراً ، نجد أن التغير الذاتي عند فجوة زمنية مقدارها 2 هو كما يلي :

$$\gamma_2 = E(y_t y_{t-2}) = E(\phi_1 y_{t-1} y_{t-2} + \varepsilon_t y_{t-2} - \theta_1 \varepsilon_{t-1} y_{t-2}) = \phi_1 \gamma_1$$

ولاشتقاق هذه المعادلة الأخيرة ، فإننا استخدمنا $E(\varepsilon_t y_{t-2}) = 0$ و $E(\varepsilon_{t-1} y_{t-2}) = 0$ ، كما استخدمنا الحقيقة الناجمة من شرط السكون وهي : $E(y_{t-1} y_{t-2}) = E(y_t y_{t-1})$. وبالمثل ، يمكن إثبات أنه لجميع قيم $k \geq 2$ ، فإن :

$$\begin{aligned}
 \gamma_k &= \phi_1 \gamma_{k-1} \\
 &= \phi_1^{k-1} \gamma_1
 \end{aligned}$$

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

٣-١-٢- مميزات خاصة لنموذج ARMA(1,1)

سوف نذكر في هذا الصدد معاملات الإرتباط الذاتي، ودالة ذاكرة لهذه العملية التي تختلف عن مثيلاتها الخاصة بعملية MA(1) أو AR(1).

٣-١-٢-١- الدالة ACF للنموذج ARMA(1,1)


إن معاملات الإرتباط الذاتي، وهي تساوي $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$ ، تأخذ الصيغة التالية :

$$\begin{aligned}\rho_1 &= \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{\sigma^2 \cdot (\phi + \theta_1)(1 + \phi\theta_1) \cdot (1 - \phi^2)}{(1 - \phi^2) \cdot \sigma^2 \cdot (1 + 2\theta_1\phi + \theta_1^2)} \\ \Rightarrow \rho_1 &= \frac{(\phi + \theta_1)(1 + \phi\theta_1)}{(1 + 2\theta_1\phi + \theta_1^2)}\end{aligned}$$

لما تكون $\rho_1 > 1$ ، فإن $\rho_k = 0$ ، $k > 1$


وكما هو الحال في عملية AR(1) الساكنة، فإن معاملات الإرتباط الذاتي لعملية ARMA(1,1) الساكنة تقترب من الصفر تدريجياً ، ويتحدد معدل الإقتراب من الصفر بمعامل الإنحدار الذاتي ϕ_1 ، ولكنه يتأثر بمعامل الإنحدار الذاتي والمتوازنات المتحركة، وبناءً على ذلك قد يكون من الصعب التمييز بين عملية ARMA(1,1) وعملية AR(1) ،

وتكون الدالة ACF في الحالة قيم المعلمتين $\phi_1 = 0.9, \theta_1 = -0.5$ كما يلي ^(٢) :



الشكل(٢٩) : الدالة ACF للنموذج ARMA(1,1) في حالة $\phi_1 = 0.9, \theta_1 = -0.5$

أما في حالة $\phi_1 = -0.9, \theta_1 = -0.5$ ، فتكون الدالة ACF للنموذج ARMA(1,1) كما يلي :



الشكل(٢٠) : الدالة ACF للنموذج ARMA(1,1) في حالة $\phi_1 = -0.9, \theta_1 = -0.5$

^(٤) من المرجع [م. حشمان-٠٢]، ص ١٤٢

^(٥) من المرجع [ع. بري-٠٢]، ص ٥١

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

نلاحظ أن الدالة ACF للنموذج ARMA(1,1) تتحامد أسيّا في اتجاه واحد أو متعدد بين القيم الموجبة والسلبية وهي في هذا تشبه تماما الدالة ACF للنموذج AR(1) ماعدا أن التحامد يبدأ من ρ_1 .

٢-١-٣-٢- الدالة PACF للنموذج ARMA(1,1)

إن هذه الدالة والتي يرمز لها بالرمز ϕ_{kk} تُحسب تعريفا كالتالي :

$$\phi_{00} = 1 \quad , \text{By Definition}$$

$$\phi_{11} = \rho_1 = \frac{(1 - \phi_1\theta_1)(\phi_1 - \theta_1)}{1 + \phi_1^2 - 2\phi_1\theta_1}$$

$$\phi_{22} = \frac{\phi_2 - \phi_{11}\rho_1}{1 - \phi_{11}\rho_1}$$

$$\phi_{33} = \frac{\phi_3 - \phi_{21}\phi_2 - \phi_{22}\phi_1}{1 - \phi_{21}\phi_1 - \phi_{22}\phi_2} \quad , \quad \phi_{21} = \phi_{11} - \phi_{22}\phi_{11}$$

كذا تُحسب بقية القيم تكرارياً.


فمثلاً للقيم $\phi_1 = 0.9$, $\theta_1 = -0.5$ نجد :

$$\phi_{11} = 0.944186 \quad \phi_{22} = -0.384471 \quad \phi_{33} = 0.183710$$

$$\phi_{44} = -0.908462 \quad \phi_{55} = 0.452979 \quad \phi_{66} = -0.226337$$

$$\phi_{77} = 0.113154 \quad \phi_{88} = -0.565702 \quad \phi_{99} = 0.282834$$

ونرسم هذه القيم كما يلي^(٤) :



الشكل(٢-٢) : الدالة PACF للنموذج ARMA(1,1) في حالة : $\phi_1 = 0.9$, $\theta_1 = -0.5$

نلاحظ أن الدالة PACF للنموذج ARMA(1,1) تتحامد أسيّا في اتجاه واحد أو متعدد بين القيم الموجبة والسلبية، وهي في هذا تشبه تماما الدالة PACF لنموذج MA(1) ماعدا أن التحامد يبدأ بعد القيمة الأولية $\phi_{11} = \rho_1$.

^(٤) من المرجع [ع.برى-٠٢]، ص ٥٥.

^(٥) أنظر المرجع [م.حشمان-٠٢]، ص ١٤٣.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

3-2- نماذج ARMA من درجة أعلى:

يمكن التوسيع في نموذج ARMA(1,1) الممثل في المعادلة (2-18)، وذلك بضم عدد أكبر من معالم الإنحدار الذاتي ومعالم المتواترات المتحركة ، وعموماً تتم صياغة النموذج ARMA(p,q) كما يلي :

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

حيث تشتمل هذه النماذج كما يظهر في الكتابة اللاتينية أعلاه على القسم الإنحداري ذي الدرجة p وقسم المتواترات المتحركة ذو الدرجة q .

وبإدخال فكرة معامل التأخير(B) فنجد ما يلي :

$$y_t = \phi_1 B^1 y_t + \phi_2 B^2 y_t + \dots + \phi_p B^p y_t + \varepsilon_t + \theta_1 B^1 \varepsilon_t + \theta_2 B^2 \varepsilon_t + \dots + \theta_q B^q \varepsilon_t$$

$$y_t - \phi_1 B^1 y_t - \phi_2 B^2 y_t - \dots - \phi_p B^p y_t = \varepsilon_t + \theta_1 B^1 \varepsilon_t + \theta_2 B^2 \varepsilon_t + \dots + \theta_q B^q \varepsilon_t$$

$$(1 - \phi_1 B^1 - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) y_t = (1 + \theta_1 B^1 + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q) \varepsilon_t$$

$$\phi(B) y_t = \theta(B) \varepsilon_t$$

3-1- شروط استقرار وانعكاس النموذج :

لكي يكون هذا النموذج مستقرًا يجب أن تكون كل الجذور لمعادلة المتتجانسة $0 = \phi(B) y_t$ أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة أمّا بالنسبة لشرط الانعكاس فيجب أن تكون كل جذور المعادلة المتتجانسة $0 = \theta(B) \varepsilon_t$ أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة .

3-2- الدالتين ACF و PACF للنموذج :

إن دوال الترابط الذاتي والترابط الذاتي الجزئي للنموذج المختلط ARMA(p,q) تمتد لانهائي وتكون من خليط من التخامدات الأسيّة والتخامدات الجيبية التي تنتمي إلى الصفر كلما زاد التخلف k ، عندما تكون $p >> q$ ، فإن الدالة ACF تتحدد من جزء الإنحدار الذاتي للنموذج ، وعندما تكون $q >> p$ فإن الدالة PACF تتحدد من جزء المتوسط المتحرك للنموذج .

4- النماذج الغير ساكنة:

لقد ناقشنا حتى الآن نماذج ARMA, MA, AR، والتي يمكن استخدامها لبناء نموذج للعديد من السلاسل الزمنية الساكنة. ومع ذلك، كثيراً ما نواجه في الحياة العملية سلاسل زمنية غير ساكنة . إلا أن أغلب هذه السلاسل يمكن تحويلها إلى سلاسل ساكنة باستخدام تحويلات بسيطة، وسوف نناقش في الجزء القادم مجموعة من النماذج التي يمكننا استخدامها لبناء نماذج للعديد من السلاسل الزمنية الغير ساكنة. كما سنناقش في الجزء الذي يليه مجموعة من النماذج التي تتضمن نماذج موسمية، هاته الأخيرة تعدّ أمراً في غاية الأهمية من الناحية التطبيقية لأنّ كثيراً من السلاسل الزمنية هي سلاسل ربع سنوية أو شهرية تكون ذات ملامح سنوية كما سنرى .

4-1- نموذج السير(الانتقال) العشوائي (Random Walk Process) :

رأينا أنه في حالة نموذج AR(1) ، وحتى يكون ساكنًا يجب أن تكون المعلمة $1 < |\phi_1|$ ، وبوضع هذه المعلمة تساوي الواحد أي $1 = \phi_1$ ، وفي هذه الحالة يكتب النموذج كما يلي :

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$^{(1)} y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \dots \dots \quad (20-2)$$

كما يمكن كتابة هذا النموذج كما يلي :

$$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t \dots \dots \quad (21-2)$$

ويُعرف (20-2) باسم نموذج الانتقال العشوائي، حيث تحدث التغييرات في هذا النموذج عن طريق التغير العشوائي ε_t . فإذا كانت هذه الأخيرة تمثل خطوات للأمام أو للخلف في الفترة الزمنية t ، ولا يتأثر قرار اتجاه السير في الفترة التالية بموقع السائر في الفترة الحالية .

٤-٢- دالة الذاكرة :

بالحذف المقتالي للمتغيرات السابقة y_{t-1}, y_{t-2}, \dots من المعادلة (20-2) نجد أن :

$$y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2} + \dots$$

وتبيّن هذه المعادلة الأخيرة أن عملية السير العشوائي هي عملية عشوائية تتراءم فيها التغييرات بمرور الزمن. كما يتضح لنا من نفس المعادلة أن ذاكرة عملية السير العشوائي ثابتة وتأخذ القيمة واحد مهما كانت قيمة الفجوة الزمنية. وهذا يعني أن تأثير التغيير العشوائي في الفترة الزمنية t سيظل باقياً ولن يختفي أبداً ، والجدير بالذكر أن دالة الذاكرة التي لا تختفي هي الملامح العامة لسلسلة غير ساكنة .

٤-٣- نماذج الإنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكمالية (ARIMA(p,d,q))⁽²⁾ :

كما رأينا فإنه يمكننا في الغالب تحويل سلسة زمنية غير ساكنة إلى أخرى ساكنة وذلك باستخدام تحويلة الفروق ، أي أنه يمكن تحقيق السكون عند التعامل مع فروق السلسلة ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام بعضًا من نماذج AR، MA، ARMA التي عرفناها آنفًا وضع نموذج لسلسلة الفروق .

نفترض أن سلسلة الفروق الأولى ساكنة، إذا استخدمنا $w_t = y_t - y_{t-1}$.

ولتعريف الفرق بين مشاهدات y المتتالية، فإنه يمكن وضع w و w_{t-1} في نموذج ARMA(1,1) لنحصل على ما يلي :

$$w_t = \phi_1 w_{t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$

ويُطلق على عملية w التي عبرنا عليها في المعادلتين الأخيرتين إسم عملية الإنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكمالية أو المركبة ARIMA ، وبالتحديد يُشار إلى النموذج الأخير بالرمز ARIMA(1,1,1) ، حيث تُشير الأرقام الموجودة بين القوسين إلى درجة عملية الإنحدار الذاتي، عدد الفروق اللاحقة لتحقيق السكون ، ودرجة عملية الإنحدار الذاتي، كما يمكننا التعبير عن نموذج AR(p) كنموذج ARIMA(p,0,0) ، كذلك يمكن التعبير عن النموذج MA(q) كنموذج ARIMA(0,0,q) . كما يمكننا التعبير عن ARIMA(p,q) كنموذج ARIMA(0,0,q).

⁽¹⁾ أنظر المرجع [م. حشمان-٠٢]، ص. ١١١.


⁽²⁾ هي اختصار لـ : Auto Regressive Integrated Moving Average of Order p, d and q

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

يسمى هذا النوع من النماذج المتاجنة غير المستقرة أو المختلطة المركبة (*Integrated ARMA(p,q)*) من الدرجة d ⁽¹⁾، هذه الأخيرة تختلف عن سابقتها وخاصة في أن السلسلة الزمنية المدروسة غير مستقرة، وإزالة عدم الإستقرار هذا، يجب استعمال طريقة مناسبة لمصدر عدم الإستقرار، فنطبق طريقة الفروقات من الدرجة الأولى إذا كان مصدر عدم الإستقرار هذا هو الإتجاه العام ، وهذا لمرة أو مرتين، بينما نطبق طريقة الفروقات من درجة مناسبة لإزالة الموسمية، بينما يمكن استعمال طريقة بوكس- كوكس في شلها البسيط في إدخال اللوغاريتم على السلسلة الزمنية لإزالة عدم الثبات في التباين ⁽²⁾ ، إلا أنه يفضل استعمال تحويلة الجدر التربيعي لأنها تقوم بتثبيت التباين أكثر من التحويلة اللوغاريتمية⁽³⁾.

٤-٤- النماذج الموسمية⁽⁴⁾ :

إن السلاسل الزمنية الموسمية تعطي أنماط متشابهة تتكرر على فترات زمنية متساوية البعض مثل أن يتكرر النمط كل أربعة وعشرون ساعة، أو كل سبعة أيام أو كل شهر أو ثلاثة أشهر أو سنة، وعند محاولة بناء نموذج لمثل هذا النوع من السلاسل، فإنه من المنطقي دراسة الإرتباط بين مشاهدات نفس الموسم في السنوات المتنالية بالإضافة إلى دراسة الإرتباط بين مشاهدات الموسم المتنالية . والشكل المولى تمثل إحدى هذه السلاسل الموسمية .



المصدر: [ع.م.برهان-٠٢]، ص ١٠٦.

٤-٤-١- نماذج الانحدار الذاتي الموسمية⁽⁵⁾ (SAR(p)) :

إذا كان لدينا مثلاً سلسلة زمنية ربع سنوية ، فإنها تتبع عملية انحدار ذاتي موسمي من الدرجة الأولى إذا أمكن التعبير عن المشاهدة الحالية للسلسلة y_t ، كدالة خطية في مشاهدة السلسلة التي حصلنا عليها في نفس الموسم من السنة السابقة s ، y_{t-s} (هنا تكون $s = 4$) ، بالإضافة على تغير عشوائي ε_t ، أي أن :

$$y_t - \phi_1 y_{t-s} = \varepsilon_t$$

وباستخدام مشغل الإزاحة للخلف يمكن التعبير عن هذا النموذج كالتالي :

⁽¹⁾ حيث تمثل d عدد مرات تطبيق الفروق من الدرجة الأولى للحصول على سلسلة زمنية مستقرة .

⁽²⁾ من المرجع [ع.حشمان-٠٢] ، ص ١٤٤ .

⁽³⁾ أنظر المرجع [ع.ق.عطية-٠٢] ، ص ٦٢٥ .

⁽⁴⁾ من المرجع [أ.فاندل-٩٢] ، ص ٩٣-٩٩ .

⁽⁵⁾ هي اختصار لـ: Seasonal Auto Regressive of order p

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$(1 - \Phi_1 B^s) y_t = \varepsilon_t \quad (22-2)$$

حيث أن المعلمة Φ_1 تمثل معلمة الإنحدار الذاتي الموسمي، ويمكن الإشارة إلى هذا النموذج بالرمز $AR(1)$.
ومع ذلك سنرمز إليه بالرمز $SAR(1)$ ، حيث نستطيع معرفة طول الموسم من المعلومات المتاحة عن السلسلة .
وبنفس الأسلوب الذي استخدمناه للتتوسيع في نماذج AR لكي تتضمن معالم جديدة، يمكننا التوسيع في النموذج (22-2)
الأخير ليتضمن معالم انحدار ذاتي موسمي إضافية، وعموماً يمكن كتابة النموذج $SAR(p)$ الذي يعني نموذج الإنحدار
الذاتي الموسمي من الدرجة p الذي يكتب بالصيغة التالية :

$$\Phi(B) w_t = \varepsilon_t$$

$$\Phi(B^s) = 1 - \Phi_1 B^s - \Phi_2 B^{2s} - \dots - \Phi_p B^{ps}$$

$$w_t = \nabla_s^D y_t$$

حيث أن ∇_s^D تمثل مشغل الفروق الموسمية ، كما يمثل ∇^d مشغل الفروق المتتالية ، وللذان يستخدمان من أجل تسكين
(استقرار) السلسلة الزمنية .

كمأن ACF للدالة الممثلة للنموذج $SAR(p)$ تشبه في خصائصها العامة الدالة ACF الممثلة للنموذج الإنحداري الذاتي
العادى $AR(P)$ فيما عدا ظهور قيم الدالة عند مضاعفات s ، أي عند مضاعفات طول الدورة الموسمية ، فمثلاً إذا كان
النموذج من الدرجة الأولى أي $AR(1)$ ، وطول الدورة الموسمية $s = 4$ ، فإن قيم معاملات الدالة ACF تظهر عند
مضاعفات الرقم 4 ، وتقترب تدريجياً من الصفر ، وأيضاً تحسب معاملات ACF لنموذج $SAR(1)$ من نفس العلاقة التي
استعملت من أجل حساب معاملات ACF للنموذج العادى $AR(1)$ ، فيما عدا ظهور هذه القيم عند مضاعفات طول الدورة
الموسمية (s) ، أي أن :

$$\rho_{sk} = \Phi_1^k, \quad k > 0$$

2-4-2- نماذج المتوسطات المتحركة الموسمية (SMA)(q) :

يُقال عن سلسلة زمنية ساكنة أنها تتبع عملية متوسطات متحركة موسمية من الرتبة الأولى ، إذا أمكننا التعبير عن
المشاهدة الحالية y_t باستخدام التغير العشوائي الحالي ε_t والتغير العشوائي $\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots, \varepsilon_{t-q}$ الذي حدث في نفس الموسم من السنة
الماضية، وهنا فإن (s) تساوي طول الدورة الموسمية، ويمكن كتابة هذا النموذج كما يلي :

$$y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$

كما يمكن كتابته في الصيغة التالية :

$$y_t = (1 + \theta_1 B^s) \varepsilon_t$$

حيث تمثل H معلمة نموذج المتوسطات المتحركة الموسمية . ويرمز لهذا النموذج بالرمز $MA(1)$ ، ولكن عموماً يرمز له
بالرمز كالتالي : $SMA(1)$.

كما يمكننا التوسيع في النموذج السابق وذلك بإضافة معلمات أخرى، وعموماً فإن النموذج من الدرجة Q يمكن التعبير عليه

٤ هي اختصار لـ : Seasonal Moving Average

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

كما يلي : $w_t = \Theta(B^s) \varepsilon_t$

حيث أن : $\Theta(B^s) = 1 - \Theta_1 B^s - \Theta_2 B^{2s} - \dots - \Theta_Q B^{Qs}$

$$w_t = \nabla_s^D y_t$$

وكما في نموذج الإنحدار الذاتي، فإن ∇_s^D يمثل مشغل الفروق الموسمية، كما يمثل ∇^d مشغل الفروق المتتالية، وللذان يستخدمان من أجل تسكين السلسلة الزمنية .

كمأن الدالة ACF المثلة للنموذج SMA(Q) تشبه في خصائصها العامة الدالة ACF المثلة لنموذج المتوسطات المتحركة العادي AR(P) فيما عدا ظهور قيم الدالة عند مضاعفات S ، أي عند مضاعفات طول الدورة الموسمية، فإذا كان لدينا النموذج من الدرجة الأولى أي MA(1) ، توجد قيمة واحدة فقط غير صفرية تظهر عند فجوة زمنية تساوي طول الدورة الموسمية، وبالتالي فإن معامل الارتباط الذاتي يكون كما يلي :

$$\rho_s = \Theta_1 / (1 + \Theta_1^2)$$

أما : $\rho_{sk} = 0$ ، $\forall k \geq 2$

وفي نماذج المتوسطات المتحركة الموسمية من رتبة أعلى، فإن عدد معاملات الارتباط الذاتي الغير صفرية مع رتبة العملية ، وتظهر هذه المعاملات عند مضاعفات S .

٤-٣-٤- النماذج الموسمية المختلطة :

يمكننا دمج نماذج الإنحدار الذاتي الموسمية مع نماذج المتوسطات المتحركة الموسمية في مجموعة واحدة كما يلي :

$$\Phi(B^s) y_t = \Theta(B^s) \varepsilon_t$$

حيث أن :

$$\Phi(B^s) = 1 - \Phi_1 B^s - \Phi_2 B^{2s} - \dots - \Phi_p B^{ps}$$

$$\Theta(B^s) = 1 - \Theta_1 B^s - \Theta_2 B^{2s} - \dots - \Theta_Q B^{Qs}$$

$$w_t = \nabla_s^D y_t$$

ويتمثل ∇_s^D مشغلي الإزاحة المستخدمان في تسكين السلسلة الزمنية ، y_t .

ووجه الاختلاف الوحيد بين معاملات الارتباط الذاتي للنماذج المختلطة الموسمية هاته والنماذج المختلطة العادية هو ظهور معاملات الارتباط الذاتي في النماذج الموسمية عند فجوات زمنية متساوية لمضاعفات طول الدورة الموسمية . وباستخدام نفس رموز نماذج الإنحدار الذاتي والمعظمات المتحركة التكمالية يمكن الإشارة إلى النماذج الموسمية المختلطة⁽²⁾ العامة، وذلك

باستخدام الرمز : ARIMA(P,D,Q)_s حيث أن :

P : رتبة عملية الإنحدار الذاتي الموسمية ،

⁽¹⁾ هي اختصار لـ : Seasonal Auto Regressive Moving Average

⁽²⁾ هي اختصار لـ : Auto Regressive Integrated Moving Average

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

D : عدد الفروق الموسمية ،

Q : رتبة عملية المسطات المتحركة الموسمية ،

S : طول الدورة الموسمية .

4-4-4 النماذج الموسمية المركبة المضاعفة_s : SARIMA(p,d,q)×(P,D,Q)_s

يكون هذا النموذج من الشكل التالي :

$\phi_p(B)\Phi_p(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D y_t = \delta\delta + \theta_q(B)\Theta_q(B^s)\varepsilon_t, \varepsilon_t \sim WN(0\sigma^2)$
 حيث : (B) و (B^s) هما عاملان الإنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك غير الموسمية والتي مرت علينا سابقاً ،
 و : $\Phi_p(B^s) = 1 + \Phi_1 B^s + \Phi_2 B^{2s} + \dots + \Phi_p B^{ps}$ عامل الإنحدار الذاتي الموسمى ،
 و : $\Theta_q(B^s) = 1 + \Theta_1 B^s + \Theta_2 B^{2s} + \dots + \Theta_q B^{qs}$ عامل المتوسط المتحرك الموسمى .

ويسمى هذا بالنماذج الموسمية التضاعفي (Multiplicative Seasonal Models)

فيكون لدينا مثلاً النموذج₁₂ SARIMA(0,1,1)(1,1,0) والذي يكتب من الشكل التالي⁽¹⁾ :

$$(1 - \Phi_1 B^s)(1 - B)y_t = (1 - \theta_1 B)\varepsilon_t, \varepsilon_t \sim WN(0\sigma^2)$$

4-4-4-1 - الدالة ACF للنموذج : SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s

فيما يلي تمثيل لبعض دوال الترابط الذاتي لبعض النماذج الموسمية⁽²⁾ :

أ - نموذج SARIMA(0,d,0)(0,D,1)_s

$$\rho_k = \begin{cases} 1 & , k = 0 \\ -\frac{\Theta}{1 + \Theta^2} & , k = s \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

ب - نموذج SARIMA(0,d,0)(1,D,1)_s

$$\rho_k = \begin{cases} 1 & , k = 0 \\ \Phi^{\frac{k}{s}} & , k = s, 2s, \dots \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

وسوف نستعرض بعض الرسومات لدالة الترابط الذاتي للمتسلسلات الزمنية الموسمية لإعطاء فكرة عن أشكالها .


الأشكال التالية لنموذج₁₂ SARIMA(0,d,1)(1,D,0)

أ - في حالة : $\Phi = 0.6, \theta = 0.5$ ، فتكون كما يلي :

⁽¹⁾ في جميع النماذج القادمة سيكون مفهوماً ضمنياً أن: $\varepsilon_t \sim WN(0\sigma^2)$


⁽²⁾ للمزيد من التفصيل حول كيفية اشتقاق هذه الدوال انظر [ع. بري- 02]. إبتداءً من ص 106.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية



الشكل(22-2) : الدالة ACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)12 في حالة : $\Phi = 0.6, \theta = 0.5$

بـ - أما في حالة : $\Phi = 0.6, \theta = -0.5$ ، ف تكون كما يلي :



الشكل(23-2) : الدالة ACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)12 في حالة : $\Phi = 0.6, \theta = -0.5$


4-4-4-4 الدالة PACF للنموذج_s SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)

من الصعوبة اشتقاق وتفسير أنماط دالة الترابط الذاتي الجزئي للنمادج الموسمية التضاعفية ولكنها وبشكل عام فإن أجزاء النموذج الموسمية وغير الموسمية والتي تندمج المتوسط المتحرك تعطي تخامدات أسيّة وتخامدات جيبيّة عند التخلفات الموسمية وغير الموسمية، وفي النمادج التي تحوي انحدار ذاتي فإن الترابطات الذاتية الجزئية تعطي قطعاً (Cut Off).

الأشكال التالية لإعطاء فكرة عن بعض دوال الترابط الذاتي الجزئي لبعض النمادج⁽⁴⁾ :

1 - شكل دالة الترابط الذاتي الجزئي لنموذج : $w_t = (1 - \Theta B^{12}) \varepsilon_t$

1- عندما تكون $\Theta = 0.6$




الشكل(24-2) : الدالة PACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)12 في حالة : $\Theta = 0.6$

⁽⁴⁾ انظر المراجع [ع. بري-02]، ص 147.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

بـ- أما عند : $\Theta = -0.6$ ، فتكون كما يلي :



الشكل(2.5-2) : الدالة PACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)₁₂ في حالة $\Theta = -0.6$

المبحث الثالث : منهجية بوكس - جنكنز في تحليل السلسلة الزمنية

يُقسّم هذا النموذج وفق منهجهية بوكس- جنكنز إلى أربع مراحل وهي^(١) :


- 1- تحديد النموذج "Identification" ،
- 2- تقدير معلمات النموذج "Estimation" ،
- 3- الإختبار "Diagnostic Checking" ،
- 4- التوقع بالقيم المستقبلية "Forecasting" .

وعلى الرغم من أن منهاج عمل العديد من هذه الخطوات كان معروفاً قبيل بوكس- جنكنز أي سنة 1970 ، إلا أنهما أول من وحد هذه الخطوات في الأسلوب المعروف باسمهما .

في مرحلة تحديد النموذج ، يقوم الباحث فيها بالتعرف على النموذج الذي تخضع له السلسلة الزمنية ، وبعد التعرّف تأتي مرحلة تقدير معلمات النموذج بواسطة إحدى الطرق المختلفة ، ثم مرحلة التشخيص وهي اختبار قوّة النموذج التوقعيّة عن طريق فحص بواقيه للتأكد من أنها تشكّل صدمات عشوائية بواسطة أدوات اختبارية معينة ، وفي النهاية يستخدم النموذج في العملية التوقعيّة وهي آخر مرحلة ، والشكل التالي (١١-٢) يوضح لنا المراحل المختلفة من أجل نمذجة السلسلة الزمنية بواسطة نموذج ARIMA .

^(١) من المرجع [C.GOURIEROUS - 9.5] ، ص 181.

الفصل الثاني : طريقة بوكس - جنكنر لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية



شكل (26-2) : مراحل النمذجة بواسطة نماذج ARMA

المصدر: [M.BOUTAHAR-05] ، ص 15.

١ - مرحلة تحديد النموذج :

في هذه المرحلة يتم فيها التعرف على النماذج التي تخضع لها السلسلة الزمنية محل الدراسة ، وهذا من خلال دالتي الإرتباط الذاتي الكلية (ACF) والجزئية (PACF) ، وذلك للتأكد من استقرارية السلسلة الزمنية ، كما تُستخدم الدالتيين معاً للتعرف على نموذج السلسلة .

١-١ - الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية :

من أجل الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية ، فإنه يمكننا الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية كما يلي :

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

١- إما بالنظر إلى معاملات دالة الارتباط الذاتي الكلية (ACF) أو الجزئية (PACF)، والتي تقع داخل مجال الثقة الذي يساوي عند مستوى المعنوية ٥٪: $\left| \frac{\hat{\phi}_{kk}}{\sqrt{T}} \right| \geq \frac{2}{\sqrt{T}}$ والممثل بالخط النقطي قبل الفقرة المقابلة لربع المشاهدات ($\frac{T}{4}$)، فيعتبر كل معامل ارتباط ذاتي في الدالتيين معدوماً إذا وقع ضمن هذا المجال، وبالتالي تكون السلسلة الزمنية مستقرة وتكون غير مستقرة إذا كانت خلاف ذلك.

٢- كذلك يمكننا التأكد من استقرارية السلسلة الزمنية باستخدام اختبار ديكى فولر (Dicky -Fuller Test)، وذلك كما أوضحنا سالفاً^(٤).

١-٢- التعرف على درجة نموذج السلسلة :

نقوم باختيار النموذج الملائم لسلسلة البيانات من بين نماذج ARIMA، أي أننا نختار درجة الفروق المتتالية ودرجة الفروق الموسمية لتحقيق استقرارية السلسلة ، كما نقوم بتحديد درجة كثير الحدود المناظرة لنماذج الإنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة MA العادية والموسمية أي SAR و SMA ، ولتحقيق ذلك نستخدم الدالة ACF و PACF مع الخصائص التي تطرقنا إليها في البحث السابق ، والتي يمكن تلخيصها في الجدول التالي :

جدول(١-٢) : الدالة ACF و PACF للنماذج الغير موسمية :

الدالة PACF	الدالة ACF	النموذج
$\phi_{kk} = 0, k > 1$	تخامد أسي أو أسي متعدد	AR(1) و (1,d,0)
$\phi_{kk} = 0, k > 2$	تخامد أسي أو تخامد جيبي	AR(2) و (2,d,0)
$\phi_{kk} = 0, k > p$	تخامد أسي و/أو تخامد جيبي	AR(p) و (p,d,0)
يسسيطر عليها تخامد أسي	$p_k = 0, k > 1$	MA(1) و (0,d,1)
يسسيطر عليها تخامد أسي أو جيبي	$p_k = 0, k > 2$	MA(2) و (0,d,2)
يسسيطر عليها تخامد أسي و/أو جيبي	$p_k = 0, k > q$	MA(q) و (0,d,q)
تناقض وتخامد أسي من التخلف I من التخلف I	تناقض وتخامد أسي من التخلف I	ARMA(1,1) و (1,d,1)
تناقض بعد التخلف $p - q$ ويسسيطر عليها تخامد أسي و/أو جيبي بعد التخلف p	تناقض بعد التخلف $p - q$ وتخامد أسي و/أو جيبي بعد التخلف $p - q$	ARMA(p,q) و (p,d,q)

المصدر: [ع.بوريه-02].ص 65-66.

وفيما يخص النماذج الموسمية فإن الداليتين ACF و PACF لها تكونان كما يلي :

^(٤) انظر في الصفحة ٧٠ من هذا الفصل .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

جدول (2-2) : الدالة ACF و PACF للنماذج موسمية :

PACF الدالة	ACF الدالة	النموذج
تساوي الصفر بعد التخلف $p + sP$	تقرب من الصفر تدريجيا	SARIMA(p,0,0)×(P,0,0) _s
تقرب من الصفر تدريجيا	تساوي الصفر بعد التخلف $q + sQ$	SARIMA(0,0,q)×(0,0,Q) _s
تقرب من الصفر تدريجيا	تقرب من الصفر تدريجيا	النمذاج المختلط

المصدر : [و.فاندل-92] ، ص 160.

2- مرحلة تقدير معلمات النموذج :

بعد الإنتهاء من مرحلة التعرف على نموذج السلسلة الزمنية، وذلك بتحديد كل من (p, d, q) ، يمكننا الإنقال إلى المرحلة المواتية والمتمثلة في تقدير معلمات النموذج .

2-1- تقدير معلمات نموذج إنحداري ذاتي من الدرجة p : AR(p)

يمكن تقدير معلمات هذا النموذج، وهي : $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ ، وذلك باستعمال إحدى الطرق التالية :

2-1-1- طريقة معادلات يول - ولكر (Youl - Walker) ⁽¹⁾:

تلجاً هذه الطريقة إلى معادلات يول - ولكر من خلال دالة الإرتباط الذاتي لتقدير معلمات نموذج الإرتباط الذاتي، فتكون في حالة النموذج من الدرجة 2 ، أي : AR(2) فنكون لدينا معادلتين يول - ولكر كما يلي :

$$p_1 = \phi_1 + \phi_2 p_1 \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$p_2 = \phi_1 p_1 + \phi_2 \dots \dots \dots \quad (2)$$

فمن العلاقة (1) الأخيرة يمكننا حساب : (3)

$$\phi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} \dots \dots \dots \quad (4)$$

وبالتعويض في (2) نحسب :

$$\phi_1 = \rho_1 \left(1 - \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} \right)$$

وبالتعويض معلمتى دالة الإرتباط الذاتي بالمعلمتين الخاصتين بالعينة نحصل على ما يلي :

⁽¹⁾ من المرجع [م. حشمان-92] ، ص 151.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\hat{\phi}_1 = r_1 \left(1 - \frac{r_2 - r_1^2}{1 - r_1^2} \right)$$

$$= r_1 \left(\frac{1 - r_1^2}{1 - r_1^2} \right)$$

$$\hat{\phi}_2 = \frac{r_2 - r_1^2}{1 - r_1^2}$$

ومنه نجد أن قيمة $\hat{\phi}_2$ تساوي :

وفي حالة النموذج من الدرجة الثالثة أي من الشكل: AR(3) ، فإنه وباستعمال دالة الإرتباط الذاتي ، فتكون معادلات

بول- ولكن الخاصة بالنماذج كما يلي :
 $p_j = \phi_1 p_{j-1} + \phi_2 p_{j-2} + \phi_3 p_{j-3}$
 وباستعمال المصفوفات نتحصل على ما يلي :

$$\begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \rho_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \phi_1 & \phi_2 \\ \phi_1 & 1 & \phi_1 \\ \phi_2 & \phi_1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{bmatrix}$$

وبتعويض معاملات الإرتباط الذاتي للمجتمع بمعاملات الإرتباط الذاتي للعينة ، نتحصل على شعاع المعالم المقدر وفق

العلاقة التالية :

$$\begin{bmatrix} \hat{\phi}_1 \\ \hat{\phi}_2 \\ \hat{\phi}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & r_1 & r_2 \\ r_1 & 1 & r_1 \\ r_2 & r_1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \times \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$$

٢-١-٢- الطريقة الإنحدارية^(٤) :

لتوضيح هذه الطريقة نفترض نموذجاً من الدرجة الثانية أي AR(2) ، وبسبب مشكل قيم الإنطلاق، نبدأ عملية التقدير من

الفترة (3) $y_t = \delta + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \epsilon_t$ كما يلي :

و بالتعويض نجد :

$$y_3 = \delta + \phi_1 y_2 + \phi_2 y_1 + \epsilon_3$$

$$y_4 = \delta + \phi_1 y_3 + \phi_2 y_2 + \epsilon_4$$

...

$$y_T = \delta + \phi_1 y_{T-1} + \phi_2 y_{T-2} + \epsilon_T$$

وبكتابتها في شكل مصفوفات نحصل على ما يلي :

^(٤) من المرجع [م. حشمان- ٠٢] . ص ١٥٣

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\begin{aligned}
 Y &= \begin{bmatrix} y_3 \\ y_4 \\ \vdots \\ y_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & y_2 & y_1 \\ 1 & y_3 & y_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & y_{T-1} & y_{T-2} \end{bmatrix} X \times \begin{bmatrix} \delta \\ \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \vdots \\ \varepsilon_T \end{bmatrix} \\
 &\quad [(T-P).1] \qquad \qquad \qquad [(T-P).3] \quad [3.1] \quad [(T-P).1] \\
 &\qquad \qquad \hat{\Phi} = (X'X)^{-1} X'Y
 \end{aligned}$$

ومنه فإن :

2-2- طرق تقدير نماذج المتوسطات المتحركة و المختلطة :

تعتبر نماذج ARMA(p,q) و MA(q) أعقد بكثير من حيث التقدير من النماذج الإنحدارية السالفة الذكر، كونها غير خطية المعالم من جهة ، وعدم مشاهدة متغير الأخطاء من جهة أخرى ، فهدف التقدير من جهة هنا هو تحديد معالم القسم الإنحداري ، و قسم المتوسطات المتحركة ARMA(p,q) معاً ، أو معلمات قسم المتوسطات المتحركة لوحدها في نموذج

MA(q) ، ففي حالة النموذج المختلط العام التالي :

$$y_t - \phi_1 y_{t-1} - \phi_2 y_{t-2} - \dots - \phi_p y_{t-p} = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

أي : $\Phi(L)y_t = \Theta(L)\varepsilon_t$

حيث أن :

$$\begin{aligned}
 \Phi(L) &= 1 - \phi_1 L^1 - \phi_2 L^2 - \dots - \phi_p L^p \\
 \Theta(L) &= 1 + \theta_1 L^1 + \theta_2 L^2 + \dots + \theta_q L^q
 \end{aligned}$$

بافتراض إمكانية قلب المعامل $\Phi\Theta(L)$ فإن :

$$\varepsilon_t = \Theta^{-1}(L)\Phi(L)$$

2-2-1- طريقة أعظم احتمال (المعقولية العظمى) :

تكون دالة المعقولية العظمى الخاصة للنموذج المستقر AR(1) من الشكل التالي :

$$y_t = w + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim NID(0, \sigma^2) \quad (3)$$

أما بالنسبة للتوزيع المتصل للمتغير Y_t الذي يساوي (y_1, \dots, y_T) ، الذي يتبع التوزيع المستقر كما يلي :

$$Y_T \sim N(\mu, \Sigma)$$

$$\begin{bmatrix} y_t \\ \vdots \\ y_T \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} \mu \\ \vdots \\ \mu \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \gamma_0 & \cdots & \gamma_{T-1} \\ \ddots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{T-1} & \cdots & \gamma_0 \end{bmatrix}\right)$$

⁽¹⁾ تقوم فكرة التقدير وفقاً لطريقة المعقولية العظمى (MLE) من الحقيقة القائلة بأن كل مجتمع يفرز عينات خاصة به ، كمأن احتمال انتقاء العينة إلى المجتمع الذي سحب منه يكون أكبر من احتمال انتقاء هذه العينة إلى أي مجتمع آخر ، وعليه فإن الفكرة هي تدبير المجتمع من خلال قيم مشاهدات العينة المسحوبة ، وذلك عن طريق احتساب احتمال العينة على مختلف المجتمعات ومن ثم تشخيص المجتمع الذي تنتهي إليه في ضوء أكبر احتمال متحقق من بين مختلف هذه الإحتمالات .

⁽²⁾ من المرجع [G.CHEVILLON-04] ، ص 50.

NID : Normale et Indépendamment Distribuée de moyenne 0 et de variance σ^2 ⁽³⁾

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكشن لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\mu = (1 - \alpha\sigma^2)^{-1}w, \quad \gamma_k = \alpha k \sigma_y^2, \quad \text{و كذلك } \sigma_y^2 = (1 - \alpha\sigma^2)^{-1}\sigma^2.$$

ولذلك فإن الصيغة الرياضية لدالة الكثافة الإحتمالية للمشاهدة $(y_1, \dots, y_T) = Y_T$ تعطى كما يلي :

$$f(Y_T) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^T \exp \left(-\frac{1}{2} (Y_T - \mu)^T \Sigma^{-1} (Y_T - \mu) \right)$$

ولأن الأخطاء (ε_t) مستقلة الواحدة عن الأخرى ، فإن الإحتمال المشترك يساوي حاصل ضرب الإحتمالات المفردة كما يلي :

$$f(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_T) = \prod_{t=2}^T f_{\varepsilon}(y_t)$$

$$\varepsilon_t = y_t - (w + \alpha_1 y_{t-1}) \quad \text{وبمأن :}$$

فإذن يكون لدينا ما يلي : $f(Y_t | Y_{t-1}) = f_{\varepsilon}(y_t - (w + \alpha_1 y_{t-1}))$ ، من أجل كل $t = 2, \dots, T$ وهكذا :

$$f(y_1, \dots, y_T) = f_{\varepsilon}(y_T | y_{T-1}, \dots, y_1) f(y_{T-1}, \dots, y_1) \\ = \left[\prod_{t=2}^T f(y_t | y_{t-1}) \right] f(y_1)$$

ومن أجل $\varepsilon_t \sim NID(0, \sigma^2)$ ، فإن دالة المقولية العظمى تعطى بالشكل التالي :

$$L(\lambda) = f_{\varepsilon}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_T; \lambda) \\ = \left[\prod_{t=2}^T f(y_t | y_{t-1}; \lambda) \right] f(y_1; \lambda)$$

أين يكون λ هو عبارة عن المعلمة المقدرة ، فإذاً يكون لدينا الآتي :

$$L(\lambda) = \left[\prod_{t=2}^T \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} (y_t - (w + \alpha_1 y_{t-1}))^2 \right] \right] \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} (y_1 - \mu)^2 \right] \\ = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^T \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} (y_t - (w + \alpha_1 y_{t-1}))^2 - \frac{1}{2\sigma^2} (y_1 - \mu)^2 \right]$$

وكذلك :

$$L(\lambda) = \log L(\lambda) = -\frac{T}{2} \log(2\pi) - \left(\frac{T-1}{2} \log(\sigma^2) + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=2}^T \varepsilon_t^2 \right) \\ - \left(\frac{1}{2} \log(\sigma_y^2) + \frac{1}{2\sigma_y^2} (y_1 - \mu)^2 \right)$$

أين y_1 تتبع توزيعاً طبيعياً وسط يساوي μ ، وتباين ثابت ويساوي σ^2 أي :

وبصفة عامة ، فإننا نستعمل دالة المقولية العظمى المشروطة التالية $\left[\prod_{t=2}^T f_{\varepsilon}(\varepsilon_t; \lambda) \right]$ مشروطة بالمشاهدة الأولى)

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

أما في حالة النموذج ARMA(p,q) ، فيكون لدينا :

$$\epsilon_t = y_t - [\nu + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \beta_1 \epsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q \epsilon_{t-q}]$$

وسوف يتم استعمال الطريقة الغير خطية العظمى .

يتم التقدير وفقاً لهذه الطريقة يتوقف أساساً على تحقق التوزيع الطبيعي ، حيث يتم اختيار مقدرات لشعاعي المعالم الخاصة بالقسمين الإنحداري ، أو المتosteات المتحركة ($\Phi = (\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p)$ ، و $\Theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q)$) على الترتيب ، وتعتمد مبدأ تصغير أو تدنية مجموع مربعات الباقي كما يلى :

$$\text{Min } RSS = \text{Min } S(\hat{\phi}, \hat{\theta}) = \sum e_t^2$$

حيث أن : $e_t = \hat{\Theta}^{-1}(L) \hat{\Phi}(L)$

نشير إلى أن الطريقة تحتاج إلى قيم ابتدائية خاصة بالمتغير y_t مثل y_0 و y_{-1} ، حيث أن دالة العقولية العظمى في هذه الحالة تكون شرطية لهذا السبب ، ويمكن فهم هذه الظاهرة بسهولة عند تعويض t بـ $(1, 2, \dots, p)$ في دالة العقولية العظمى أو في علاقة الباقي المذكورة آنفاً .

٢-٢-٢- طريقة البحث التشابكي (Gried—Search) ^(١)

من أجل توضيح هذه الطريقة ، ندرج المثال المختلط من الدرجة الأولى ARMA(1,1) كالتالى :

$$y_t - \phi y_{t-1} = \epsilon_t + \theta \epsilon_{t-1}$$

إذا :

$$(1 - \phi L) y_t = \epsilon_t + \theta \epsilon_{t-1}$$

ومنه :

$$y_t = \frac{1}{(1 - \phi L)} (\epsilon_t + \theta \epsilon_{t-1}) \dots \oplus$$

فإذا سميّنا المدار v_t بـ $v_t = \frac{1}{(1 - \phi L)}$ ، فيكون :

$$v_t = \frac{1}{(1 - \phi L)} \epsilon_t$$

وبعملية بسيطة ، فإن :

$$v_t = \phi v_{t-1} + \epsilon_t \dots \oplus$$

نلاحظ من العلاقة الأخيرة هذه ، أنه لو توفرت قيم الإشعاع v_t ، فإننا نستطيع تدبير المعلمة (ϕ) بطريقة المربعات الصغرى العاديّة (OLS) ، ولكن وبسبب عدم مشاهدتها يتم اللجوء العمليّة التالية ، حيث يتم الرجوع إلى العلاقة \oplus ، ونعيد كتابتها في الشكل الموسّع المالي :

^(١) من المرجع [م. حشمان-٠٢] ، ص ص ١٥٦-١٥٩ .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$y_t = \frac{1}{(1-\phi L)} \varepsilon_t + \frac{1}{(1-\phi L)} \theta \varepsilon_{t-1}$$

ومنه نجد : $y_t = v_t + \theta v_{t-1}$

ومن هذه العلاقة الأخيرة، وبتعويض (θ) بقيمها، والتي تقع ضمن المجال $1 < |\theta|$ ، من أجل شرط إمكانية قلب النموذج ،

وبتوفير القيم البدائية $v_0 = 0$ ، نحصل على ما يلي :

$$v_t = y_t - \theta v_{t-1}$$

إذن تبدأ العملية بالتكرار الأول ، ونسميه $v^{(1)}$ ، وكما يلي :

$$t=1: v_1^{(1)} = y_1$$

$$t=2: v_2^{(1)} = y_2 - \theta^{(1)} v_1^{(1)}$$

$$t=3: v_3^{(1)} = y_3 - \theta^{(1)} v_2^{(1)}$$

\vdots

$$t=T: v_T^{(1)} = y_T - \theta^{(1)} v_{T-1}^{(1)}$$

حيث :

$$v^{(1)} = \begin{bmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \\ \vdots \\ v_T^{(1)} \end{bmatrix}$$

وبتعويض هذا الشاع الناتج في المعادلة (٢٤)، يمكننا من تقدير المعلمة θ ، وذلك باستعمال طريقة (OLS) كما يلي :

$$\hat{\theta}^{(1)} = \frac{\sum_{t=1}^T v_t^{(1)} v_{t-1}^{(1)}}{\sum_{t=1}^T (v_{t-1}^{(1)})^2}$$

ثم يتم حساب مجموع مربعات الباقي المقابلة للمعلمتين $(\hat{\theta}_1^{(1)}, \hat{\theta}_2^{(1)})$ ، ومن العلاقة (٢٤) كالتالي :

$$RSS^{(1)} = \sum_{t=1}^T e_t^2 = \sum_{t=1}^T (v_t^{(1)} - \hat{\theta}^{(1)} v_{t-1}^{(1)})^2$$

ويسمى مجموع المربعات الموفق للتكرار الأول بالرمز $RSS^{(1)}$.

ونعيد العملية للمرة الثانية (التكرار الثاني)، حيث وفقاً للمراحل السابقة، والتي نختصرها فيما يلي :

« حساب الشاع $v^{(2)}$ ، وذلك باستعمال قيمة معينة لـ (θ) »

« تقدير المعلمة $\hat{\theta}^{(2)}$ كما يلي :

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\hat{\phi}^{(2)} = \frac{\sum_{t=1}^T v_t^{(2)} v_{t-1}^{(2)}}{\sum_{t=1}^T (v_{t-1}^{(2)})^2}$$

﴿ حساب مجموع مربعات الباقي $RSS^{(2)}$ ، كما يلي :

$$RSS^{(2)} = \sum_{t=1}^T e_t^2 = \sum_{t=1}^T (v_t^{(2)} - \hat{\phi}^{(2)} v_{t-1}^{(2)})^2$$

ونعيد العملية هذه (التكرار) ، وذلك حتى يتم تغطية كامل مجال التعويض لـ (θ) ، وحتى نتحصل على المعلمتين $(\hat{\phi}^{(i)}, \hat{\theta}^{(i)})$ اللتين تدنيان مجموع مربعات الباقي $RSS^{(i)}$ الموافق للتكرار (i) .
نشير في الأخير أن الطريقة تصبح غير مرغوب فيها وذلك لما يتتجاوز عدد معالم قسم المتosteات المتحركة الرتبة الثانية ، أي: $MA(q) > 2$ ، وذلك لصعوبة العمليات الحسابية، وعدم اتساق المعالم في هذه الحالة .

٣ - مرحلة إختبار النموذج :

بعيداً عن الإنتهاء من مرحلتي تحديد، وتقدير النموذج، تأتي مرحلة إختبار قوة النموذج الإحصائية ثم التوقعية في مرحلة لاحقة، وهذه المرحلة تتطلب الإختبارات التالية :

٣ - ١ - تحليل بوافي النموذج :

بعد التعرف على نموذج مبدئي وتقدير معالم هذا النموذج نجري بعض التخسيصات على الباقي ، أو أخطاء التطبيق لنرى مدى مطابقة النموذج للمتسلسلة المشاهدة، ويفترض أن الباقي هي مقدرات لمتسلسلة الضجة البيضاء (التشوش الأبيض)
، والتي نفترض أنها موزعة طبيعياً بمتوسط صفر و تباين σ^2 حيث أنها معرفة بالعلاقة التالية :

$$\epsilon_t = \hat{\phi}(B)\hat{\theta}(B)^{-1} y_t$$

و يقوم التشخيص على فحص الباقي والنظر في مدى تحقيقها لفرضيات النموذج والتي هي:
متوسط صفر ، العشوائية ، عدم الترابط ، موزعة توزيع طبيعي (مستقل ومتناطبق بمتوسط صفر و تباين σ^2)
أي: $\epsilon_t \sim IIDN(0, \sigma^2)$ ، وذلك بعدة طرق ذكر منها :

- إختبار حسن التطابق (Goodness of Fit Test) ونستخدم الإختبار الامثلية كولوجوروف- سميرنوف . (Kolmogorov-Smirnov Test)

• مخطط الإحتمال الطبيعي (Normal Probability Plot) .

• مخطط الرباعيات- الرباعيات (Q-Q Plot) .

كما نقوم باختبار مدى صلاحية النموذج عن طريق جملة من الإختبارات التالية :

^(٤) انظر الدراسة التطبيقية .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

أ- عن طريق الحصول على معامل الارتباط الذاتي ومعامل الارتباط الجزئي وشكل الارتباط الذاتي لهذه الباقي ، فإذا اتضح أن هذه الباقي داخل مجال المعنوية المعيّر عنه بيانياً بخطين متوازيين، أو رياضياً بـ : $\frac{2}{\sqrt{T}} \leq |r_k| \leq 1$ ، بما يعني أن الارتباط الذاتي بين الباقي غير معنوي إحصائياً ، وبالتالي يكون النموذج ملائماً^(١).

ب- اختبار التشويش الأبيض :

إن الهدف من هذا الإختبار هو التأكيد من أن الباقي النموذج المشكل تحاكي تشويشاً أبيضاً ، أي أنها عبارة عن سلسلة

مستقرة ، والإحصائية المستعملة لهذا الغرض هي الإحصائية Q (Ljung—Box)^(٢) ، والمعروفة بـ :

$$Q = N(N+1) \sum_{i=1}^{k-1} (N-i)^{-1} \hat{\rho}_e^2(i)$$

حيث أن : N تمثل عدد المشاهدات ،

$\hat{\rho}_e^2(i)$ تمثل مربع الارتباط الذاتي بدرجة تأخر (i) للخطأ e .

تتبع إحصائية (Q) توزيع كاي- تربيع (χ^2) بدرجة حرية $(q-p-k)$ ، وبدرجة ثقة $(\alpha = 95\%)$ فإذا كانت :

$Q_{\alpha(cal)} < \chi^2_{(k-p-q)}$ يجب إعادة النظر في تحديد النموذج بإضافة مركبات نظامية (AR, MA) إليه.

$Q_{\alpha(cal)} > \chi^2_{(k-p-q)}$ السلسلة عشوائية ، وهذا دليل على قوة النموذج المختار.

حيث أننا نستعمل إحصائية (Q) ، وذلك بدلاً من إحصائية $(Durbin-Watson)$ لكون هذه الأخيرة تحسب فقط الارتباط الذاتي للأخطاء من الدرجة الأولى ، وقد أدخل عليها تعديل من طرف $(Box-Pierce)$ ^(٣) ، فأصبحت بالشكل :

$$Q = N \sum_{i=1}^k \hat{\rho}_e^2(i) \rightarrow \chi^2_{k-p-q}$$

حيث أن : p_k معطى بالعلاقة التالية :

$$\rho_k = \frac{\sum (e_t \cdot e_{t-k})}{\sum e_t^2}$$

أين e_t ، e_{t-k} ، وكما ذكرنا آنفاً تساوي :

$$e_t = \hat{\Phi}(B) \Theta^{-1}(B) y_t$$

حيث أنه ، وتحت الفرض العددي التالي : $H_0 = \rho(e_1) = \rho_2(e_2) = \dots = \rho_k(e_k) = 0$ ، وبأخذ مستوى

المعنى $\alpha = 10\%$ ، وإذا كان $Q^* \leq \chi^2_{k-p-q}$ ، فإننا نقبل فرض العدم ، بمعنى أن كل معاملات دالة

^(١) انظر المرجع [ع.ق. عطية-٠٢]، ص ٦٤٤.

^(٢) من المرجع [م. حشمان-٠٢]، ص ١٧٠.

^(٣) إن إحصائية $Ljung-Box$ أفضل من اختبار $Box-Pierce$ كونها أقرب إلى قانون كاي تربيع χ^2 من الثانية .

الفصل الثاني : طريقة بوكس - جنكنر لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

الإرتباط الذاتي للبواقي معروفة، ويلاحظ أنه تمأخذ مستوى المعنوية الإحصائية (10%) بدلاً من (5%) لأن هذا الأخير لا يفي بالغرض في أحوال كثيرة .

ج - اختبار جودة المعامل :

لهذا الغرض نستخدم الإحصائية (t) لـ (*Student*) ، وبافتراض أن المقدرات تقبل توزيعاً طبيعياً، فإن الإحصائية تؤكد أو تنفي جودة المقدر ومدى مساهمته في تفسير النموذج باحتمال قيمته ($\beta = 5\%$) ، حيث وبالنسبة

$$t_c = \frac{|\hat{\Phi}_p|}{\sqrt{VAR(\hat{\Phi}_p)}} \rightarrow N(0,1) : AR(p)$$

$$t_c = \frac{|\hat{\Theta}_q|}{\sqrt{VAR(\hat{\Theta}_q)}} \rightarrow N(0,1) : MA(q)$$

فإذا كانت ($t_c > 1.96$) ، فإننا نقبل المعلمة المقدرة ، ويتم رفض الفرض العددي ، والعكس صحيح .

د- اختبار (Jarque - Berra) :

من أجل التأكيد من أجل بواقي النموذج تتشكل صدمات عشوائية ، فإن النموذج الأكثر استعمالاً هو الإختبار الذي يسمى اختبار (Jarque - Berra) .

ومن أجل استعمال هذا الإختبار فإننا نقوم بحساب معاملين هما : معامل الإنلتواء (Skewness) . ومعامل التفرطح (Kurtosis) ، حيث أنه وفي التوزيع الطبيعي فإنه يكون لدينا معامل الإنلتواء ($\alpha_3 = 0$) ، وأما معامل التفرطح (Kurtosis) .

حيث أنه ومن المهم التأكيد أن القانون الطبيعي يتميز بأنه متناهٍ بالنسبة لمتوسطه، وكذلك بالإحتمال الضعيف للنقاط المتطرفة .

نفترض أن σ يمثل الإنحراف المعياري للبواقي ، فإن معامل الإنلتواء (α_3) معرف كما يلي :

$$\alpha_3 = \mu_3 / \sigma^3$$

أما معامل التفرطح يساوي :

$$\alpha_4 = \mu_4 / \sigma^4$$

μ_k تعبّر عن العزوم من الدرجة k ، ومن أجل اختبار فرض التوزيع الطبيعي للسلسلة ، فإن فرض العدم يكون كالتالي^(*) :

$$H_0 : \alpha_3 = 0 \quad \text{and} \quad \alpha_4 = 3$$

وتحت الفرض العددي ، فإن (Jarque - Berra) يقرّحان الإختبار التالي :

$$\tau^* = \left(\frac{T}{6} \hat{\alpha}_3^2 + \frac{T}{24} (\hat{\alpha}_4 - 3)^2 \right) \rightarrow \chi^2$$

^(*) انظر المرجع [Z.BELOGBI-05] ، ص ص 304 - 305 .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

حيث :

$$\hat{\alpha_3} = \frac{\left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{U}_t^3 \right)}{\left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{U}_t^2 \right)^{3/2}}$$

وكذلك :

$$\hat{\alpha_4} = \frac{\left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{U}_t^4 \right)}{\left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{U}_t^2 \right)^2}$$

حيث يتم رفض فرض العدم H_0 عند مستوى معنوية $\alpha = 5\%$ ، إذا كانت π المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية للتوزيع كاي - تربيع (χ^2) عند درجة الحرية ($DF = 2$).

3-2- المقارنة بين النماذج :

عند الحصول على عدة نماذج قياسية للظاهرة المدروسة ، يتم اختيار النموذج المناسب للواقع على أساس اختبار صحة التمثيل بالإعتماد على المعايير التالية^(٤) :

- ١ - أن يكون تباين النموذج ذو قيمة ضعيفة ،
- ٢ - أن يكون مجموع مربع الباقي ضئيلاً ،
- ٣ - أن يكون الفارق بين كثافة النموذج وبين الكثافة الحقيقية للمشاهدات ضئيلة ، أي بعبارة أخرى تدنية تباين النموذج مقارنة بزيادة عدد المعالم المقدرة ، هذا المعيار هو معيار (AIC)^(٢)، والمعرف رياضيا كما يلي :

$$^{(3)} AIC = \hat{\sigma}_{\epsilon}^2 \cdot \exp \left\{ 2 \left(\frac{p+q}{N} \right) \right\}$$

حيث: $\hat{\sigma}_{\epsilon}^2$ هو عبارة عن تباين النموذج محسوبا طريقة العقولية العظمى (MLE) ، أي بقسمة مجموع مربعات الباقي على عدد المشاهدات فقط ، كمأن المدار ($p+q$) يشير إلى عدد معالم النموذج المقدر وليس مجموع درجتي النموذج . كما يمكن كتابة هذا المعيار في شكله اللوغاريتمي كما يلي :

$$AIC = \log \hat{\sigma}_{\epsilon}^2 + \left\{ 2 \left(\frac{p+q}{N} \right) \right\}$$

في الحالة التي يكون فيها عدد المشاهدات غير متساو، يجب قسمة AIC على عدد المشاهدات N ، أي:

⁽⁴⁾ تسمى هذه المعايير باختبارات المفاضلة .

⁽²⁾ من المرجع [C.W.J.GRANGER-86]، ص 82.

⁽³⁾ Akaike Information Criterion هي اختصار لـ :

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\textcircled{1} \quad NAIC = \frac{AIC}{N}$$

تتم المفضلة على أساس أصغر قيمة للمعيار ، أي نفضل النموذج الذي يحقق أصغر AIC أو $NAIC$. ورغبة في تحقيق خصائص تقاريبية ولأسباب مهمة أخرى اقترح (SHWARS) التعديل التالي :

$$BIC = \log \hat{\sigma}_{\epsilon}^2 + \frac{(p+q)}{N} \log N$$

ونشير إلى عدم استخدام معامل التحديد (R^2) من أجل المفضلة بين النماذج الناتجة ، ذلك أن معامل التحديد (R^2) في نماذج السلسلة الزمنية مرتبط بالمعاملات θ_i ولا يعتمد على σ_{ϵ}^2 وهذه نقطة هامة يجب أخذها في الاعتبار عند محاولة تفسير (R^2) في تفسير السلسلة الزمنية ، وقد أثبت NELSON (1976)، أن : $R^2 = \frac{\theta_1^2}{1-\theta_1^2}$ في نموذج AR(1)، وهذا يعني أنه إذا كان $\theta_1 = 0.5$ ، فإننا نتوقع لا يزيد (R^2) عن 0.25 ، وبالنسبة لنموذج MA(1) فلقد أثبت أن $R^2 = \frac{\theta_1^2}{1-\theta_1^2}$ ، وبالتالي فإننا نتوقع لا يزيد (R^2) عن 0.5⁽²⁾.

المبحث الرابع : التوقع وقياس دقتة

عند الإقتناع بأن النموذج المقترن مناسب ، وأننا وفقنا لاختيار النموذج الملائم باستعمال الوسائل الإختبارية السالفة الذكر ، يمكننا آنذاك استخدامه للتوقع بمشاهدات السلسلة في المستقبل ، ولكن سوف نبدأ بشرح بعض الرموز المستخدمة في بناء عملية التوقع .

١- التوقع (Forecast)

نفترض أن n تشير إلى الفترة الزمنية الحالية التي يتم عندها حساب التوقعات ، وأننا نريد أن نتوقع بقيمة المشاهدة التي ستحدث بعد h من الفترات الزمنية ، أي أننا نريد أن نتوقع بقيمة المشاهدة y_{n+h} التي لم تحدث بعد ، حيث تسمى y_n في هذه الحالة بأفق التوقع (Forecast horizon) ، أيضاً تشير (h) إلى القيمة التوقعية التي نحصل عليها في الفترة $n+h$ للمشاهدة y_n التي ستحدث بعد h من الفترات الزمنية ، فمثلاً إذا كانت $h = 1$ ، فإن (1) y_n تشير إلى القيمة التوقعية التي نحصل عليها في الفترة $n+1$ للمشاهدة y_n التي ستحدث بعد فترة زمنية واحدة ، وإذا كانت $h = 2$ ، فإن (2) y_n تشير إلى القيمة التوقعية التي نحصل عليها في الفترة $n+2$ للمشاهدة y_n التي ستحدث بعد فترتين من الزمن ، حيث أن المتغير الذي نريد التوقع بقيمتته ، هو y_{n+h} ، وهو متغير عشوائي فمن الممكن وصفه وصفاً كاملاً عن طريق توزيعه التوقيعي ، وهو توزيع احتمالي يعتمد على المشاهدة الحالية و المشاهدات السابقة بالإضافة إلى اعتماده على نموذج ARIMA المحدد ، وسوف نستخدم التوقع بنقطة (point forecast) ، ونبين كيفية إنشاء فترة توقع (forecast interval) حول هذه النقطة .

⁽¹⁾ هي اختصار لـ : Normalised Akaike Information Criterion

⁽²⁾ من المرجع [و.فاندل-92] ، ص ص 185-186.

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

١-١- التوقع بنقطة (Point Forecast)

يمكن تلخيص عملية التوقع في المراحل التالية :

١- كتابة النموذج المقدر كما يلي :

$$\hat{y}_t = f(\hat{\theta}, \theta, y, e)$$

ب- تعويض قيمة t بـ $1, 2, \dots, T$ ، حيث :

ج- تعويض كل القيم المستقبلية للمتغير الخاص بالظاهرة المدروسة بتوقعاتها ، بينما يتم تعويض الأخطاء المستقبلية بالأصفار ، والماضية (داخل العينة) بالبواقي ، ولتوضيح ذلك نبرز الأمثلة التالية :

« نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الأولى (MA(1)) كما يلي :

$$y_t = \mu + \theta e_{t-1} + \varepsilon_t$$

وبعد التقدير وتعويض الأخطاء الماضية بالبواقي ، يصبح النموذج كما يلي :

$$\hat{y}_t = \hat{\mu} + \theta e_{t-1}$$

فيكون التوقع لفترة كما يلي :

$$y_{T+1} = \hat{\mu} + \theta e_T$$

ولفترتين ، وبعد تعويض البواقي المستقبلية بالصفر :

$$y_{T+2} = \hat{\mu} + \theta e_{T+1} = \hat{\mu}$$

ومن ثم يكون التوقع ثابتا بعيد الدرجة الأولى ، وهو مساو لـ $\hat{\mu}$

« أما فيما يخص النموذج من الدرجة الثانية (MA(2)) :

$$y_t = \mu + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2} + \varepsilon_t$$

وبالتشابه يكون :

$$\hat{y}_t = \hat{\mu} + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2}$$

فيكون التوقع لفترة واحدة كما يلي :

$$\hat{y}_{T+1} = \hat{\mu} + \theta_1 e_T + \theta_2 e_{T-1}$$

ولفترتين :

$$\hat{y}_{T+2} = \hat{\mu} + \theta_2 e_T$$

ولثلاث فترات :

$$\hat{y}_{T+3} = \hat{\mu}$$

ومنه ، فإن التوقع يكون ثابتا بعيد الدرجة الثانية ، ويكون مساويا لـ $\hat{\mu}$ كذلك ، وبصفة عامة يكون لدينا التوقع الخاص

بنموذج المتوسطات المتحركة (MA(q)) :

الفصل الثاني : طريقة بوكس - جنكنتر لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$^{(1)}\hat{y}_{T+L} \neq \hat{\mu} \quad , \quad \forall L > q$$

• أما فيما يخص نموذج الإنحدار الذاتي AR(p) ، وإذا أخذنا كمثال النموذج من الدرجة الأولى (1)، حيث يكتب

كمارأينا آنفاً منالشكل : $y_t = \delta + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$

والنموذج المقدر هو :

ومن ثم ، يكون التوقع لفترة واحدة معطى بـ :

$$\hat{y}_{T+1} = \hat{\delta} + \hat{\phi}_1 y_T$$

ولفترتين ، حيث يتم تعويضها المستقبلية بالتوقع المناسب ، وكما يلي :

$$\hat{y}_{T+2} = \hat{\phi} + \hat{\phi}_1 y_{T+1}$$

$$\hat{y}_{T+I} = \hat{\delta} + \hat{\phi}_1 y_{T+I-1}$$

ويكون التوقع بعيد الفترة p ليس له علاقة سوية بتوقع الفترة السابقة ، لذا ومن الأفضل الاستعانة بهذه النماذج لأغراض

.(short terme forecasting (التوقع القصير الأجل

• أما فيما يخص النماذج المختلطة المركبة من الدرجة الأولى من الشكل ARIMA(1,1,1)

تعتبر السلسلة الأصلية من هذا النوع من النماذج غير مستقرة، وتم إزالة هذه الظاهرة عن طريق الفروقات من الدرجة الأولى

لمرة واحدة أي ($d = 1$) ، ونكون بذلك قد أبعدنا مركبة الاتجاه العام منها ، ونسعى السلسلة الناتجة والتي قد تكون

حالية من المركبة المذكورة w ، كما يلى :

$$w_t = y_t - y_{t-1}$$

ويعتبر النموذج التالي، ذلك المقدر الذي تم تحديده عبر مختلف المراحل

$$\hat{w}_t = \hat{\delta} + \hat{\phi} w_{t-1} + \hat{\theta} e_{t-1}$$

و عند القيم بالتوقع للفترة $(T + 1)$ يكون لذينا :

$$\hat{w}_{T+1} = \hat{\delta} + \hat{\omega} w_T + \hat{\theta} e_T$$

والتوقع لفترة اضافية ($T + 2$) بـ :

$$\hat{w}_{T+2} = \hat{\delta} + \hat{\phi} w_{T+1} + \hat{\theta} e_{T+1}$$

$$= \hat{\mathcal{O}} + \hat{\phi} w_{T+1}$$

حيث $e_{T+1} = 0$:

⁽¹⁾ مِن الْحَجَّ [وَحِشْانٍ-٩٢]، ص ١٧٩

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

إلا أننا في العملية التوقعية لا نحتاج إلى توقع السلسلة الخالية من المركبة المتزوعة بقدر ما نحتاج إلى التوقع الكلي النهائي لذا نعرض $t+1$ ثم $T+2$ في معادلة الفروقات من الدرجة الأولى المذكورة أعلاه، وبهذا تكون قد أعدنا مركبة الإتجاه العام إلى السلسلة الزمنية، وكما يلي :

$$\hat{w}_{T+1} = \hat{y}_{T+1} - y_T$$

ومن ثم نجد أن :

$$\hat{y}_{T+1} = \hat{w}_{T+1} + y_T$$

: (T+2) وللفترات

$$\hat{y}_{T+2} = \hat{w}_{T+2} + y_{T+1}$$

: وبصفة عامة :

$$\hat{y}_{T+L} = \hat{w}_{T+L} + y_{T+L-1}$$

ومن العلاقة الأخيرة ، نكرر ملاحظة أن الرغبة في استعمال هذا النوع من النماذج تزيد في حالة التوقع القصير الأجل .

٢- التوقع بمجال (Forecast Interval)

بالإضافة إلى الحصول على نقطة توقع مثالية ، فقد نرغب في كثير من الحالات في قياس الالتأكد حول هذه النقطة ، لهذا نقوم بإيجاد الخطأ المعياري لخطأ التوقع ثم نقوم بإنشاء فترات التوقع .

ومن أجل حساب الأخطاء المعيارية لأخطاء التوقع نقوم أولاً بالتعبير عن عملية ARIMA بدلالة التغيرات العشوائية ، وبالتالي عن المشاهدات y_1, y_2, \dots ، يمكننا كتابة النموذج بدلالة التغيرات العشوائية الحالية والسابقة فقط كما يلي :

$$y_t = \varepsilon_t + \psi_1 \varepsilon_{t-1} + \psi_2 \varepsilon_{t-2} + \dots$$

حيث أن ψ_1, ψ_2, \dots تسمى بمعاملات الأخطاء (Error Learning Coefficients) ، وتعتمد قيمها على نوع نموذج ARIMA المستخدم ، ولقد استخدمنا آنفًا^(٤) هذه الصياغة من أجل الحصول على دالة ذاكرة النموذج (1) ،

فنجد أن $\psi_1 = \phi_1^k, \psi_2 = \phi_1^2, \dots, \psi_k = \phi_1^k$ وبصفة عامة يكون لدينا : $|\phi_1| < 1$.

كما يمكننا صياغة التوقع المثالي (y_n) وذلك بدلالة الأخطاء السابقة والحالية :

$$y_n(h) = \psi_h \varepsilon_h + \psi_{h+1} \varepsilon_{h+1} + \dots$$

وحيث أن خطأ التوقع لعدد h من الفترات القادمة هو :

^(٤) أنظر المعادلة (١٢-١٢) في الصفحة ٨٢ من هذا الفصل .

^(٥) من المرجع [ع. بري-٥٢]، ص ٦٦ .

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\varepsilon_n(h) = y_{n+h} - y_n(h)$$

لذا يمكننا التعبير عن هذا الخطأ كما يلي :

$$\varepsilon_n(h) = \varepsilon_{n+h} + \psi_1 \varepsilon_{n+h-1} + \cdots + \psi_{h-1} \varepsilon_{n+1} \dots \dots \quad (23-2)$$

وباستخدام العلاقة (23-2) الأخيرة مع فرض استقلال الأخطاء ε ، نستنتج أن $\varepsilon_n(h)$ تتبع عملية $MA(h-1)$ ، وذلك بغض النظر عن عملية ARIMA الأصلية التي نقوم بتحليلها ، وعلى وجه الخصوص ، نجد أن أخطاء التوقع لفترة واحدة قادمة وهي $= \varepsilon_{n+1}$ (1) ε_n تتبع عملية تغيرات عشوائية بحثة .

وباستخدام (23-2) الأخيرة كذلك ، نجد أن الوسط الحسابي لأخطاء التوقع $(h)_n \varepsilon$ يساوي الصفر ، وأن تباينها هو :

$$Var[\varepsilon_n(h)] = E[\varepsilon_n^2(h)] = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \dots \dots \quad (24-2)$$

حيث أن : $\psi_0 = 1$ ، وأن تباين أخطاء التوقع لا يتناقص بزيادة أفق التوقع h ، حيث أن :

$$Var[\varepsilon_n(h)] - Var[\varepsilon_n(h-1)] = \sigma_\varepsilon^2 \psi_{h-1}^2 \geq 0$$

وإذا افترضنا أن توزيع التغيرات العشوائية ε هو توزيع معتدل ، يمكننا تحديد توزيع التوقع $(y) f_{n,h}$. في هذه الحالة

نجد أن توزيع التوقع عن y_{n+h} وهو $f_{n,h}(y)$ ، هو توزيع معتدل وسطه الحسابي $(h)_n y$ وتباييهه $Var[\varepsilon_n(h)]$

باستخدام توزيع الخطأ يمكننا بسهولة إيجاد صيغ احتمالات عن المشاهدات المستقبلية . لذا فإن فترة توقع العينات الكبيرة

لتوقع هي :

$$y_t(h) \pm 1,96 SE[\varepsilon_n(h)]$$

حيث يشير SE هنا إلى الخطأ المعياري لخطأ التوقع ، وهو الجذر التربيعي للتباين الموجود في المعادلة (24-2) ، وعند حساب

حدود التوقع فإننا نستبدل معاملات الأخطاء ψ بقيمة مقدراتها $\hat{\psi}$ بقيمة مقدراها $\hat{\psi}$ وكذلك

نستبدل $y_n(h)$ بقيمة مقدراتها .

إذا كان لدينا النموذج من الشكل $\Phi(B)y_t = \Theta(B)\varepsilon_t$ ، أي :

$$\text{فيكون لدينا ما يلي : } y_t = \psi(B)(\varepsilon_t) \quad ; \quad y_t = \frac{\Theta(B)}{\Phi(\Phi(B))}\varepsilon_t$$

حيث : $\psi(B) = 1 + \psi_1 B + \psi_2 B^2 + \dots = \psi(B)^{(1)}$.

وفي هذه الحالة ، وباعتماد مستوى الثقة ($\alpha = 95\%$) ، فإن مجال التوقع للأفق h يعطى العلاقة التالية : ذ

$$(2) y_t(h) \pm 1,96 \hat{\sigma}_{\varepsilon_t} \left(1 + \sum_{j=1}^{h-1} \hat{\psi}_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

⁽¹⁾ انظر المرجع [R.S.TSAY-02] ، ص .54

⁽²⁾ من المرجع [G.BRESSON-95] ، ص .89

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكشن لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

$$\hat{\sigma}_{\epsilon_t} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T e_t^2} \quad \text{حيث :}$$

2 - قياس جودة التوقع:

إن أهم شيء قبل استخدام النموذج المعين هو اختيار الطريقة الأحسن ، وهذا باستعمال مقاييس لجودة التوقع والتي تتمثل فيما يلي^(١) :

1-2 - مقياس الخطأ النسبي (ER) :

يكون معرفاً بالعلاقة التالية :

$$ER_i = \frac{|X_i - F_i|}{|X_i|} \cdot 100$$

حيث : X_i تمثل القيمة المحققة . F_i تمثل القيمة المتوقعة .

إن مقياس الخطأ النسبي هو مفهوم بسيط ، وتقليدي و متعدد في كل مرة عند الحصول على إنجازات جديدة ، وهذا ما يسمح بحساب الفارق بين المنجز فعلاً و المتوقع ، غير أن النظرة المركبة لهذا المفهوم ترتكز على حساب متوسط الخطأ النسبي المعرف بالعلاقة التالية :

$$ME = \frac{\sum_{i=1}^N ER_i}{N}, \quad \forall N$$

وتقى المفضلة بين نموذج و آخر على أساس أدنى قيمة للمقياس (ME) ، لكن إذا أردنا منح ثقل أكثر لأخطاء القياس فإنه يتوجب علينا حساب الخطأ التربيعي المتوسط المعطى بالعلاقة التالية :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - F_i)^2}{N}$$

وبالرغم من هذا فإن هذا المقياس لن يكون حاسماً إلا إذا جعلنا منه ديناميكياً ، وذلك على النحو التالي :

$$E_t'' = \frac{\sum_{i=t-h}^{t+h} (X_i - F_i)^2}{(2h+1)}$$

حيث أنه : $t = h+1, h+2, \dots$

^(١) من المرجع [J.C.Usunier-82] ، ص ص 233-234

الفصل الثاني : طريقة بوكس- جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية

2-2-معيار (Thiel) : هذا المعيار هو عبارة عن إحصائية (*Thiel*)، والتي يرمز لها بالرمز (*U*) ، و المعرفة

كما يلي^(٤) :

$$U = \frac{\sqrt{RMSE}}{\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t)^2} + \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_T^p)^2}}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - y_t^p)^2}$$

حيث أن : فيكون التوقع جيداً ما يكون $0 = U$ ، وتكون العملية فاشلة لما $1 = U$ ، وعملياً يتذبذب هذا المقياس بين هتين القيمتين .

^(٤) من المرجع [م. حشمان-٥٢] ، ص ١٨٣ .

ملخص الفصل الثاني

إن طريقة بوكس- جنكنز تُعتبر أهم بكثير من الطرق المتناولة في الفصل الأول المسممة بنماذج الإستقطاب البسيطة، وذلك نظراً للمراحل الأربع التي تطرّقنا إليها بشيء بالتفصيل في هذا الفصل وهي :

- ✓ **أولاً** : التعرف على النموذج وتحديد شكله ،
- ✓ **ثانياً** : تقدير معلمات النموذج ،
- ✓ **ثالثاً** : اختبار وتشخيص النموذج ، و التي تسمح باختيار النموذج الأمثل من أجل استعماله في العملية التوقعية ،
- ✓ **رابعاً** : التوقع باستعمال النموذج المختار .

وهذا على عكس الطرق الأخرى والتي لا تتمتع بهذه المرونة التي توفرها هذه الطريقة ، إلا أنه وبال مقابل فإن هذه الطريقة تُعتبر مكلفة نوعاً ما ، ذلك أنها تتطلب على الأقل توفر 50 مشاهدة من أجل القيام بهذه الطريقة ، ولذا يجب الإستعانة ببرمجيات خاصة في مجال القياس الاقتصادي وذلك بقيام المؤسسة بتكوين الإطارات الخاصة بها على غرار برامج RATS ، S plus ، E-VIEWS ... إلخ ، أو الإستعانة بخبراء في هذا المجال من خارج المؤسسة، وهذا من أجل إزالة هذا العائق . كما يمكن الإشارة إلى أن هذه الطريقة أو الطرق الأخرى ترجع لاختيار المسير الذي يقوم بالموازنة بين الطرق المختلفة تبعاً لطبيعة المؤسسة وبين تكلفة تطبيق هذه الأخيرة .

كما نُشير إلى أن ما تطرّقنا إليه في هذا الفصل إلى نماذج بوكس- جنكنز الخطية ذات المتغير الواحد (Short term) (Linear Univariate Time Series Models) ، وهي تستعمل في التوقع القصير المدى (Short term) ذلك أنها تفرض ضمنيا عدم تغيير العوامل المؤثرة في السلسلة الزمنية المعنية، أما في حالة العكس فإنه يتم إدخال نماذج بوكس- جنكنز متعددة التغيرات (Multivariate Time Series Models) ^(٤).

^(٤) من أجل التعرف على هاته النماذج ، انظر المرجع [R.S.TSAY-02] إبتداءً من الصفحة 299.

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزبج التسويقي

- ▷ **المبحث الأول :** التعريف بمجمع الإسمنت للشرق (ERCE)
- ▷ **المبحث الثاني:** وظائف شركة إنتاج الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)
- ▷ **المبحث الثالث :** تشخيص المزبج التسويقي لمنتج الإسمنت
البورتلاندي المركب

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزيج التسويقي

تمهيد :

يُعيد تعرضا في القسم النظري إلى التعريف بالنمذج المختلفة من النماذج الإنحدارية المختلفة إلى طريقة تحليل السلسلة الزمنية العشوائية لبوكس- جنكنز، ثم تناولنا في الفصل الثالث نماذج أخرى تنتمي إلى تحليل السلسلة الزمنية ألا وهي نماذج (ARCH-GARCH) التي بنيت على أساس الإنقاد الموجه لبوكس- جنكنز .

وسوف نتطرق في هذا الفصل بالتعريف بشركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) والتي كانت محل الدراسة الميدانية، هذه الشركة التي تعتبر أحد فروع الشركة الأم وهي مجمع (ERCE) .

وسوف نتطرق لأهم وظائف هذه الوحدة بدءاً بوظيفة التموين، الإنتاج والوظيفة المالية، وأخيراً الوظيفة التسويقية، كما تقوم بمحاولة تشخيص المزيج التسويقي من حيث طبيعة المنتوج، الأسعار و المنافسة، الإشهار والتوزيع .

المبحث الأول : التعريف بالمجمع الجهوي للإسمنت بالشرق^(٤) (ERCE)

إن بدايات المجمع الجهوي الصناعي والتجاري للإسمنت بالشرق (ERCE) عن طريق عبارة عن إعادة هيكلة الشركة الأم وهي الشركة الوطنية لمواد البناء (SNMC)، والتي أعطت ولادة هذا المجمع .

هذه الشركة تأسست في سنة 1990 كشركة بالأسماء برأس مال اجتماعي قدره 150 مليون دينار جزائري، وهي ذات طابع اقتصادي عمومي .

وفي سنة 1998 ، وبعد فتح رأسمالها، تحولت هذه الشركة إلى مجمع صناعي وتجاري برأس مال قدره 15 مليار دينار جزائري .

أما فيما يخص نشاطات المجمع فإنها تنقسم إلى أربعة فروع مختلفة وهي :

أ- إنتاج الإسمنت :

للمجمع خمس شركات جهوية لإنتاج مادة الإسمنت، وهي :

- شركة الإسمنت عين توتة (SCIMAT) ،
- شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) ،
- شركة الإسمنت حجار السود (SCHS) ،
- شركة الإسمنت عين الكبيرة (SCAEK) ،
- شركة الإسمنت تبسة (SCT) ،

توجد مجمعي آخرين في وسط وغرب البلاد على غرار مجمع الشرق، وهما : « ERCC متواجد بوسط البلاد » و « ERCO متواجد بغرب البلاد »

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

بـ- قطاع الخدمات :

- شركة الصيانة للشرق (SME) ،
- مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية الصناعية لمواد البناء (CETIM) ،
- شركة أوراس لخدمات الأمن (ASS) .

جـ- قطاع التوزيع :

- شركة تسويق مواد البناء للشرق (SCMCE) ،
- شركة استيراد تصدير مواد البناء (TCS) .

دـ- قطاع مشتقات الإسمنت :

- شركة إنتاج مشتقات الإسمنت للشرق (SPDE) ،
وفيما يلي الشكل(١-٤) الذي يمثل الوحدات المختلفة السالفة الذكر التابعة لمجمع (ERCE) .

١- الميكل التنظيمي للإدارة المركزية :

يقع المقر الاجتماعي للشركة بمدينة قسنطينة، وبالضبط في المنطقة الصناعية المسماة "با لما" الواقعه في الجهة الغربية لهذه المدينة، و يحتوي على :

١) المديرية العامة : يُشرف عليها المدير العام (PDG) الذي يعينه مجلس الإدارة، حيث تتكلف هذه المديرية بالإشراف العام على المؤسسة .

٢) المديرية التقنية : تقوم بتسخير الأمور والوسائل التقنية في المؤسسة، وتتكون من المصالح التالية :

- ﴿ مصلحة التطوير ،
- ﴿ مصلحة التقنية ،
- ﴿ مصلحة الإعلام الآلي .

٣) المديرية المالية : تتتكلف بالتسخير المالي و المحاسبي للمؤسسة، ومن مهامها :

- مسک الدفاتر المحاسبية و إعداد الوثائق المالية ،
- الإشراف على سير المحاسبة التحليلية و مراقبة التسيير،
- العمل على توفير الموارد المالية في الآجال القصيرة، المتوسطة، والطويلة،
- ترتيب هذه المديرية بعلاقات وظيفية مع جميع المديريات المركزية، والدوائر المالية و المحاسبية للوحدات .

وتتكون من المصالح التالية :

- ﴿ مصلحة محاسبة الوحدة .
- ﴿ مصلحة التسيير والديون .
- ﴿ مصلحة المالية .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

٤) مديرية الموارد البشرية : تتکفل بتسییر شؤون العاملین داخل المؤسسة، کالتوظیف، التدربیب ، و التکوین، بالإضافة إلى دفع الأجر، والتکفل بالشؤون الإجتماعية .

٥) مديرية المراجعة ومراقبة التسییر : وت تكون من المصالح التالية :

- » مصلحة المراجعة التقنية .
- » مصلحة المراجعة الإدارية .
- » مصلحة التدقیق المالي .
- » مصلحة مراقبة التسییر .

٦) مديرية الشؤون القانونية والإتصال والتسويق : وتعمل من جهتها على نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسة سواءً داخلها، أو خارجها، ومن المهام الوكالة لها نجد ما يلي :

- » الإشراف على المنازعات القانونية .
- » الإعلام المستمر للعمال بما يجري داخل الشركة.
- » إصدار الدوريات و النشرات المختلفة .

٧) المديرية التجارية : وت تكون من المصالح التالية :

- » المصلحة التجارية

- » مسؤول التصدير و الإستيراد .

٨) مديرية الإستغلال والنوعية وحماية البيئة : تشرف على جودة المنتجات الخاصة بالفرع، وكذلك الإشراف على احترام الشروط البيئية والمحيط أثناء العملية الإستغلالية .

ويعكس الشكل (٤ - ٢) الهیكل التنظيمي للإدارة المركزية لمجمع(ERCE).

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

2- التعريف بشركة تسويق مواد البناء للشرق (SCMCE) :

تقع هذه الشركة بقسنطينة وبالضبط في المنطقة الصناعية "باما" ، وتتكون من سبعة (٠٧) وحدات تجارية موزعة عبر مختلف ولايات الشرق الجزائري، وهي : قسنطينة، سكيكدة، عنابة، تبسة، بسكرة، ورقلة (توقرت)، سطيف، وكذلك عشرون (٢٠) نقطة بيع ، والتي تضمن تغطية الشرق الجزائري بالإضافة إلى جنوبه الشرقي بهذه المادة الأساسية، كما تمتد حتى منطقة إيليزي في أقصى الجنوب الشرقي .

إن هذه الشركة عبارة عن شركة مساهمة، أنشئت في ٥، أبريل ١٩٩٨ بعد انفصالها عن مجمع الإسمنت للشرق (ERCE)، برأس مال قدره **210.000.000 دينار جزائري** (مائتان وعشرة مليون دينار جزائري) ، وذلك من أجل تنظيم الشبكة التجارية لتوزيع أنواع الإسمنت المنتجة في الوحدات الإنتاجية التابعة للمجمع بالإضافة إلى مواد البناء المختلفة مثل : الجير، مواد الخزف الصحي المختلفة، إلخ ... وذلك عن طريق الإستيراد خاصة، ذلك أن مجال نشاط الشركة يتميز بشاسعة مساحتها فهي تغطي ما مجموعه **١٦** ولاية من ولايات الشرق الجزائري وهي : قسنطينة، ميلة، جيجل، عنابة، الطارف، قالمة، سكيكدة، بجاية، سطيف، بسكرة، الوادي، تبسة، خنشلة، سوق أهراس، ورقلة، إيليزي .

2- الهيكل التنظيمي لشركة (SCMCE) :

يتكون الهيكل التنظيمي لشركة (SCMCE) من المصالح التالية :

أ- المديرية : يُمثلها المدير العام المعين من طرف الرئيس المدير العام لمجمع الإسمنت ومشتقاته (ERCE) ، ومن بين مهامه إدارة الأعمال، والسهور على السير العادل للمؤسسة داخليا وخارجيا ، كما يُعتبر المدير العام الطرف الرئيس الذي يقوم بإبرام الصفقات وإمضاء العقود مع الموردين الأجانب .

ب- الأمين الرئيسي : يعتبر العنصر الأساس والفعال الخاص بالمديرية العامة نظراً للأعمال والمهام الواسعة التي يقوم بها، حيث يعتبر همزة الوصل بين المدير العام وكل من يريد مقابلته ،...إلخ .

ج- المراجـم : له علاقة مباشرة مع المدير العام، ومن بين مهامه مراقبة المديريات الثلاث في كل أعمالها، وكذا تهيئة جداول المراقبة والتسيير للمؤسسة، وله الصلاحية في إيقاف أي عمل خارج عن إطار القانون أو القوانين الداخلية للمؤسسة

د- مصلحة التجارة والتمويل : هي المصلحة التي تُعني بنشاطات الشركة التجارية، ويترأس هذه المصلحة مدير التجارة والتمويل الذي يساعد في ذلك نائب التجارة والتمويل .

■ مدير التجارة والتمويل : مسؤول عن النشاط التجاري للشركة وهو مكلف بشؤون التجارة والتمويل للمؤسسة، إذ يقوم بتقسيم البرامج المعطاة من طرف مجمع الإسمنت ومشتقاته للشرق (ERCE) ، وكذا يتبع عملية تسويق المنتجات الأخرى المستوردة من الخارج ، وهو مسؤول عن جميع المناقصات التجارية أيضا ، ويساعد في هذا كله نائب التسويق والتمويل .

■ نائب مدير التجارة والتمويل : يقوم النائب بمساعدة المدير في جميع العمليات التجارية التي تقوم بها المؤسسة، إذ يهتم بتقسيم البرامج التسويقية لمواد البناء المعطاة من طرف مجمع الإسمنت، وكذا يقوم بحساب الميزانية للشركة، فهو يتقاسم المهام مع مدير التجارة والتمويل .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

هـ - مصلحة المالية والميزانية : وتضم مدير المالية والميزانية، ويساعده في أعماله نائبان هما نائب المالية ونائب الميزانية.

ـ مدير المالية والميزانية : يترأس المصلحة مدير المالية والميزانية، وهو المكلف بشؤون الميزانية والمالية، ومن بين مهامه ذكر:

● إتباع الحسابات البنكية، إلى جانب أمور مالية أخرى كالتسديد والصرف .

● إبلاغ المديр العام والمراقبة بكل التفاصيل المتعلقة بالنشاطات والعمليات المالية .

● تتبع المحاسبة العامة للوحدات التجارية الأخرى .

ويساعده في مهامه نائبان هما :

ـ نائب مدير المالية : يتتبع العمليات المحاسبية، ويقوم بتجمیع المعلومات ويستعملها في حسابات الشركة بصفة عامة بعد جمعه للمعلومات من كل الوحدات ووضعها في تقارير تخص كل ثلاثي، وفي آخر السنة يعطي صورة على الوضعية المالية التي توجد عليها الشركة .

ـ نائب مدير الميزانية : يقوم بمراقبة الحسابات الجارية للشركة في مختلف البنوك، وكذلك تتبع الميزانية مرة كل ثلاثة أشهر للقيام بالتعديلات الضرورية .

دـ - مصلحة الإدارة العامة :

هي المصلحة المعنية بجمع الأمور الإدارية للشركة ، وتضم هذه المصلحة مدير الإدارة العامة وقسم الموارد البشرية .

ـ مدير الإدارة العامة : وهو المسؤول عن كل الإنجازات والأعمال التي تقوم بها المديرية، كما أن له السلطة في مراقبة هذه الأعمال وإمضائتها بعد أن يطلع عليها المدير العام .

ـ قسم الموارد البشرية : وهو الذي يقوم بتلبية احتياجات الشركة من مستلزمات التسيير المادية والبشرية .
والشكل (4-3) التالي يوضح الهيكل التنظيمي لشركة (SCMCE).

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

2-2-أهم نشاطات شركة (SCMCE) :

مهمتها الأساسية تسويق مواد البناء، وبالأساس الإسمنت ومشتقاته، خاصة منها المنتجة من طرف الوحدات الإنتاجية التابعة للمجمع، كما تقوم الشركة بتسويق مواد البناء المستوردة من الخارج أهمها الإسمنت . كذلك من أجل سد حاجيات الوطن ، حيث تقوم الشركة بإبرام عقود لاستيراد الإسمنت من عدة دول في إطار برامج خاصة تُعهد إليها من طرف الدولة، أو في إطار توسيع نطاق نشاطها التجاري من خلال مناقصات دولية أو وطنية ، فعلى سبيل المثال قامت الشركة بإبرام صفقة لاستيراد الإسمنت سنة 2003 مع شركات دولية منها :

لله عقد مع الشركة الجزائرية التونسية لاستيراد 12.000 طن من الإسمنت الأبيض ،

لله عقد مع شركة (STAR) التركية لاستيراد 320.000 طن من الإسمنت المقاوم للملوحة ،

لله عقد مع شركة (H.C.Trating) الدولية لاستيراد 300.000 طن من الإسمنت العادي، وهذا العقد الأخير أبرم في إطار برنامج خاص لتلبية حاجيات البلاد من الإسمنت نظراً لكثره المشاريع التنموية التي تعرفها البلاد، حيث أصبحت شركة الإسمنت لا تلبي متطلبات البلاد فيما يخص حاجياتها من الإسمنت خاصة مع المشاريع السكنية التي تعرفها البلاد في الآونة الأخيرة، وانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية.

3-الإستراتيجية المتّبعة من طرف (ERCE) ^(*) :

نظراً للتحولات والتطورات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري سواءً على المستوى الكلي أو الجزئي ، و المتمثل أساساً في ما يلي :

→ فتح السوق الوطنية للمنافسة الداخلية والخارجية ،

→ تخفيض قيمة العملة الوطنية .

فإن المجمع يسعى إلى فتح رأسماله و الدخول في شراكة مع عمالقة إنتاج الإسمنت في العالم، ولم تعد هذه الشراكة سوى قضية وقت بعد أن تم تحضير كل معطيات نجاحها ابتداءً بإنجاز التقويم التقني لكل الوحدات، وتأهيلها لتصبح تعمل وفق المقاييس الدولية من حيث الإنتاج، وذلك من خلال التخفيض من تكاليف الإنتاج وذلك لتوفر المادة الأولية بالجزائر واليد العاملة والطاقة، إضافة إلى أن مراقبة الأعباء المحددة لتكلفة الإنتاج تتم شهريا بكل وحدات المجمع، فإذا وجدت أية زيادة في جانب معين تدرس و تعالج بما يسمح بتصحيح أي خلل .

أما فيما يخص التجهيز، فإن وحدات الإنتاج طبقت برامج لتأهيلها سمحت بتجهيزها بما يسمح لها بإنجاز برامج أعبائها بكل كفاءة، والوصول إلى نسب تقاد تكون كاملة في بعض الوحدات وتجاوز الأهداف في كثير من الأوقات ، حيث أن المجمع استطاع أن يصل إلى 98 بالمائة من قدراته الإنتاجية في سنة 2005 ، وهو يعمل لتجاوز أهدافه هذه السنة، كمان المجمع يسعى لتطوير قدراته و الوصول إلى إنتاج 5 ملايين طن وأكثر خلال السنتين القادمتين وذلك للطلب المتزايد من السوق الوطنية نظراً لانتعاش قطاع البناء والعمير والديناميكية التي يعرفها هذا القطاع في الآونة الأخيرة، والوصول بإنتاج وحدة

^(*) نقلً عن الموقع الإلكتروني للمجمع (بتصريح) : www.erce-dz.com

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزبج التسويقي

عين الكبيرة من مليون طن حاليا إلى حوالي 1.3 مليون طن، وكذلك وحدة عين التوتة، ورفع قدرة وحدة حامة بوزيان من 900 ألف طن إلى مليون طن، ووحدة حجار السود بحوالي 300 ألف طن كذلك.

أما فيما يخص مجالات التسيير، فقد أبرم المجمع اتفاقاً يتم بموجبه ربط كل فروع المجمع بعضها البعض ومع الإدارة العامة للمجمع بشبكة معلوماتية رقمية بالصورة والصوت، وستسمح هذه العملية بالانتهاء من التعامل بالأوراق وإنقاذه إلى التسيير الإلكتروني والوصول إلى ما يعرف بدرجة الصفر في استعمال الأوراق، ومعنى ذلك أن كل وحدات المجمع وسنادات التسيير تكون في متناول الإطارات والمسيرين في أي وقت لاستعمالها بدلاً من المراسلات بالطريقة التقليدية التي كانت تأخذ وقتاً وجهداً إضافيين، كما أن الاجتماعات بين المدير العام ومديري الوحدات وبباقي المسيرين يمكن أن تُعقد يومياً في أي وقت واتخاذ القرارات المناسبة في الحين.

وفي الجانب المحاسبي فقد شرع المجمع في تطبيق نظام المحاسبة العالمي (I.F.R.S)، وذلك بإجراء تكوين للإطارات المكونين في فرنسا، وهؤلاء سيقومون بدورهم بتكوين باقي المحاسبين، وهذا كله يهدف إلى جعل إطارات المجمع يتحدون بنفس اللغة العالمية في المحاسبة مع باقي المتعاملين الدوليين، ذلك أن عديد المجمعات الدولية أبدت اهتماماً بفرصة الشراكة التي يفتحها قطاع الإسمنت بالجزائر.

وأخيراً وفيما يخص الملائمة مع الشروط البيئية، فقد قام مجمع الإسمنت بالشرق بتحديث تجهيزات مختلف وحداته وجعلها متماشية مع المقاييس الدولية للبيئة، حيث قامت وحدة حامة بوزيان (SCHB) من جهتها بالتوقيع على عقد من أجل تركيب مصفاة جديدة من الجيل الحديث، وكذلك في وحدة عين الكبيرة تُقلل من الغبار من 150 غراماً في المتر المكعب إلى 50 غراماً فقط، مما ينهي تماماً مشاكل غبار الإسمنت التي كانت معروفة سابقاً.

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

المبحث الثاني : وظائف شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)

سوف نبدأ أولاً بالتعريف بالشركة، ثم نتناول وظائفها كما يلي :

1- التعريف بالشركة :

أنشئت هذه الشركة في جوان 1998 ، وهي عبارة عن شركة برأسمال اجتماعي يقدر بـ 1.750.000.000 دينار جزائري، وهي إحدى شركات إنتاج الإسمنت التابعة لمجمع الإسمنت للشرق (ERCE) والمختصة في إنتاج الإسمنت البورتلاندي المركب (الإسمنت البُني) المعروف بـ CPS-CEM II/A 42.5، ويشتغل بهذا الفرع حوالي 373 عامل يتوزعون كما يلي^(٤) :

«الإطارات السامية» 49 ،

«الإطارات» 44 ،

«الأيدي الماهرة» 190 ،

«المستخدمين» 90 .

2- الهيكل التنظيمي لشركة (SCHB) :

إن الهيكل التنظيمي لشركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) ممثلاً في الشكل البياني (4-4) الموالي و تتكون الشركة من مديرية عامة والتي كانت محل المعاينة الميدانية والمديرية الإنتاجية (المصنع) .

فأما المديرية العامة ؛ فإنها تتكون من المديرية المالية، مديرية الموارد البشرية، مديرية التطوير والبحوث، مديرية التموين والتسيير، ومن مهام المديرية العامة ذكر :

- الإشراف على ملف الإستثمارات ،
- إعداد عقود التموين بالمواد واللوازم المستوردة المتعلقة بالعملية الإنتاجية (الأجر، الإسمنت ،....) ،
- التموين بالمواد الأولية المحلية مثل الجبس، الحديد،
- المشتريات المحلية ذات الأهمية البالغة مثل الكهرباء والغاز ،
- الإشراف على المفاوضات والعمليات البيعية للإسمنت المنتج على مستوى المصنع .

أما المديرية الإنتاجية (المصنع)، فإنها تتكون من الدوائر التالية: دائرة التسويق، دائرة التموين، دائرة الصيانة، دائرة الإنتاج، دائرة مراقبة النوعية، دائرة الموارد البشرية .

ومن مهامها ذكر ما يلي :

- متابعة البرنامج الإنتاجي والمهتم على تطبيقه ،
- متابعة المبيعات والعقود مع الزبائن ،
- إعداد عقود إمدادات المواد واللوازم المستوردة المخصصة لوظائف الشركة سواءً منها قطع الغيار أو غير ذلك .

^(٤) نائبة مدير الموارد البشرية للفرع بتاريخ : 2006/12/31 .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

٣- وظائف شركة (SCHB) :

سوف نقوم من خلال هذا البحث بتشخيص لأهم وظائف الفرع كما يلي، حيث نبدأ بالتمويل، الإنتاج والتحويل، الوظيفة المالية، وأخيراً الوظيفة التسويقية.

٣-١- وظيفة التمويل:

تعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف الوحدة، وذلك نظراً لضخامة المواد الأولية المستهلكة، وكذلك المبالغ المخصصة لشراء هذه المواد، والشركة تعتمد حسب شروحتين القائمتين عليها على المناجم والمحاجر المحلية بشكل شبه كامل في اقتناص مواده الأولية، وهذه المواد هي الرمل، الجبس، الطين والحديد والصلصال الخام.

٣-٢- الوظيفة الإنتاجية والتحويلية :

تُعد هذه الوظيفة الثانية في دورة الإستغلال بعد الوظيفة التموينية، حيث يتركز إنتاج الوحدة على إنتاج نوع واحد من الإسمنت وهو الإسمنت البورتلاندي المركب (الإسمنت البني) :

٣-٢-٣- خط إنتاج الإسمنت البورتلاندي المركب (CPS-CEM II /A 42.5) :


يبين الجدول (١-٤) المواري تطور إنتاج هذا الخط كمّاً، حيث أن الوحدة هي الطن .

جدول (١-٤) : تطور إنتاج (CPS-CEM II /A 42.5) بين سنتي 1998-2005 :

المجموع	السائل (الشاحنة+القطارة) VRAC(TERRE+FER)	SAC	السنة
711457.97	390415.47	321042.50	1998
734135.85	443232.85	290903.00	1999
787425.00	527882.00	259543.00	2000
794768.00	528231.00	266537.00	2001
799966.00	512828.00	287138.00	2002
721199.00	490672.00	230527.00	2003
790243.00	467965.00	322278.00	2004
835624.00	545849.00	298775.00	2005

المصدر: نيابة المديرية التقنية، المديرية العامة، شركة (SCHB).

وهذا ما يمكن إبرازه بالشكل التالي :



شكل (٤ - ٥) : تطور إنتاج الإسمنت البورتلاندي المركب (CPS-CEM II/A 42.5)

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

3-3 الوظيفة المالية^(٤) :

سوف نقوم في هذا المقام بدراسة عملية الإستغلال، والتي تنصب على تحليل هيكل حسابات النتائج الذي يبيّن مراحل تكون النتيجة انطلاقاً من دراسة مستويات النشاط المحققة ومقارنتها مع الأعباء والتكاليف التي تحملها المؤسسة.

أولاً : مستوى النشاط :

بالرجوع إلى جدول حساب النتائج (الجدول 3-4)، نحصل على النتائج التالية :

جدول (2) : تطور مؤشرات النشاط بالمؤسسة :

نسبة الزيادة 05/03	2005	2004	2003	السنة	البيان
% 24 +	2720708	2520516	2191256		رقم الأعمال السنوي
% 0.23 -	99.77	99	100		الإنتاج المباع / رقم الأعمال
% 27+	2787389	2667130	2197818		النشاط الإجمالي
% 84+	1351835	1184386	733504		القيمة المضافة

المصدر : تم إعداد هذا الجدول من طرفنا اعتماداً على الجدول (3-4) المولى.

يتبيّن من الجدول أن :

أ- رقم الأعمال في تطوير مستمر نحو الارتفاع، حيث بلغت الزيادة الإجمالية المسجلة خلال فترة الدراسة نسبة 24%.

رغم التراجع البسيط لأن هذه الزيادة جاءت رغم الإنخفاض الطفيف في حصة الإنتاج في تكوين الإنتاج المباع في تكوين رقم المبيعات بحوالي 0.23% كما هو واضح في الجدول.

ب- حجم النشاط الإجمالي عُرف هو الآخر تطوراً مشجعاً، حيث بلغت الزيادة حوالي 27%， وهذا يعكس الجهد المبذول من طرف العمال خاصة في مجال الإنتاج وأنه يباع كلّه.

ج- لا يختلف الأمر بالنسبة للقيمة المضافة التي تعبر عن حجم الثروة الإضافية التي أنشأتها المؤسسة أثناء نشاطها، والتي ازدادت هي الأخرى بنسبة معتبرة وصلت 84+ % مابين سنتي الدراسة 2003 - 2005.

والملاحظ عموماً أن مؤشرات النشاط الثلاث تدل كلها على تطور إيجابي لنشاط الإستغلال في المؤسسة غير أن الحكم النهائي على مصداقية الأرقام التي تعطيها هذه المؤشرات لا يكون صحيحاً إلا بعد تفحص أرقام التكاليف، والتي تحملتها المؤسسة لتحقيق تلك النتائج، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال دراسة بنية القيمة المضافة وهيكل التكاليف.

ثانياً : القيمة المضافة وهيكل التكاليف :

إن تحليل الإستغلال يتمحور أساساً حول مفهوم القيمة المضافة على اعتبار أن القيمة المضافة :

● تترجم فائض الثروة المحقق من نشاط المؤسسة ومدى مساهمتها في زيادة الإنتاج الوطني،

● تعطي خلاصة عن إمكانيات المؤسسة ومقدرتها على التحكم في مواردها،

^(٤) للمزيد من التفاصيل حول تشخيص الوظيفة المالية على مستوى المؤسسة الاقتصادية انظر [ز. حوري-89]، وكذلك [ب. خنخار-01].

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

- تستعمل في المقارنة بين مساهمة عناصر التكاليف في إنتاجها وفي مردودية هذه العناصر،
 - ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمويل الذاتي للمؤسسة، إذ بارتفاعها تحصل هذه الأخيرة على عناصر تمويل ذاتي أحسن كالنتيجة الصافية والإهلاكات والمؤونات .
- لأجل ذلك، فإن دراسة بنية القيمة المضافة لها أهمية قصوى لما تنطوي عليه من توجيه استراتيجية المؤسسة مستقبلاً، إذ تُبيّن الوزن النسبي للعناصر المكونة لها والمؤثرة عليها وكيفية تطورها عبر الزمن .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

و = ألف د. ج

جدول(4-3) : جدول حسابات النتائج للفترة (2005-2003) :

السنوات	البيان	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	نسبة التغير		
										2005	2004	2003
	مبيعات بضائع									0.5 / 03	%	المبلغ
-	إنتاج مباع	6068	0.22	20196	0.8	2191256	-	-	-	% 24 +	99.77	2714640
-	إنتاج المؤسسة لذاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	خدمات مقدمة	1254	0.2	2191256	100	2191256	-	-	-	% 24 +	100	2720708
	رقم الأعمال									% 24 +	97.61	2720708
	رقم الأعمال									% 1216+	1.31	36474
	إنتاج مخزون									% 207+	1.08	30207
	تحويل تكاليف الإنتاج									% 27+	100	2787389
	(1).....											
	بضائع مستهلكة									-	0.29	4239
	مواد ولوازم مستهلكة									% 1-	70.27	1008745
	خدمات محصلة									% 5 -	29.44	422570
	إستهلاكات وسيطة.....									% 2 -	100	1435554
	(2).....									% 84+		1351835
	(2)-(1)									% 84+	93.94	1351835
	القيمة المضافة.....									% 27-	3.03	43627
										% 45+	3.02	43495
	نواتح مختلفة									% 20+	43.16	462808
	تحويل تكاليف الإستقلال									% 3+	5.52	59177
										% 139+	5.68	60880
										% 26 +	2.86	30639
										% 10 +	42.78	458810
	مصاريف المستخدمين									% 18 +	100	1072314
	ضرائب ورسوم									% 520 +		366643
	مصاريف مالية									% 56 -		79842
	مصاريف مختلفة									% 109 +		145282
	مخصصات الإهلاك والمأوى									% 157 -		(65440)
										% 1028 +		301203
											00	21258
												138138
	النتيجة الإجمالية											23189
	الضريبة على الأرباح											
	النتيجة الصافية									% 1199+		301203

المصدر : تم إعداد هذا الجدول من طرفنا اعتماداً على ميزانية المؤسسة للفترة المحددة (أنظر الملحق 01، 02، 03).

ملحوظة : المبالغ بين قوسين سالبة .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزبج التسويقي

و=ألف دج

(03-05) : تطور القيمة المضافة وهيكل التكاليف خلال الفترة

2005		2004		2003		السنة
%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	البيان
%100	1351835	%100	1184386	%100	733504	القيمة المضافة
%34	462808	% 37	437432	%53	386205	مصاريف العاملين
% 4	59177	% 5	59703	%8	57630	ضرائب ورسوم
%33	829850	% 58	687251	%39	289669	الفائض الخام للإستغلال
%6	87122	%4	53273	%12	90035	(+) إيرادات مختلفة وتحويل تكاليف الإستغلال
%4	60880	%2	28139	% 3	25474	(-) مصاريف مالية
%2	30639	%3	32176	% 3	24396	مصاريف مختلفة
%34	458810	%39	465296	% 57	417074	مخصصات الإهلاك
%27	366643	%18	214913	(%12)	(87240)	نتيجة الإستغلال

المصدر : جدول النتائج للفترة .

تمكّنا القراءة الإنقاذية لتطور القيمة المضافة وهيكل التكاليف من ملاحظة التالي :

أ-أعباء المستخدمين :

موازاة مع الإرتفاع الحاصل في القيمة المضافة، والتي تقربياً تضاعفت خلال الفترة المدروسة، نجد أن عناصر الأعباء عرفت كلها ارتفاعاً خلال نفس الفترة وهذا ببنسبة ٣ % أدناها الضرائب والرسوم، وأقصاها ١٣9 % بالنسبة للمصاريف المالية، وكذلك زيادة أعباء المخصصات والإهلاكات ب ١٠ %. هذه النتيجة تعد مقبولة جزئياً بالنظر إلى توسيع نشاط المؤسسة وتزايد رقم إنتاجها ومبانيتها، لكن الملفت للإنتباه أن أهم عنصر تكاليفي يؤثر على القيمة المضافة يتمثل في مصاريف المستخدمين المرتفعة نوعاً ما، حيث نلاحظ أن القيمة الأجريب السنوية على قيمة معتبرة تتجاوز النصف بقليل في سنة ٢٠٠٣، إلا أنها تنخفض إلى ٣٤ % في سنة ٢٠٠٥ كما تمت حوالى ١٧ % من رقم الأعمال طوال السنوات الثلاث .

ب- الضرائب والرسوم :

بالنسبة لإدارة الضرائب نلاحظ أن قيمة الضرائب والرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة تمثل ما بين ٨ % و ٤ % من القيمة المضافة المحققة و حوالى ٣% من رقم الأعمال و هذه النسبة تعتبر عادلة .

ج-المصاريف المالية :

فيما يتعلّق بأعباء المصاريف المالية فإن الحدود الطبيعية لهذه الأعباء يجب ألا تتعدي نسبة ١.٢ % من رقم الأعمال خارج الرسم . فإذا تراوحت نسبتها بين ١.٢ % و ٢.٥ % فإنها تعتبر مقلقة، أما إذا تجاوزت هذا المجال فإنها تصبح خطيرة حيث يدل ذلك على أن المؤسسة تعتمد على وسائل تمويل خارجية ومكلفة في آن واحد .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزاج التسويقي

وبالنسبة لمؤسسةنا هذه فإنها تتراوح على التوالي كما يلي : ١.١٦٪، ١.١١٪، ٢.٢٣٪ من رقم الأعمال الصافي، أي أنها في حدودها الطبيعية إلا في سنة ٢٠٠٥ أصبحت مقلقة نظراً لارتفاع التكاليف المالية بشكل كبير، حيث بلغت نسبة التغير بين سنتي الدراسة ١٣٩٪ (أنظر الجدول (٣-٤)).

د - الإهلاكات :

بالنسبة لمخصصات الإهلاك وإن كانت تزيد من قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة، إلا أنها في نفس الوقت تؤثر على سعر تكلفة المنتوجات من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن الجدول.. نلاحظ أنه وبالمقارنة بين سنتي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ ارتفاع بنسبة

تقدير ب ١٠٪.

ثالثاً : تحليل النتيجة :

إن تحليل النتيجة يهتم بمعالجة الأرصدة الوسيطة للتسبيير، وهي عبارة عن مجاميع اقتصادية توضح كيفية تكوين النتيجة بشكل تدريجي وإبراز مختلف العناصر التي ساهمت في تحقيقها، وهذه المجاميع هي :

أ- نتيجة الاستغلال :

إن مقابلة أعباء الإستغلال بالنشاط الإجمالي تمكن من الحصول على نتيجة الإستغلال كما يلي :

جدول (٤-٥) : تطور أعباء الإستغلال خلال الفترة (٠٥-٠٣) و=ألف د. ج

نسبة التغير ٠٥/٠٣				السنة	البيان
	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣		
% ٢٧+	٢٧٨٧٣٨٩	٢٦٦٧١٣٠	٢١٩٧٨١٨	(I)	النشاط الإجمالي
% ٣-	٨٧١٢٢	٥٣٢٧٣	٩٠٠٣٥		+ نوافذ أخرى
% ١٨+	١٠٧٢٣١٤	١٠٢٢٧٤٦	٩١٠٧٧٩	(II)	أعباء الإستغلال
% ٢-	١٤٣٥٥٥٤	١٤٨٢٧٤٤	١٤٦٤٣١٤		+ إستهلاكات وسيطية
% ٥٢٠+	٣٦٦٦٤٣	٢١٤٩١٣	(٨٧٢٤٠)	نتيجة الإستغلال (I)-(II)	

المصدر : جدول النتائج لفترات .

تدل الأرباح المتناوبة في السنتين الأخيرتين والزيادة بنسبة ٥٢٠٪ بالمقارنة مع السنة الأولى من سنوات الدراسة أين حققت المؤسسة خسارة، فإن هذا يدل على أن الإيرادات التي تحققها المؤسسة أكبر من المصروفات التي تتحملها عدا في السنة الأولى التي سجلت فيها خسارة للإستغلال نتيجة ارتفاع في تكاليف الإستغلال بنساب أكبر من ارتفاع إيرادات الإستغلال وخاصة منها التكاليف المالية بنسبة كبيرة قدرت ب ١٣٩٪، وبالرجوع إلى الجدول أدناه نجد أن أهم عنصرين تكاليفيين يؤثران على نتيجة الإستغلال يمثلان في تكلفة المواد المباشرة (المواد واللوازم المستهلكة) وفي تكلفة اليد العاملة المباشرة (أعباء المستهلكين). هذين العنصرين يستحوحان في المتوسط على ٧٨٪ من رقم أعمال المؤسسة وعلى ٨٤٪ من حجم النشاط الإجمالي المحقق . وإذا كان بإمكان المؤسسة خفض تكاليف المستخدمين بتقليل عددتهم مثلاً، فإنه من الصعوبة عليها

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

بالنسبة لتكليف المواد الأولية ، حيث أن أغلبية هذه المواد يتم جلبها من أماكن بعيدة نوعاً ما ، كمانه يصعب عليها التخفيض من كميات المواد الأولية خاصة في ظل الطلب الكبير على هاته مادة الإسمنت البني الحيويه وانتعاش قطاع البناء في الآونة الأخيرة .

جدول (٤-٦) : مقارنة مصاريف المستخدمين ومصاريف المواد المباشرة إلى رقم الأعمال وإلى النشاط الإجمالي
و = ألف د.ج ، %

النسبة المتوسطة	2005	2004	2003	السنة	
					البيان
/	1008745	1067813	1020325		تكليف المواد واللوازم المستهلكة
/	462808	437432	386205		تكليف اليد العاملة
					(أعباء المستهلكين)
/	1471553	2911775	1406530		المجموع (1).....
/	2787389	2667130	2197818		النشاط الإجمالي (2).....
%84	53%	109 %	90%		تكلفة المواد الأولية والأجور إلى النشاط الإجمالي: (2)/(1).....
/	2720708	2520516	2191256		رقم الأعمال (3).....
%78	% 54	%116	% 64		تكلفة المواد والأجور إلى رقم الأعمال: (3)/(1)

المصدر : جدول النتائج للفترات .

ب - النتيجة خارج الإستغلال :

تطورت على النحو التالي :

2003 : 113942(+). د.ج

2004 : 55517 (-) د.ج

2005 : 65440 (-) د.ج

أظهرت نتيجة خارج الإستغلال خسارة خلال الدورتين 2004 و 2005 وهذا نتيجة عبء تكليف خارج الإستغلال والتي كانت نسبة تغيرها موجبة بين سنتي 2003 و 2005 بحوالي 109% وفي المقابل انخفاض في الإيرادات خارج الإستغلال بحوالي 56% (أنظر الجدول (3-4)).

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

جـ- النتيجة الصافية^(١) :

خلال سنوات الدراسة سجلت (SCHB) النتائج الصافية الموجبة :


2003 : 23189 د.ج

2004 : 138138 د.ج

2005 : 301203 د.ج

نلاحظ إنطلاقاً من تطورات النتيجة الصافية أن شركة إنتاج الإسمنت حامة بوزيان تحقق في أرباح معتبرة، وأن نسبة التغير بالزيادة في الأرباح بين سنتي الدراسة 2005/2003 كانت في حدود 1199%， وهي نسبة ضخمة وهي تعكس الوضعية المتازة التي تتمتع بها الشركة وتحقيقها لترابع في الأرباح طوال سنوات الدراسة .

وهذا ما يمكن توضيحه في الشكل البياني (٤-٦) التالي :



شكل(٦-٤) : تطور النتيجة الصافية بين سنتي (٥-٣)

٤-3- الوظيفة التسويقية :

تقوم شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) بتسويق الإسمنت البني مباشرة إلى زبائنها، ذلك أنها تغطي مناطق كل من قسنطينة، ميلة وجيجيل بهذه المادة الحيوية سواءً منها ما تعلق بالإسمنت الموجب في الأكياس (SAC)، أو غير الموجب (VRAC)، وفيما يلي نقوم بدراسة التطورات الحاصلة في رقم أعمال الشركة للأعوام التالية :

جدول (٤-٧) : تطور رقم الأعمال من الفترة (٥-٣) :


و=ألف د.ج

السنة	قيمة رقم الأعمال	
2005	2004	2003
2720708	2520516	2191256

المصدر : جدول حسابات النتائج للفترات .

^(٤) تعتبر مؤشر هام لقياس مردودية استعمال رؤوس الأموال الخاصة في المؤسسة وأيضاً مقياس لمرونة عناصر الأصول التابعة باستعمال النسب المالية . كما يستعمل في تحديد درجة الإستقلالية للمؤسسة عن طريق التدفق النقدي .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزبج التسويقي



شكل (4-7) : تطور رقم الأعمال بين سنوي (03-05)

نلحظ من الجدول (4-7) والشكل (4-7) السابقين أن رقم الأعمال في تطور مستمر طوال سنوات الدراسة، حيث قدرت نسبة هذا التطور بين سنوي 2003 و 2006 بحوالي 24 % .

المبحث الثالث : تشخيص المزبج التسويقي لمنتج الإسمنت البني

مع بدايات انفتاح الاقتصاد الجزائري على الأسواق الخارجية، ودخول اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيز التطبيق العام 2005، والفاوضات الجارية من أجل الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية مما يفرض على المؤسسات الجزائرية التأقلم مع هذا الوضع الجديد، وإلا فالزوال، ومؤسستنا هذه لا تخرج عن هذه القاعدة، لذا فكرت بوضع سياسة لتصريف، وتسيير منتجاتها، وتعمل على إنشاء مديرية مستقلة للتسويق، دون نسيانأخذ العوامل البيئية، والحفاظ على المحيط في الحسبان في كل ما تقوم به، وفي هذا البحث سوف نتعرف على السياسة التسويقية المتبعة من طرف الشركة من خلال دراستنا لنوعية المنتجات المباعة، المنافسة، الأسعار، الإشهار، والتوزيع .

وقد تركزت دراستنا هذه على منتج : الإسمنت البُني (le Ciment Gris) .

I - دراسة المنتوج :

من خلال هذا العنصر سوف نستعرض طبيعة المنتوج والسوق المستهدفة، وكذلك ساسة الجودة والضمان والضمان المتبعة من طرف شركة (SCHB) كما يلي :

1 - طبيعة المنتوج والسوق المستهدفة :

يقوم المجمع بإنتاج نوعين من الإسمنت وهما :

أ) الإسمنت البُني، والذي يرمز له بالرمز (CPS-CEM II/A 42.5)، هو إسمنت بورتلاندي مركب ناتج عن خليط مادة الكلنكر مع مواد مضافة مسحوقه بدقة، تضاف كبريتات الكالسيوم (الجبس) بكميات قليلة لضبط المسك، وهذا المنتج يشكل جل مبيعات الشركة بحوالي 98% من إجمالي المبيعات، والتي تقوم بإنتاجه كذلك جل الوحدات الإنتاجية التابعة للمجمع بالإضافة إلى شركة (SCHB) .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزيج التسويقي

ب) الإسمنت المقاوم للملح^(٤) (CRS) : والذي تقوم بإنتاجه وحدتين هما :

شركة الإسمنت عين الكبيرة (SCAEK) ، وشركة الإسمنت عين توتة (SCIMAT) .

ج) كما تقوم الوحدة التجارية التابعة للمجمع وهي (SCMCE) باستيراد نوع آخر من الإسمنت هو الإسمنت الأبيض .

الجدول (٤) : منتجات الإسمنت واستخداماتها :

المستخدم	المنتجات
<ul style="list-style-type: none">يستخدم لإنجاز :• الخرسانة المسلحة والغير مسلحة .• الخرسانة المجهزة للإستعمال .• الهندسة المدنية (جسور وطرق ومنشآت) .• أشغال البناء المختلفة (سكنات ، محلات تجارية وصناعية) .• منتجات مشتقة من الإسمنت .• ملاط لجزء الوسط وتخشين الجدران .	إسمنت بورتلاندي مركب : (CPS-CEM II/A 42.5)
<ul style="list-style-type: none">يُستعمل في المناطق الصحراوية التي توجد بها الأملاح بكميات كبيرة.يُستعمل كذلك في السكنات التي تكون قريبة من البحر، والتي تكون معرضة لمياه البحر المالحة .	إسمنت مقاوم للأملاح (CRS)
• يستعمل تغطية الإسمنت البني العادي الذي لا يتميز بواجهة حسنة .	الإسمنت الأبيض (Ciment Blanc)

المصدر : نائب مدير التسويق والتمويل، شركة(SCMCE)، سنة 2006 .

١ - ٢- الجودة والضمان :

من المعلوم أن جودة المنتج تعتبر من الدوافع الرئيسية التي تدفع أي مستهلك إلى اقتناء منتج أو منتجات دون الأخرى ، فكذلك بالنسبة لشركة(SCHB) ، حيث تشرف على جودة منتجاتها عن طريق مجمع (ERCE) ، والذي يعمل من جهته عن طريق مخبره المعتمد المتواجد بالجزائر العاصمة المسمى (CITIM) ، والذي يسهر من جهته على جودة منتجات المجمع وإخراجها في أحسن حال ، فهي تخضع منتجاتها لمراقبة دقيقة ومستمرة للجودة، وكذلك اختبار المنتج وقد تكللت مجهودات المجمع بالحصول على شهادة الجودة المعروفة ب (ISO9000) من طرف الشركة الفرنسية(Veritasse) ، والتي تحصلت عليه جل الوحدات الإنتاجية التابعة للمجمع ، وهي شركة الإسمنت عين الكبيرة (SCAEK). شركة الإسمنت عين توتة (SCIMAT) ، شركة الإسمنت حجار السود (SCHS) .

CRS: Ciment Résister Aux Sulfate^(٥)

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

أما على مستوى شركة إنتاج الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)، فهي تعمل من جهتها على أن تكون منتجاتها متطابقة مع مقياس (ISO 9001/2000)، هذه السياسة ترتكز على الوفاء، وإرضاء الزبون وثقته بالشركة، فأسباب قوتها تكمن في سياسة معتمدة على الجودة في المنتج، وكفاءة في الخدمة، وإنقان في التنظيم ووضوح في المسار.

وفي هذا الإطار تلتزم الشركة بتجسيد الأهداف التالية :

« توفير منتوج للزبائن مطابق للمقاييس ،

« إرضاء الزبائن وذلك بالإلتزام وتحسين آجال التسلیم ،

« إعلام الزبائن بطرق وتسبيير منتوجاتها ،

ولتطبيق نظام التسييير ذي الكفاءة العالمية حسب مقياس (ISO 9001/2000) تعمل الشركة بالدوام على ما يلي :

« أن تكون في الاستماع إلى الزبائن قصد تقدیر حاجياتهم وبالتالي تلبیتها ،

« تحسین نظمها وتسبييرها ،

« تکوین وتحفز الموارد البشرية وتحملها المسؤولية ،

« تضع تحت المسؤولين الوسائل الازمة لبلوغ الأهداف المسطرة .

وفي هذا الإطار فإن مسؤول الجودة بالشركة (RMQ) مكلف بمتابعة وضمان تجسيد هذه السياسة وتفاعلها مع العمل،

وعلى تعميمها على جميع هياكل الشركة وموافاته بتقارير دورية .

2- دراسة الأسعار والمنافسة :

2-1- الأسعار : عرفت أسعار الإسمنت البني المنتج بشركة (SCHB) ثالث تغييرات من سنة الإنشاء حتى آخر تعديل

في الأسعار مؤخراً في 2 جانفي 2007 ليبلغ سعرطن الواحد (خارج الرسم HT) كما يلي⁽⁴⁾ :

● الإسمنت الموضب في الأكياس (SAC) : ١ طن = 3900 د.ج ،

● الإسمنت الغير موضب (VRAC) : ١ طن = 3400 د.ج .

والجدول التالي يوضح تطور أسعار الإسمنت بنوعيه على مدى التغيرات الثلاث :

⁽⁴⁾ يمكن معرفة سعر الكلغ (خارج الرسم HT) من الإسمنت البني، ذلك أن :

• الغير الموضب (السابق) : شاحنة = 20 طن = 200000 كلغ / والقاطة 50 طن = 50000 كلغ .

• الموضب : كيس = 50 كلغ

ذلك يمكن الإشارة إلى أن معدل الرسم يقدر بـ : 17% .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

الجدول(4-9) : تطور الأسعار الخاص بالإسمنت البني الموضب في الأكياس(SAC)+الغير موضب (VRAC) و = طن

التاريخ	النوع
مارس 2001	الموضب في الأكياس (HT) SAC
أوكتوبر 2006	الغير موضب في الأكياس (HT) VRAC

المصدر : سجل الأسعار، مديرية التموين والتسويق ، شركة (SCHB) .

2-المنافسة : فيما يخص المنافسة ومع بدايات افتتاح السوق الجزائرية على السوق الخارجية ، وسعى الجزائري إلى الشراكة من أجل تغطية الطلب المحلي على هذه المادة الحيوية في النشاط الاقتصادي ، ولم لا تصدير الفائض خاصة مع دخول شركة أوراسكوم المصرية لإنتاج الإسمنت ممثلاً في شركة "سيبيا" التي تنجذب مركباً لصناعة الإسمنت الأبيض والرمادي بمنطقة أهل ونان بولاية معسكر ، وأن مصنع الإسمنت الأبيض سيدخل الإنتاج شهر أفريل 2007 ، بطاقة 550 ألف طن سنوياً .

كما أشار مسؤولوا شركة "سيبيا" في تصريح لجريدة الخبر اليومية الجزائرية ⁽¹⁾ أن شركتهم خصصت أزيد من 520 مليون دولار لإنجاز المركب ، وأن المصنع الذي انطلقت به الأشغال شهر أكتوبر من سنة 2005 ورصد له مبلغ 182.4 مليون دولار مع مهلة مبدئية بـ 20 شهراً وبعدد عمال وصل حالياً إلى 550 عاملاً ينتظرون أن يرتفع أكثر مع الدخول في الإنتاج . وأضاف مسؤولوا هذه الشركة المصرية ، أن مصنع الإسمنت الرمادي الذي يجري إنجازه حالياً بنفس الموقع ، سيتم استلامه شهر أكتوبر من سنة 2007 لينتاج 5.2 مليون طن سنوياً ، ويوظف حالياً في أشغال الإنجاز 450 عاملاً مع تكلفة إجمالية تقدر بـ 399 مليون دولار . ويوظف المركب حالياً 2680 عاملاً بشكل مباشر وغير مباشر ويتوقع الوصول إلى 3500 عاملاً مع شهر جانفي المقبل ، منهم 600 عامل مصرى ويتوقع الوصول إلى خلق 8000 منصب عمل مباشر وغير مباشر عند انطلاق مصنع الإسمنت الأبيض والرمادي في الإنتاج . وحول معايير احترام البيئة ، فإن شركة "سيبيا" سوف تستثمر ما مجموعه 12 مليون دولار في اقتناء وتركيب التجهيزات التي تسمح بالاحفاظ على البيئة وحمايتها ، ومن ذلك المصافي وغيرها لتفادي انتشار الروائح والإفرازات الملوثة للبيئة والمضررة بالإنسان والنبات .

كمان المركب يعتمد على المناجم والمحاجر المحلية بشكل شبه كامل في اقتناء مواده الأولية ، حيث يجلب الرمل من منطقة تيغزيف والجبس من منطقة المحمدية والطين من منطقة حاسين وجلب مواد أولية أخرى من محاجر داود وعفار قرب سيف ، مع استقدام الحديد من منجم فرفوس بتبيسة واستيراد الصلصال الخام من الخارج . هذا وتتضمن مؤسسة أوراسكوم المصرية بفرعيها بالمسيلة ومعسكر 30 في المائة من إنتاج الجزائر من الإسمنت الرمادي بمقدار 6 ملايين طن سنوياً من مجموع 18 مليون طن سنوياً هو الإنتاج الكلي للجزائر ، إضافة إلى احتكار أوراسكوم لإنتاج الإسمنت الأبيض عبر مصنعاها

⁽¹⁾ من الموقع الإلكتروني لبوابة الجزائر : <http://www.babeldjazair.com/models.php?name=news&file>

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزيج التسويقي

الجديد بـ ٥٥٠ ألف طن سنوياً .

٣- دراسة الإشهار والتوزيع :

٣-١- الإشهار:

إن مجمع (ERCE) كغيره، يعمل من أجل التعريف بمنتجاته، وخلق شعور جيد لدى المستهلك بأن منتجاته هي الأحسن في السوق، ومن أجل ذلك يقوم بحملات إشهارية تهدف إلى :

- ↔ التعريف بالمؤسسة، ونقطات بيعها .
- ↔ جذب المستهلكين لمنتجات المؤسسة .
- ↔ بث الثقة في الزبون فيما يخص جودة المنتجات .
- ↔ إبراز الخصائص التقنية للمنتجات .
- ↔ محو فكرة السعر المرتفع، وجعل المستهلك يتقبل المنتوج بهذا السعر، ذلك أن الجودة تمنح للمنتج فكرة استعمال أكبر .

ومن أجل هذا تعمد المؤسسة إلى استعمال الوسائل التالية :

- ↔ الإشراف على الموقع الإلكتروني للشركة، والذي يقدم تعريفاً للشركة، ومنتجاتها، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالشركة عموماً، وبقطعان شركات الإسمنت أولاً بأول .
- ↔ إعداد المنشير التقنية الموجهة إلى الزبائن والمختصين، ومنشير تجارية موجهة للزبائن العاديين .
- ↔ المشاركة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية المنظمة هنا وهناك .

٣-٢- التوزيع :

إن وظيفة التوزيع تعتبر من الوظائف الأساسية في الاقتصاد والتجارة، وعدم التحكم في هاته الوظيفة بشكل جيد يؤدي إلى حصول خلل في العرض والطلب، فهي تمثل أساساً في إيصال المنتوج إلى المستهلك الذي يطلبها في الوقت المناسب، وبالكمية والمواصفات الملائمتين ، إذن فالتوزيع يُعتبر عنصراً أساساً في المزيج التسويقي، و اختيار شبكة التوزيع يجب أن يكون حسب خصائص السوق .

وفيما يخص مجمع الإسمنت بالشرق (ERCE)، فإنه وبالإضافة إلى أن كل وحدة تقوم بالتوزيع مباشرة، بالإضافة إلى الوحدة التجارية التابعة للمجمع وهي شركة تسويق الإسمنت بالشرق (SCMCE) التي تقوم بدورها بتوزيع منتجات المجمع، بالإضافة إلى أنها تقوم باستيراد الإسمنت الأبيض الغير منتج محلياً، بالإضافة إلى الإسمنت المقاوم للأملاح، كما يمكن الإشارة إلى أن هذه الشركة يمتد نشاطها التجاري كذلك إلى بيع مختلف منتجات الخزف الصحي، والتي تقوم بشرائها من أجل معاودة بيعها مع الحصول على هامش بيع معين .

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزدوج التسويقي

ملخص الفصل الرابع

من خلال تشخيصنا للمزدوج التسويقي لشركة SCHB ، وهذا من حيث طبيعة المنتوج، الجودة والضمان، الأسعار والمنافسة، الإشهار والتوزيع، اتضح لنا أن الوحدة تحاول التحكم في عناصر المزدوج التسويقي، وهذا بفضل المجهودات المبذولة في الميدان رغم المشاكل الموجودة في الميدان جراء الطلب الكبير على هذه المادة الحيوية جراء انتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية في الأعوام الأخيرة، وكذلك وجدها أن المؤسسة تتمتع بمركز مالي ممتاز وذلك راجع لتراكم الأرباح طوال سنوات الدراسة، وهذا يعكس الوضعية العامة التي توجد عليها هذه الشركة مما يؤهلها للتوسيع في النشاط وتغطية الطلب المطرد كما أشرنا، إلا أن فعالية ذلك يرتكز أساساً على التوقعات الدقيقة لحجم المبيعات، وفي هذا المجال فإن المؤسسة لا تعتمد على الطرق العلمية في إعدادها للتوقعات بحجم المبيعات، وإنما يقوم المسؤولون عن هذه التوقعات بإعدادها بناءً على الحدس والتتخمين عن طريق الخبرة في الميدان، مما قد يؤدي إلى توقعات سلبية حسب درجة التفاؤل والتباين للأشخاص المكلفين بالعملية، ولذا قمنا بإجراء التوقع بالمباعات في هذه المؤسسة بناءً على طرق علمية كمية تقوم على استخدام الأساليب الإحصائية والطرق الرياضية في تحليل المتغيرات وقياسها إنطلاقاً من المعطيات العددية والبيانات المتاحة لدى المنشأة، وُتُعرف هذه الطرق بـ "التوقع باستخدام السلسل الزمنية العشوائية لبووكس - جنكنز" بالإضافة إلى محاولة التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH (التي تأخذ في الحسبان عدم ثبات التباين، وهذا ما سوف نتعرض إليه بالتفصيل في الفصل الموالى .

الفصل الخامس : الدراسة التطبيقية

- « المبحث الأول : الدراسة الإحصائية للسلسلة الزمنية
- « المبحث الثاني : التوقع باستعمال النموذج الملائم للسلسلة الزمنية المعدلة (\hat{z}_t)
- « المبحث الثالث : نتائج التوقع بواسطة GARCH, ARCH

تمهيد :

سوف نحاول في هذا الفصل إجراء الدراسة التطبيقية لطريقة بوكس- جنكنز على منتج الإسمنت البني المنتج في شركة الإسمنت (SCHB) ، من خلال سلسلة زمنية تحوي مبيعات الشركة الشهرية من الإسمنت البني، وقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كما يلي :

المبحث الأول ؛ تناولنا فيه الدراسة الإحصائية للسلسلة الزمنية المدروسة، حيث قمنا بالكشف عن مركبات السلسلة الزمنية ، والغرض هو جعلها أكثر استقراراً، لأن هذه النماذج لا يمكن تطبيقها إلا على السلسلة الزمنية المستقرة .
أما في المبحث الثاني ؛ فقد قمنا بالتوقع بواسطة نماذج بوكس- جنكنز، لكن قبيل التوقع قمنا بالمرور بالراحل السابقة لمرحلة التوقع، إبتداءً بالتعريف بشكل النموذج ، تقدير معلماته، ثم تشخيص النموذج المناسب .
وفي المبحث الثالث والأخير قمنا بمحالة لإجراء التوقع بالبيانات بواسطة نماذج ARCH-GARCH، ولكن قبل التوقع قمنا باختبار عدم ثبات التباين عن طريق اختبار البوافي المربعة، وكذلك دالتي ACF و PACF للبوافي مربعة .

المبحث الأول : الدراسة الإحصائية للسلسلة الزمنية

سوف نقوم في هذا المقام بإجراء الدراسة الإحصائية للسلسلة الزمنية ، وهذا قصد معرفة خصائصها الجوهرية، والمتمثلة أساساً في الكشف عن مركبة الاتجاه العام (T_t) ، والمركبة الموسمية (S_t) ، وهذا قصد تعديلها إن وجدت هناك مركبات لهذه السلسلة .

١- السلسلة الزمنية محل الدراسة:

إن السلسلة الزمنية تتمثل في معطيات شهرية بالأطنان لمبيعات الإسمنت البني CPS-CEM II/A 42.5 الغير موضب (السائل) ^(٤) : شاحنة + قاطرة (fer + terre) بداية من شهر جانفي 1999 إلى غاية جوان 2006، أي أن هناك 90 مشاهدة، والجدول (٥-١) يوضح منحناها البياني .

٢- تحليل أولي :

خطوة أولى في تحويل هاته البيانات، فإننا أول ما نقوم به هو التوقع البياني لمشاهدات السلسلة الزمنية، وهي خطوة أساسية وهامة في التحليل لأنها تُظهر الملامح الوصفية للبيانات مثل الاتجاه العام ، والتغيرات الموسمية وعدم الاستقرار، والبيانات الشاذة إن كانت هذه موجودة ^(٢) .


٢-١- فحص البيانات :

سوف نقوم بفحص البيانات عن طريق الشكل التالي الذي يمثل التوقع البياني للبيانات الشهرية الخاصة بالمنتج محل الدراسة .

^(٤) لقد أخذنا الإسمنت الغير موضب (السائل) فقط وذلك لأهمية الكمية هذا النوع بالأطنان بالمقارنة مع الموضب في الأكياس .

^(٢) من الصعب ملاحظة البيانات الشاذة في السلسلة الزمنية ، وذلك نتيجة لاعتماد المشاهدات على بعضها البعض ، فمن الممكن ظهور القيم الشاذة في وسط السلسلة .

الشكل(٥-١): المنهج البياني للسلسلة الزمنية (y_t)



المصدر: مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 .

٢-٢- تعليلات على البيانات :

من التوقيع البياني للسلسلة الزمنية في الشكل(٥-١)، فإننا نلاحظ ما يلي:

(١) وجود إتجاه عام في البيانات ،

(٢) تباين السلسلة ليس تابعاً في الزمن ،

(٣) وجود قمم، ونطوءات قد تكون ناتجة عن وجود نمط موسمي .

فإذن، يكون من الضروري تثبيت التباين قبيل الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية، حيث توجد تحويلتان لأجل ذلك، وهما التحويلة اللوغاريتمية، وتحويلة الجذر التربيعي، إلا أنه يُفضل إجراء تحويلة الجذر التربيعي على الأخرى، ذلك لأن التباين يكون أكثر ثباتاً في حالة تحويلة الجذر التربيعي ^(٤) .

^(٤) انظر في الصفحة رقم: ١١٣ من الفصل الثاني .

جدول (5-2): المتوسط الحسابي ، والإنحراف المعياري لسلسلة المبيعات الخام (y_t)

$\sigma^2(y_t)$	$\sigma(y_t)$	$E(y_t)$	السنوات
289745173	17021.9	36950.97	1999
294623232	17164.59	43988.53	2000
116874671	10810.86	44026.81	2001
297658613	17252.79	36735.9	2002
250661350	15832.29	40889.28	2003
232022721	15232.29	38697.85	2004
198581975	14091.91	45487.49	2005
207031561	14388.591	49321.13	2006

المصدر: تم إعداد هذا الجدول من طرقنا اعتماداً على Microsoft Excel 2003


و بالنظر إلى الجدول (5-2) يتضح ما يلي :

- تباين السلسلة الزمنية غير متناسب مع متوسط السلسلة ،
- مستوى متوسط السلسلة الزمنية يتزايد بمعدل ثابت .

ومن ثم نقوم بتحويل قيم السلسلة الزمنية باستعمال تحويلة الجذر التربيعي ، حيث: $z_t = \sqrt{y_t}$ ، وفيما يلي الجدول (3-5) الممثل لمعطيات السلسلة الزمنية المعدلة (z_t) .

والشكل المولاي يوضح المنحنى البياني الممثل للسلسلة الزمنية العدالة أي (\hat{z}_t) كما يلي:

شكل (٥-٢) المنحنى البياني للسلسلة الزمنية العدالة (\hat{z}_t):



المصدر: مترجمات البرمجية . E-VIEWS VER 2.0

حيث نلاحظ بعضاً من التخفيف في التذبذبات بالمقارنة مع الشكل (٥-١) الممثل للمعطيات الخام بالجدول (٥-١).

٣- الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية:

كما نعلم فإن هناك العديد من الاختبارات المستعملة في الكشف عن المركبات التي تتمتع بها السلسلة الزمنية كالتالي:

٤-١- الكشف عن مركبة الإتجاه العام (T_t):

من أجل الكشف عن مركبة الإتجاه العام (T_t) ، فإننا نستخدم اختبار دانيال (Daniel) ، وهو معطى كما يلي^(١) :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{t=1}^T d_t^2}{T(T^2 - 1)}$$

تحت الفرض العدمي التالي : H_0 : لا يوجد إتجاه عام في المعطيات ،

و الفرض البديل H_1 : يوجد إتجاه عام .

^(١) انظر في الصفحة رقم: ٣٧ من الفصل الأول .

حيث تمثل (I_t) الترتيب التصاعدي للسلسلة الزمنية المحولة (z) ، t الترتيب الزمني، والجدول (4-5) التالي يلخص اختبار $(Daniel)$ ، حيث تشير (I_t) إلى الترتيب التصاعدي للسلسلة الزمنية المحولة (z) ، t تشير إلى الترتيب الزمني .

جدول (4-5): الترتيب الزمني التصاعدي للسلسلة الزمنية المحولة (z) :

2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999	
I_t	t														
18	85	26	73	8	61	15	49	54	37	43	25	24	13	9	1
51	86	12	74	3	62	4	50	11	38	73	26	Ω1	14	6	2
81	87	20	75	70	63	30	51	46	39	22	27	14	15	2	3
58	88	65	76	52	64	74	52	80	40	27	28	62	16	79	4
90	89	87	77	61	65	17	53	5	41	82	29	71	17	76	5
36	90	78	78	66	66	85	54	13	42	47	30	50	18	34	6
	60	79	72	67	69	55	86	43	41	31	40	19	53	7	
	16	80	35	68	75	56	23	44	10	32	42	20	45	8	
	55	81	37	69	67	57	32	45	29	33	77	21	49	9	
	88	82	39	70	68	58	44	46	84	34	83	22	28	10	
	64	83	19	71	33	59	63	47	57	35	89	23	48	11	
	59	84	25	72	21	60	7	48	56	36	38	24	31	12	

المصدر: تم إعداد هذا الجدول من طريقنا اعتماداً على خطوات اختبار دانيال الذي تطرقنا إليه في الجزء النظري .

وبمأن عدد المشاهدات $n > 30$ ، فإن :

$$V(R) = \frac{1}{n-1} \quad ; \quad E(R) = 0 \quad ; \quad Z = \frac{R - E(R)}{\sqrt{V(R)}} \sim N(0, 1)$$

$$\text{حيث أن : } r_s = 0.1346 \quad ; \quad \text{ومن ثم فإن : } \sum (I_t - t)^2 = 105136$$

إذن فإن :

$$Z = \frac{0.1346}{\sqrt{\frac{1}{90-1}}} = 0.1346 \times 9.434 = 1.2698$$

و عند مستوى المعنوية $\alpha = 5\%$ ، فإن: $Z_C < Z_T$ ، أي أن $Z = 1.1698 < 1.96$ ، حيث أن: $Z_T = 1.96$

الشيء الذي يدفعنا إلى قبول الفرض العدلي H_0 ، وبالتالي فإن السلسلة الزمنية لا تحتوي على مركبة الإتجاه العام .

^Ω حيث أن الثنائية (14) تعني أن المشاهدة رقم 14 تحتل الرتبة الأولى حسب الترتيب التصاعدي.

^(*) انظر الملحق [9] .

3-2- الكشف على المركبة الموسمية (S_t):

سوف نقوم الآن بالكشف عن المركبة الموسمية (S_t) ، وذلك بدراسة إشارات الفروقات من الدرجة الأولى للمعطيات الشهرية السابقة⁽¹⁾ ، والتي تمثل معطيات السلسلة الزمنية المعدلة (z_t) ، فتكون النتائج كما يلي :

جدول (5-5): جدول الإشارة للفروقات من الدرجة الأولى للسلسلة الزمنية المعدلة (z_t)

السنوات							الأشهر
2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	
+	-	+	-	+	-	/	جانفي
-	-	-	-	+	-	-	فيفري
+	+	+	+	-	+	-	مارس
+	-	+	+	+	+	+	أبريل
+	+	-	-	+	+	-	ماي
-	+	+	+	-	-	-	يونان
-	+	-	+	-	-	+	جويلية
-	-	+	-	-	+	-	أوت
+	+	-	+	+	+	+	سبتمبر
+	+	+	+	+	+	-	أكتوبر
-	-	-	+	-	+	+	نوفمبر
-	+	-	-	-	-	-	ديسمبر

المصدر: تم إعداد هذا الجدول من طرقنا اعتماداً على الجدول (3-5).

حيث نلاحظ من هذا الجدول عدم انتظام الإشارات الخاصة بهذه الفروقات في بداية كل سنة خاصة ، فإذا كانت (-) في شهر جانفي من سنة 2000 ، ف تكون في السنة الموالية 2001 موجبة ، وهكذا ...

إذن نستنتج عدم وجود المركبة الموسمية ، وهذا ما سوف نؤكده في العنصر الموالي عند محاولة التعرف على درجة (رتبة) النموذج من خلال رسم دالة الإرتباط الذاتي (ACF) ودالة الإرتباط الذاتي الجزئي⁽²⁾ (PACF) ، وهو ما يسمى بالاختبارات غير الحرة⁽³⁾ .

و في الأخير نشير إلى أن الهدف من تعديل السلسلة الزمنية ليس تجاهل خصائصها الجوهرية، وإنما الهدف هو تحقيق استقرارها ، والذي يعتبر شرط أساس لتطبيق طريقة بوكس-جنكنز ، حيث لا يمكننا بدونه اختيار النموذج الملائم للسلسلة الزمنية المدروسة ، وفي البحث الموالي ، فإننا سوف نتأكد من استقرارية السلسلة الزمنية المعدلة (z_t) ، وذلك باستعمال دالة الإرتباط الذاتي (ACF) ، دالة الإرتباط الذاتي الجزئية (PACF) ، وشكلاهما البياني .

⁽¹⁾ انظر في الصفحة رقم : 38 من الفصل الأول للتعرف على هذا الإختبار .

⁽²⁾ حيث أنه في حالة التأثير الشهري تكون بطيئة التخادم عند الفجوة الزمنية $Lags$ 12، 24، 36، ... وهكذا .

⁽³⁾ انظر في الصفحة رقم: 41 من الفصل الأول .

فإذا اعتبرنا أن السلسلة الزمنية كإشارة صوتية (Signal de Son) مشوهة، هذه الأخيرة تتطلب لسماعها وفهمها إستبعاد التشويش غير المرغوب فيه وذلك بمزورها عبر عدة مرشحات مختلفة الشدة والدور (Filtres Electroniques) لتكون مسموعة عبر جهاز استقبال، نفس الشيء ينطبق على السلسلة الزمنية حيث يجب تنقيتها بعدة مرشحات لإزالة الموسمية والإتجاه العام والحصول على سلسلة نقية تشكل تشويشاً أبيضاً⁽¹⁾.

المبحث الثاني: التوقع باستعمال بوكس-جنكنز والمقارنة مع المسم الأسي

يمكننا الآن تطبيق مراحل طريقة بوكس-جنكنز، وهذا بعد أن قمنا بتعديل السلسلة الزمنية الأصلية (y_t) ليصبح رمزاً (z_t)، حيث في البداية سوف نتأكد من استقرارية السلسلة الزمنية (z_t)، وكذلك التعرف على النماذج الممكنة، وهذا باستعمال كما ذكرنا آنفاً دالة الإرتباط الذاتي (ACF)، دالة الإرتباط الذاتي الجزئية (PACF)، وشكلهما البياني بعدها تقوم بتقدير هذه النماذج، وكذلك إجراء مختلف الإختبارات التي تطرقنا لها في الجانب النظري لتشخيص النموذج الملائم، وفي الأخير تقوم بمقارنة النماذج المقبولة من أجل اختيار النموذج الأمثل الذي يتلاءم مع السلسلة الزمنية المعدلة (z_t). وسوف نعتمد في إجراء الحسابات على برمجية من البرمجيات الجاهزة المتخصصة المسماة:


E-Views ver 2.0 ، Econometric-Views ver 2.0⁽²⁾.

1 - مرحلة التعرف (Identification) :

في هذه المرحلة سنتأكد من استقرارية السلسلة الزمنية المعدلة (z_t)، وكذلك نتعرف على النماذج الممكنة لهذه السلسلة وذلك باستخدام الدالة (ACF) ورسمها البياني (Correlogram)، وكذلك تمثيل الدالة (PACF) ورسمها البياني والذى هو (Partial Correlogram) في الشكل (3-5) المولى .

⁽¹⁾ من المرجع [إ.بختي-06]، ص.7.

⁽²⁾ هناك الكثير من البرامج الجاهزة التي تستعمل في القياس في القياس الاقتصادي ذكر منها : BETAHAT ، B34S ، AutoBox ، AREMOS ، TSP ، STATA ، RATS ، MODLER BLUE ، FP ، MicroFit ، NLOGIT ، Modeeasy + ، EasyReg [C.G.RENFRO-03] ، WinSolve ، وللمزيد من التفصيل أنظر في المرجع :



الشكل (5-3): الرسم البياني للدالتيين (ACF) و (PACF).

المصدر: مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

١-١- الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية المعدلة (\hat{z}_t) :

للكشف عما إذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة ، نستخدم الرسم البياني لـ (ACF) ، حيث من المفترض أن تتناقص معاملات هذه الدالة بصورة سريعة ، وتنعدم قبيل الفجوة الزمنية K الموافقة لربع المشاهدات أي أن: $K = \frac{N}{16}$.^(١) وبالنظر إلى الرسم البياني للسلسلة الزمنية (\hat{z}_t) في الشكل(٥-٣)، فنلاحظ أن (ACF) تتناقص بسرعة، وهي بداخل مجال الثقة الذي يساوي: $[-\frac{2}{\sqrt{T}}, +\frac{2}{\sqrt{T}}]$ ، أي $[-0.211, +0.211]$ ، وهذا بعد الفجوة الزمنية المساوية لـ :

$$K = \frac{N}{4} = 22.5$$

١-٢- التعرف على النماذج الممكنة :

بالإعتماد على (Correlogram) (الممثلين في الشكل (٥-٣) السابق، وبناءً على ما تقدم في الفصل الثاني في كيفية تحديد النماذج، وبالتدقيق في معاملات (ACF) $_{\hat{\theta}_q}$ ، وفي معاملات (PACF) $_{\hat{\theta}_p}$ وكل قيمة $L_{\hat{\theta}_q}$ و $L_{\hat{\theta}_p}$ تقع خارج مجال ثقتها $[-0.211, +0.211]$ ، أو القريبة منه والتي يجبأخذها بعين الإعتبار أثناء تشكيل النموذج، فقييم $_{\hat{\theta}_q}$ مت Dell على النموذج AR(p) ، وعلى هذا الأساس يمكننا اقتراح النماذجين التاليين :

- النموذج الأول ، ARMA(0,16)
- النموذج الثاني ARMA(15,0)

٢- مرحلة التقدير واختبار النموذج (Estimation and diagnostic checking) :

بعدما تحصلنا على النماذج الممكنة السابقة الذكر، نقوم الآن بتقدير معلمات النموذج، ثم اختبار معنوية هذه المعلمات باستعمال الإحصائية(t-Statistic)، والتي نقارنها مع القيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي المعياري عند مستوى معنوية إحصائية يساوي ٥٪.

٢-١- التقدير(Estimation): فيما يلي تقديرات النماذج المتحصل عليها سالفاً ، وسوف نبدأ بالنموذج الأول .

٢-١-١- النموذج الأول ARMA(0,16) :

بالنظر إلى الشكل (٥-٣)، فإننا نلاحظ أن قيمة الدالة (ACF) عند الفجوة الأولى تقع خارج مجال الثقة وكذلك عند الفجوة ١١، ١٢، ١٥، ١٦ أما عند الفجوة الزمنية ١٦ فهي قريبة من مجال الثقة، وبالتالي نقترح النموذج التالي :

$$y_t = c + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_{11} \epsilon_{t-11} + \theta_{12} \epsilon_{t-12} + \theta_{15} \epsilon_{t-15} + \theta_{16} \epsilon_{t-16}$$

حيث تشير c إلى الحد الثابت .

^(١) انظر في الصفحة رقم : ٧٠ من الفصل الثاني .

و سوف نستخدم الأمر التالي :

- Estimation Command :

=====

LS SALES2 MA(1) MA(11) MA(12) MA(15) MA(16) C

فتكون المخرجات كما يلي :

جدول (٥-٦): تقييم واختبار معنوية النموذج ARMA(0,16)

LS // Dependent Variable is SALES2				
Date: 03/15/07 Time: 18:36				
Sample: 1999:01 2006:06				
Included observations: 90				
Convergence achieved after 100 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	199.0402	5.281461	37.68659	0.0000
MA(1)	0.218159	0.094867	2.299639	0.0239
MA(11)	0.215755	0.075496	2.857851	0.0054
MA(12)	0.341835	0.077728	4.397836	0.0000
MA(15)	-0.313511	0.082731	-3.789514	0.0003
MA(16)	-0.230073	0.085182	-2.700950	0.0084
R-squared	0.353522	Mean dependent var	197.9781	
Adjusted R-squared	0.315042	S.D. dependent var	48.53675	
S.E. of regression	40.17008	Akaike info criterion	7.450586	
Sum squared resid	135545.4	Schwarz criterion	7.617239	
Log likelihood	-456.9808	F-statistic	9.186982	
Durbin-Watson stat	2.007194	Prob(F-statistic)	0.000001	
Inverted MA Roots	.90+.34i .67 -.73i -.07 -.87i -.73 -.61i	.90 -.34i .27 -.92i -.39 -.85i -.73+.61i	.89 .27+.92i -.39+.85i -.89 -.22i	.67+.73i -.07+.87i -.63 -.89+.22i

المصدر: مدرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

و بالنظر إلى الإنحراف المعياري للمعلمات: c , $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_{12}$, $\hat{\theta}_{15}$, $\hat{\theta}_{16}$ ومن ثم إحصائية (t-Statistic)، نقول أن هذه المعلمات كلها معنوية إحصائيا، ذلك لأن القيمة المطلقة لها أكبر بالقيمة المطلقة من القيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي التي تساوي القيمة ^(٤) 1.96، أي أن :

^(٤) يتوزع مستوى المعنوية $\alpha = 5\%$ على طرفي التوزيع الطبيعي المعياري بواقع 2.5% على الطرفين الأيمن والأيسر، وهذا على اعتبار أن حجم العينة أكبر من 30 وحدة ، وهذا دائماً متحقق عند تحليل السلسلة الزمنية (في حالتنا لدينا $N=90$)، انظر التوزيع الطبيعي المعياري "Z Distribution" في الملحق [9].

$$\begin{aligned} & |37.68659| > 1.96 \\ & |2.299639| > 1.96 \\ & |2.857851| > 1.96 \\ & |4.397836| > 1.96 \\ & |-3.789514| > 1.96 \\ & |-2.700950| > 1.96 \end{aligned}$$

ومن ثم فإن نموذج المتوسطات المتحركة الأمثل هو كما يلي :

$$z_t = 199.0098 + 0.218159\epsilon_{t-1} + 0.215755\epsilon_{t-11} + 0.341835\epsilon_{t-12} - 0.313511\epsilon_{t-15} - 0.230073\epsilon_{t-16} + \epsilon_t \dots \dots \dots \quad (1)$$

٢-١-٢- النموذج الثاني : ARMA(15 , 0)

بالنظر إلى الرسم البياني للدالة (PACF) في الشكل (٥-٣) نلاحظ أن القيم $\hat{\phi}_{11}, \hat{\phi}_{12}, \hat{\phi}_{15}$ تقع خارج مجال الثقة [-0.211, +0.211] ، أما القيمة $\hat{\phi}_{12}$ فهي قريبة من مجال الثقة السابق .

وانطلاقاً ممّ سبق نقترح نموذج الإنحدار الذاتي الآتي :

$$z_t = c + \hat{\phi}_1 z_{t-1} + \hat{\phi}_{11} z_{t-11} + \hat{\phi}_{12} z_{t-12} + \hat{\phi}_{15} z_{t-15} + \epsilon_t$$

وبإجراء عملية التقدير لهذا النموذج نتحصل على النتائج التي يلخصها الجدول (٥-٧) المواري ، وسوف نستخدم الأمر التالي :

- Estimation Command :

=====

LS SALES2 AR(1) AR(11) AR(12) AR(15) C

جدول (5-7): تقدير واختبار معنوية معالم النموذج: ARMA(15,0)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	202.0194	6.261420	32.26415	0.0000
AR(1)	0.207185	0.106302	1.949026	0.0553
AR(11)	0.032202	0.104549	0.308009	0.7590
AR(12)	0.248860	0.103923	2.394662	0.0193
AR(15)	-0.223104	0.091599	-2.435643	0.0174
R-squared	0.210751	Mean dependent var	203.2704	
Adjusted R-squared	0.165651	S.D. dependent var	42.65886	
S.E. of regression	38.96576	Akaike info criterion	7.389707	
Sum squared resid	106283.1	Schwarz criterion	7.544206	
Log likelihood	-378.5344	F-statistic	4.672974	
Durbin-Watson stat	1.983941	Prob(F-statistic)	0.002116	
Inverted AR Roots	.86 -.12i .49 -.82i -.29+.81i -.82+.41i	.86+.12i .49+.82i -.29-.81i -.82-.41i	.79 -.51i .07 -.92i -.54 -.67i -.93	.79+.51i .07+.92i -.54+.67i

المصدر: مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

بالنظر إلى الإنحراف المعياري للمعلمات: c , $\hat{\phi}_{11}$, $\hat{\phi}_{12}$, $\hat{\phi}_{15}$, ومن ثم إحصائية (t-Statistic)، نقول أن هاته المعلمات معنوية إحصائياً ذلك أن القيمة المطلقة لها على التوالي أكبر من القيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي التي تساوي القيمة (1.96)

كما يلي:

$$|32.26415| > 1.96$$

$$|2.394662| > 1.96$$

$$|-2.435643| > 1.96$$

أما الحدين الآخرين وهما: $\hat{\phi}_{11}$, $\hat{\phi}_{12}$ فيعتبران غير معنويين إحصائياً ذلك أن إحصائية (t-Statistic) لهما أقل من الجدولية كما يلي:

$$|1.949026| < 1.96$$

$$|0.308009| < 1.96$$

ومن أجل تحسين النموذج نقوم بحذف الحدود الغير معنوية السابقة $\hat{\phi}_{11}$, $\hat{\phi}_{12}$ من النموذج ، فنتحصل على نتائج تقدير جديدة نلخصها في الجدول الموالي، ونورد أولاً الأمر المستخدم كما يلي :

- **Estimation Command :**

LS SALES2 AR(12) AR(15) C

جدول (٥-٨) تقدير واختبار معنوية معالم نموذج الانحدار الذاتي الأمثل : ARMA(15,0)

LS // Dependent Variable is SALES2				
Date: 03/15/07 Time: 20:44				
Sample(adjusted): 2000:04 2006:06				
Included observations: 75 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 3 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	202.1521	4.947031	40.86333	0.0000
AR(12)	0.283414	0.100617	2.816755	0.0063
AR(15)	-0.222623	0.091747	-2.426487	0.0178
R-squared	0.167082	Mean dependent var	203.2704	
Adjusted R-squared	0.143945	S.D. dependent var	42.65886	
S.E. of regression	39.46936	Akaike info criterion	7.390228	
Sum squared resid	112163.8	Schwarz criterion	7.482927	
Log likelihood	-380.5539	F-statistic	7.221522	
Durbin-Watson stat	1.593507	Prob(F-statistic)	0.001386	
Inverted AR Roots	.85 -.13i .48 -.82i -.31 -.80i -.83 -.42i	.85+.13i .48+.82i -.31+.80i -.83+.42i	.78 -.51i .05+.93i -.53+.67i -.95	.78+.51i .05 -.93i -.53 -.67i

. E-VIEWS VER 2.0 البرمجية مخرجات المقدمة

نلاحظ من الجدول (٥-٨) الأخير أن المعلمات c ، \hat{c}_{12} ، \hat{c}_{15} معنوية إحصائياً، وذلك بالنظر إلى إحصائية (t-Statistic).

على التوالي أكبر من القيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي المعياري المساوية لـ (1.96) كما يلي:

• $|40.86333| > 1.96$

• $|2.816755| > 1.96$

$.|-2.426487| > 1.96$

ومنه فإن نموذج الإنحدار الذاتي الأمثل فيكتب من الشكل التالي :

$$z_t = 202.1521 + 0.283414z_{t-12} - 0.222623z_{t-15} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (2)$$

٢-٢- التشخيص (Diagnostic Checking) :

بعد اختبارنا لمعنى معالم النموذج، نقوم الآن بتحليل الباقي من أجل التأكد من أنها تشكل صدمات عشوائية، حيث تقوم بحساب قيم الدالة (ACF) للباقي، بعدها نقوم بإجراء اختبار وهو Q_{LB} —*Box* (Q_{LB}) للباقي^(٤).

٢-٢-١- تشخيص نموذج المتوسطات المتحركة الأمثل (ARMA(0,16)) :

إن نموذج المتوسطات المتحركة الأمثل الذي تحصلنا عليه هو كالتالي :

$$z_t = 199.0098 + 0.218159\epsilon_{t-1} + 0.215755\epsilon_{t-11} + 0.341835\epsilon_{t-12} \\ - 0.313511\epsilon_{t-15} - 0.230073\epsilon_{t-16} + \epsilon_t \dots \dots \dots \quad (1)$$

ويمكن صياغة هذا النموذج باستعمال مشغل الإزاحة إلى الخلف كما يلي :

$$z_t = 199.0098 + (1 + 0.218159B^1 + 0.215755B^{11} + 0.341835B^{12} \\ - 0.313511B^{15} - 0.230073B^{16})\epsilon_t$$

والجدول (٩-٥) المواري يلخص لنا اختبار Q_{LB} —*Box* (Q_{LB}) للباقي.

جدول (٩-٥): اختبار Q_{LB} —*Box* للباقي لنموذج ARMA(0,16).

$(Q_{LB})Ljung-Box$	M	K	$\chi^2_{90\%}(M-K)$
25.334	36	6	40.256

المصدر: أنظر مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 ، الملحق [٤].

نلحظ من الجدول (٩-٥) أن إحصائية Q_{LB} —*Box* (Q_{LB}) تساوي 25.423، ومن جدول كاي—تربيع^(٤) $\chi^2_{90\%}(M-K) = 40.256$ هي $\alpha = 10\%$ حيث هنا :

$$Q < \chi^2_{90\%}(30) \quad K = 6, M = 36 \quad \text{حيث نلاحظ أن :}$$

ومن ثم، وبناءً على اختبار Q_{LB} —*Box* (Q_{LB})، يمكننا القول أن بباقي النموذج تُشكّل صدمات عشوائية، وكذلك وبالنظر إلى الدالة (ACF) للباقي فإنها محصورة داخل مجال الثقة $[-\sqrt{\frac{2}{T}}, \sqrt{\frac{2}{T}}]$ ، أي $[-0.211, +0.211]$ ، وبالتالي فإن بباقي النموذج ARMA(0,16) تشكل صدمات عشوائية (أنظر الملحق [٤] في قسم الملاحق).

٢-٢-٢- تشخيص نموذج الإنحدار الذاتي الأمثل (ARMA(15,0)) :

إن نموذج الإنحدار الذاتي الأمثل الذي تحصلنا عليه هو :

$$z_t = 202.1521 + 0.283414z_{t-12} - 0.222623z_{t-15} + \epsilon_t \dots \dots \dots \quad (2)$$

ويمكن صياغة هذا النموذج باستعمال مشغل الإزاحة إلى الخلف (التأخير) (*B:Backwards*) كما يلي :

$$z_t(1 - 202.1521 - 0.283414B^{12} + 0.222623B^{15}) = \epsilon_t$$

والجدول المواري يلخص لنا اختبار Q_{LB} —*Box* (Q_{LB}) للباقي.

^(٤) يرمز له Q_{LB} —*Box* (Q_{LB}) في البرمجية E-VIEWS VER 2.0 بـ $Q - Stat$ كما تلاحظ في مخرجات البرمجية.

^(٥) أنظر الملحق [١٠] في قسم الملاحق.

جدول (٥-١٠): اختبار (Q_{LB}) لـ $Ljung-Box$: ARMA(15,0)

$(Q_{LB})Ljung-Box$	M	K	$\chi^2_{90\%}(M-K)$
33.492	33	3	40.256

المصدر: أنظر مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 . الملحق [٥].

نلاحظ من الجدول (٥-١٠) أن إحصائية $(Q_{LB})Ljung-Box$ تساوي 33.523 ، ومن جدول كاي-تربيع (χ^2) نجد أن القيمة الجدولية عند مستوى $\alpha = 10\%$ هي $\chi^2_{90\%}(M-K) = 40.256$ ، حيث هنا $M = 33$ ، $K = 3$ ، حيث نجد أن : $Q < \chi^2_{90\%}(30)$.

وبناءً على اختبار $Ljung-Box$ يمكننا القول أن بواقي النموذج تُشكّل صدمات عشوائية. وبالنظر إلى الملحقة [٥]، نلاحظ أن دالة (ACF) عند الفجوة الزمنية الأولى والتاسعة قريبة من مجال الثقة [-0.211, +0.211] ، وهذا يدل على وجود نموذج للمتوسطات المتحركة من الدرجتين الأولى والتاسعة أي (1)MA(9) و MA(1) بالإضافة إلى نموذج الإنحدار الذاتي السابق ، ومنه يمكننا اقتراح النماذجين المختلطين التاليين :

• **النموذج المختلط الأول (النموذج الثالث) : ARMA(15,1)**

$$z_t = c + \phi_{12}z_{t-12} + \phi_{15}z_{t-15} - \theta_1\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

• **النموذج المختلط الثاني (النموذج الرابع) : ARMA(15,9)**

$$z_t = c + \phi_{12}z_{t-12} + \phi_{15}z_{t-15} - \theta_1\varepsilon_{t-1} - \theta_9\varepsilon_{t-9} + \varepsilon_t$$

٢-٣-٢-٢- تقدير وتشخيص النموذج المختلط الأول : ARMA(15,1)

٢-٣-٢-١- التقدير :

نببدأ أولاً بتقدير النموذج المختلط الأول من الشكل ARMA(15,1) ، وباستعمال البرمجية E-VIEWS VER 2.0 ، وذلك باستخدام الأمر التالي :

- Estimation Command :

=====

LS SALES2 AR(12) AR(15) MA(1) C

فتكون المخرجات مماثلة في الجدول الموالي :

جدول (١١-٥): تقدير واختبار معنوية معالم النموذج المختلط الأول : ARMA(15,1)

LS // Dependent Variable is SALES2				
Date: 03/15/07 Time: 21:16				
Sample(adjusted): 2000:04 2006:06				
Included observations: 75 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 6 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	201.9890	5.957548	33.90472	0.0000
AR(12)	0.269314	0.103093	2.612341	0.0110
AR(15)	-0.224307	0.094581	-2.371585	0.0204
MA(1)	0.258095	0.116359	2.218079	0.0297
R-squared	0.208085	Mean dependent var	203.2704	
Adjusted R-squared	0.174624	S.D. dependent var	42.65886	
S.E. of regression	38.75567	Akaike info criterion	7.366412	
Sum squared resid	106642.1	Schwarz criterion	7.490012	
Log likelihood	-378.6609	F-statistic	6.218702	
Durbin-Watson stat	2.048976	Prob(F-statistic)	0.000823	
Inverted AR Roots	.85 -.13i .47+.82i -.31 -.80i -.83+.42i	.85+.13i .47 -.82i -.31+.80i -.83-.42i	.78+.51i .06+.93i -.54+.67i -.95	.78 -.51i .06 -.93i -.54 -.67i
Inverted MA Roots		-.26		

المصدر: مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

نلاحظ من الجدول (١١-٥) أن كل المعلمات الخاصة بهذا النموذج معنوية، وذلك بالنظر إلى الإحصائية (t-Statistic)

عند مستوى معنوية إحصائية ٥٪ فهي أكبر من القيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي المساوية لـ: (1.96) كما يلي :

$$\begin{aligned} & |33.90472| > 1.96 \\ & |2.612341| > 1.96 \\ & |-2.371585| > 1.96 \\ & |2.218079| > 1.96 \end{aligned}$$

ومنه فإن النموذج المختلط الأول يكون كما يلي :

$$z_t = 201.9890 + 0.269314z_{t-12} - 0.224307z_{t-15} + 0.258095\epsilon_{t-1} + \epsilon_t \dots \dots \dots (3)$$

٢-٣-٢-٢- تشفير النموذج الثالث :

إن النموذج (٣) الأمثل الذي تحصلنا عليه يمكن إعادة صياغته باستعمال مشغل الإزاحة فيُصبح كما يلي :

$$z_t (1 - 0.269314 B^{12} z_t + 0.224307 B^{15} z_t) = 201.962$$

$$+ \varepsilon_t (1 + 0.258095 B^1)$$

: $(Q_{LB})Ljung-Box$

: ARMA(15,1) للبواقي $(Q_{LB})Ljung-Box$

$(Q_{LB})Ljung-Box$	M	K	$\chi^2_{90\%}(M-K)$
36.506	34	4	40.256


المصدر: أنظر مدرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 ، الملحق [٦].

نلاحظ من الجدول (٥-١٢) الأخير أن إحصائية $(Q_{LB})Ljung-Box$ تساوي 36.506، ومن جدول كاي-تربيع

نجد أن القيمة الجدولية عند مستوى معنوية $10\% = \alpha = 40.256$ هي: $\chi^2_{90\%}(M-K) = 40.256$ ، حيث هنا $Q < \chi^2_{90\%}(30)$ ، حيث نجد أن : $Q = 34$ ، $K = 4$ ، $M = 34$

وبناءً على اختبار $(Q_{LB})Ljung-Box$ يمكننا القول أن بواقي النموذج تُشكّل صدمات عشوائية .

وبالنظر دائمًا إلى الملحق [٦] في قسم الملحق ، أن أنماط الترابط الذاتي والترابط الذاتي الجزئي للبواقي تتبع أنماط متسلسلة الضجة البيضاء . كما نقوم فيما يلي برسم المربع التكراري للبواقي الخاصة بالنماذج : ARMA(15,1) .



الشكل (٤-٥): المربع التكراري لبواقي النموذج ARMA(15,1).

المصدر: مدرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

نلاحظ من المربع التكراري لبواقي النموذج ARMA(15,1) أنه متناظرو له شكل التوزيع الطبيعي تقريبًا .

٤-٢-٤-٢-تقدير وتشخيص النموذج المختلط الثاني : ARMA(15,9)

كما فعلنا سابقاً، نبدأ أولاً بالتقدير ثم تشخيص النموذج المقدر باستخدام اختبار $Ljung-Box$ (Q_{LB}) للباقي .

٤-٢-٤-١-التقدير :

وباستعمال دائما البرمجية E-VIEWS VER 2.0 ، فنتحصل على نتائج تقدير النموذج المختلط الثاني ARMA(15,9) ، والملخصة في الجدول (٥-١٣) المولى كما يلي ، وهذا باستعمال الأمر التالي :

- Estimation Command :

=====

LS SALES2 AR(12) AR(15) MA(1) MA(9) C

جدول (٥-١٣): تقدير واختبار معنوية معالم النموذج المختلط الثاني :

LS // Dependent Variable is SALES2				
Date: 03/15/07 Time: 21:58				
Sample(adjusted): 2000:04 2006:06				
Included observations: 75 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 7 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	201.9046	6.585500	30.65897	0.0000
AR(12)	0.219640	0.099971	2.197038	0.0313
AR(15)	-0.265565	0.094140	-2.820957	0.0062
MA(1)	0.323515	0.111796	2.893801	0.0051
MA(9)	0.260787	0.116035	2.247483	0.0278
R-squared	0.257594	Mean dependent var	203.2704	
Adjusted R-squared	0.215171	S.D. dependent var	42.65886	
S.E. of regression	37.79174	Akaike info criterion	7.328522	
Sum squared resid	99975.11	Schwarz criterion	7.483021	
Log likelihood	-376.2400	F-statistic	6.072001	
Durbin-Watson stat	2.053662	Prob(F-statistic)	0.000297	
Inverted AR Roots	.87 -.15i .47+.82i -.30+.83i -.84 -.41i	.87+.15i .47 -.82i -.30 -.83i -.84+.41i	.77 -.52i .07+.93i -.57+.68i -.95	.77+.52i .07 -.93i -.57 -.68i
Inverted MA Roots	.78+.29i -.19 -.84i	.78 -.29i -.19+.84i	.40 -.74i -.70 -.55i	.40+.74i -.70+.55i
				-.90

المصدر: مفرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 .

نلاحظ من الجدول (٥-١٣) أن كل المعلومات الخاصة بهذا النموذج معنوية، وذلك بالنظر إلى الإحصائية (t-Statistic) عند مستوى معنوية إحصائية ٥% كما يلي :

$$\begin{aligned} & , |30.65897| > 1.96 \\ & , |2.197038| > 1.96 \\ & , |-2.820957| > 1.96 \\ & , |2.893801| > 1.96 \\ & . |2.247483| > 1.96 \end{aligned}$$

ومنه فإن النموذج المختلط يكون كما يلي :

$$\begin{aligned} z_t = & 201.9046 + 0.219640 z_{t-12} - 0.265565 z_{t-15} \\ & + 0.323515 \varepsilon_{t-1} + 0.260787 \varepsilon_{t-9} + \varepsilon_t \dots \dots \dots \quad (4) \end{aligned}$$

٤-٢-٢-٢- تشفير النموذج المختلط الثاني ARMA(15,9) :

إن النموذج (4) الذي تحصلنا عليه يمكن إعادة صياغته باستعمال مشغل الإزاحة، فيصبح على الشكل التالي:

$$\begin{aligned} z_t (1 - 0.219640 B^{12} + 0.265565 B^{15}) = & 201.9046 + \varepsilon_t (1 + 0.323515 B^1 \\ & + 0.260787 B^9) \end{aligned}$$

والجدول (٥-١٤) الموالي يوضح لنا اختبار $Ljung-Box$:

جدول (٥-١٤): اختبار $Ljung-Box$ للباقي للنموذج : ARMA(15,9)

$(Q_{LB})Ljung-Box$	M	K	$\chi^2_{90\%}(M-K)$
29.577	35	5	40.256

المصدر: أنظر مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 ، الملحق [٧].


نلاحظ من الجدول (٥-١٤) أن إحصائية $(Q_{LB})Ljung-Box$ تساوي 29.577، ومن جدول كاي-تربيع نجد أن القيمة الجدولية عند مستوى معنوية $10\% = \chi^2_{90\%}(M-K) = 40.256$ هي: $K = 5$ ، $M = 35$ ، حيث هنا

حيث نجد أن: $Q < \chi^2_{90\%}(30)$

وبناءً على اختبار $Ljung-Box$ (Q_{LB}) يمكننا القول أن بواقي النموذج تُشكّل صدمات عشوائية.

كما نلاحظ وبالنظر إلى الملحق [٧] في قسم الملحق ، أن أنماط الترابط الذاتي والترابط الذاتي الجزئي للبواقي تتبع أنماط متسلسلة الضجة البيضاء .

كما نقوم فيما يلي برسم المربع التكراري للبواقي الخاصة بالنماذج ARMA(15,9)



.الشكل(٥):المعلم التكراري لبواقي النموذج ARMA(15,9)

المصدر: مدرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 .

حيث نلاحظ أنه متناظرو له شكل التوزيع الطبيعي تقريباً .

٢-٢-٥- المقارنة بين النماذج:

نقوم باختيار النموذج الأنسب بين النماذج المقترحة، وذلك باستعمال المعايير التالية ، حيث يكون على أساس أصغر قيمة

لكل معيار ^(٤) :

$$\bullet DW\ Stat = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

$$\bullet AIC = \log \hat{\sigma}^2 + \left\{ 2 \left(\frac{p+q}{T} \right) \right\}$$

$$\bullet NAIC = \frac{AIC}{T}$$

$$\bullet BIC = \log \hat{\sigma}^2 + \frac{(p+q)}{T} \log T$$

والجدول (١٥-٥) التالي يوضح لنا نتائج المقارنة .

^(٤) انظر في الصفحة رقم: ١٢٤ من الفصل الثاني ، وبالنسبة لاختبار داربن - واتسون DW-STAT انظر الصفحة رقم : ٥٣ من الفصل الأول .

جدول(٥-١٥) مقارنة النماذج :

<i>BIC</i>	<i>NAIC</i>	<i>AIC</i>	<i>T</i>	$\hat{\sigma}^2$	<i>DW Stat</i>	النموذج
7.617	0.083	7.450	90	1613.635	2.007	ARMA(0,16)
7.483	0.098	7.390	75	1557.830	1.593	ARMA(15,0)
7.490	0.098	7.366	75	1502.002	2.049	ARMA(15,1)
7.483	0.098	7.328	75	1428.216	2.054	ARMA(15,9)

المصدر: أنظر الجداول (٦-٥)، (٩-٨)، (٥-٦)، (٥-١)، (٥-١١)، (٥-١٣).

نلاحظ من الجدول (٥-١٥) أن أحسن نموذج ملائم للسلسلة الزمنية المعدلة (ج) هو النموذج الأخير، أي ARMA(15,9).

والذي صيغته كالتالي :

$$z_t = 201.9046 + 0.219640 z_{t-12} - 0.265565 z_{t-15} \\ + 0.323515 \varepsilon_{t-1} + 0.260787 \varepsilon_{t-9} + \varepsilon_t$$

وانطلاقاً من هذا النموذج سنقوم بإعداد التوقع بنقطة وب مجال، وهذا ما سيتم التطرق إليه في العنصر الموالى .

٣- التوقع (Forecasting) :

بعدما تحصلنا على النموذج الأمثل للسلسلة الزمنية محل الدراسة، تأتي المرحلة التالية والأخيرة حسب بوكس- جنكز، والتمثلة في مرحلة التوقع . حيث في هذه المرحلة سنقوم بإعداد التوقعات بنقطة ، والتوقعات بمجال بناءً على النموذج الأمثل الذي تم الحصول عليه في العنصر الأخير .

٤-١- التوقع بنقطة:

إنطلاقاً من النموذج الأمثل الذي تحصلنا عليه سابقاً ، سوف نقوم بإعداد التوقعات للمبيعات الشهرية للمنتج محل الدراسة لمدة سنة كاملة . ونقوم أولاً بالتدكير بالنموذج الأمثل الذي تحصلنا عليه وفق العلاقة التالية :

$$z_t = 201.9046 + 0.219640 z_{t-12} - 0.265565 z_{t-15} \\ + 0.323515 \varepsilon_{t-1} + 0.260787 \varepsilon_{t-9} + \varepsilon_t$$

وانطلاقاً من الشكل (٥-٦) الممثل لبواقي النموذج الأمثل المختار، فإننا نتحصل على القيم التالية، والتي تمثل التوقعات كما يلي :

$$\hat{z}_{91} = 201.9046 + 0.21964 z_{79} - 0.265565 z_{76} + 0.323515 \varepsilon_{90} + 0.260787 \varepsilon_{82}$$

$$\hat{z}_{92} = 201.9046 + 0.21964 z_{80} - 0.265565 z_{77} + 0.260787 \varepsilon_{83}$$

$$\hat{z}_{93} = 201.9046 + 0.21964 z_{81} - 0.265565 z_{78} + 0.260787 \varepsilon_{84}$$

$$\hat{z}_{94} = 201.9046 + 0.21964 z_{82} - 0.265565 z_{79} + 0.260787 \varepsilon_{85}$$

$$\hat{z}_{95} = 201.9046 + 0.21964 z_{83} - 0.265565 z_{80} + 0.260787 \varepsilon_{86}$$

$$\hat{z}_{96} = 201.9046 + 0.21964 z_{84} - 0.265565 z_{81} + 0.260787 \varepsilon_{87}$$

$$\hat{z}_{97} = 201.9046 + 0.21964 z_{85} - 0.265565 z_{82} + 0.260787 \varepsilon_{88}$$

$$\hat{z}_{98} = 201.9046 + 0.21964 z_{86} - 0.265565 z_{83} + 0.260787 \varepsilon_{89}$$

$$\hat{z}_{99} = 201.9046 + 0.21964 z_{87} - 0.265565 z_{84} + 0.260787 \varepsilon_{90}$$

$$\hat{z}_{100} = 201.9046 + 0.21964 z_{88} - 0.265565 z_{85}$$

$$\hat{z}_{101} = 201.9046 + 0.21964 z_{89} - 0.265565 z_{86}$$

$$\hat{z}_{102} = 201.9046 + 0.21964 z_{90} - 0.265565 z_{87}$$


ومن أجل الحصول على القيم التوقعية الأصلية (\hat{y}_t) نقوم بإجراء التحويلات التالية :


$$\hat{y}_t = \hat{z}_t^2, \text{ ومنه يكون : } \hat{z}_t = \sqrt{\hat{y}_t}$$

جدول(5-16) : نتائج التوقعات النقطية باستعمال طريقة بوكس-جنكنز:

$\hat{y}_t = \hat{z}_t^2$	\hat{z}_t	الأشهر
36212.4755	190.2957	2006 جويلية -
30986.3038	176.0293	2006 أوت -
37231.7021	192.9552	2006 سبتمبر -
35436.5502	188.2459	2006 أكتوبر -
47395.8773	217.7059	2006 نوفمبر -
39399.7139	198.4936	2006 ديسمبر -
28609.0181	169.142	2007 جانفي -
41482.1102	203.6715	2007 فيفري -
34490.7775	185.7169	2007 مارس -
43036.3808	207.4521	2007 افرييل -
41368.0430	203.3913	2007 ماي -
33540.2367	183.1399	2007 جوان -

المصدر: تم إعداد هذا الجدول من طرفنا باستعمال معادلة التوقع السابقة ، وباعتماد معطيات الشكل (5-6)





الشكل(٥-٦): بواقي النموذج الأمثل ARMA(15,9)

المصدر: مدرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

٣-٢- التوقع بمجال :

إن مجال التوقع عند مستوى معنوية إحصائية ($\alpha\%$) يعطى بالعلاقة التالية :

$$(1) z_t(h) \pm t_{\frac{1-\alpha}{2}} \hat{\sigma}_{\epsilon_t} \left(1 + \sum_{j=1}^{h-1} \psi_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

حيث أن: $\hat{\sigma}_{\epsilon_t} = 37.79174$

وبالنظر إلى الشكل (٥-٦) الممثل لبواقي النموذج الأمثل نلحظ وجود قيم كثيرة لأخطاء متطرفة، وهذا ما يجعل مجال التوقع شاسعاً، ومن أجل تقليل مجال التوقع نقوم بحذف القيم المتطرفة والتي تقع خارج الخطتين المتوازتين الظاهرتين في

(٤) انظر في الصفحة رقم : ١٢٩ من الفصل الثاني .

الشكل(5-6) السابق، فنحصل على انحراف معياري معدل يساوي $21.0644 = \sigma'$ ، ومنه فإن مجال التوقع يصبح من الشكل التالي :

$$\hat{z}_t(h) \pm 1.96 \times 21.0644 \left(1 + \sum_{j=1}^{h-1} \psi_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

ومن أجل الحصول على مجال التوقع للسلسلة الأصلية (y_t) نقوم بتربيع طرفي مجال التوقع للسلسلة المحولة (z_t). والجدول التالي يوضح لنا مجالات التوقع للسلسلة الزمنية المحولة (z_t) والسلسلة الأصلية (y_t).

جدول(5-7): مجالات الثقة للقيم المتوقعة :

الأشهر	z_t				y_t			
	/	التوقع	المد الأدنى	المد الأعلى	التوقع	القيمة الفعلية	المد الأدنى	المد الأعلى
06 - 7	190.295	149.008	231.581	36212.47	43439.16	22203.38	53629.75	
06 - 8	176.029	134.743	217.315	30986.30	25387.46	18155.68	47225.81	
06 - 9	192.955	151.669	234.241	37231.70	54704.94	23003.48	54868.85	
06 - 10	188.245	146.959	229.531	35436.55	36962.52	21596.95	52684.48	
06 - 11	217.705	176.419	258.991	47395.88	51757.22	31123.66	67076.34	
06 - 12	198.493	157.207	239.779	39399.71	42765.92	24714.04	57493.97	
07 - 1	169.142	127.856	210.428	28609.02	-	16347.16	44279.94	
07 - 2	203.671	162.385	244.957	41482.11	-	26368.89	60003.93	
07 - 3	185.716	144.429	227.002	34490.78	-	20859.74	51529.91	
07 - 4	207.452	166.166	248.738	43036.38	-	27611.14	61870.59	
07 - 5	203.391	162.105	244.677	41368.04	-	26278.03	59866.83	
07 - 6	183.139	141.853	224.425	33540.23	-	33539.98	50366.68	


المصدر: تم إعداد هذا الجدول من طريقنا اعتماداً على علاقة التوقع بمجال السابقة واعتماد معطيات الجدول (5-16)، ومسؤول التسويق بالشركة بالنسبة لقيم الفعلية للمبيعات.

التحليل :

بمقارنة قيم التوقعات مع القيم الفعلية للشهور جويلية، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2006، نلاحظ أن القيم المتوقع بها قريبة من القيم الفعلية وتقع داخل مجال تقتها . وخاصة في شهر أكتوبر 2006 أين تقرباً القيمة المتوقعة تساوي القيمة الحقيقة [ب].

فالتوقع وفق هذه الطريقة إذن يستطيع اقتداء أثر السلسلة الأصلية وتتبع نقاط انعطافها، حيث وبالنظر إلى انخفاض مبيعات الشركة في شهر أوت 2006 تقرباً إلى النصف، ورغم ذلك فإن القيمة المتوقع بها انخفضت كذلك، نفس الشيء عند ارتفاع في الشهر المالي أي سبتمبر، فإن القيمة المتوقع بها ارتفعت كذلك ولو لم تكن بنفس النسبة الواقعية . ومن جهة أخرى ، نلاحظ أن مجال الثقة يتميز بالшиاعة نوعاً ما، وهذا راجع لوجود تذبذبات على مستوى حجم المبيعات الشهرية الفعلية لشركة (SCHB).

وفيما يلي الشكل البياني الذي يُبيّن المقارنة بين المبيعات المتوقعة بواسطة طريقة بوكس- جنكينز والمبيعات الحقيقية .



شكل (٥-٧) : منحنى التوقع بواسطة بوكس- جنكينز والبيانات الحقيقة

المصدر: تم الإعداد من طرقنا اعتماداً على Microsoft Excel 2003 .

٤- التوقع باستعمال طرق المسم الأسي :

إن السلسلة الزمنية الأصلية (y_t) ذات تذبذب شديد، والتوقع باستعمال طرق المسح الأسي انطلاقاً من هذه السلسلة الزمنية لا يكون مفيداً ، ولهذا نقوم بإعداد التوقعات إنطلاقاً من السلسلة الزمنية المحولة (z_t) ، وبمأن طرق المسح الأسي لا تتطلب توفر عدداً كبيراً من المشاهدات كما هو الأمر بالنسبة لطريقة بوكس- جنكينز فإننا سوف نستخدم 42 مشاهدة في بناء نماذج التوقع، وهذا إنطلاقاً من شهر جانفي 2003 إلى غاية جوان 2006 .

وبمأن السلسلة الزمنية (z_t) لا تحتوي لا على مركبة الاتجاه العام ولا المركبة الموسمية ، فإننا نستخدم طريقة المسح الأسي البسيط لأن باستطاعتها معالجة هذا النوع من السلاسل الزمنية .

٤-١ - نتائج التوقع باستعمال طرق المسم الأسي البسيط :

نذكر أولاً بمعادلة المسح الأسي البسيط كما يلي:

$$\hat{z}_{t+h} = \alpha z_t + (1-\alpha)\hat{z}_t$$

وباستعمال البرمجية E-VIEWS VER 2.0 نتحصل على نتائج التقدير التي يلخصها الجدول (١٨-٥) التالي :

الفصل الخامس: الدراسة التطبيقية

جدول (٥-١٨): تقدير معادلة التوقع لطريقة المسم الأسي البسيط^(٤)

Date: 03/16/07 Time: 17:43
Sample: 2003:01 2006:06
Included observations: 42
Method: Single Exponential
Original Series: SALES2
Forecast Series: SALES2SM
Parameters: Alpha 0.1000
Sum of Squared Residuals 85217.21
Root Mean Squared Error 45.04421
End of Period Levels: Mean 215.8902

SALES2SM

Last updated: 03/16/07 - 17:43
Modified: 2003:01 2006:06 // sales2.smooth(s,0.1) sales2sm

1999:01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1999:07	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2000:01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2000:07	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2001:01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2001:07	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2002:01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2002:07	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2003:01	194.4645	190.5762	178.8267	180.1796	185.3702	182.9013
2003:07	189.3297	193.3151	197.2673	200.3764	203.2046	202.8922
2004:01	200.5303	193.0264	179.5657	184.5054	188.0128	191.5179
2004:07	195.1591	198.7391	199.2343	199.9274	200.8920	196.9980
2005:01	198.0849	195.3355	190.4223	188.4642	192.2263	198.1088
2005:07	202.2296	204.1518	199.3726	201.3788	207.0931	208.9498
2006:01	210.1706	205.3247	206.6364	210.0152	211.0918	217.0712

المصدر: مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

و من الجدول (٥-١٨) السابق لدينا :

$$\alpha = 0.95$$

$$\hat{z}_{90} = 217.071$$

حيث تؤخذ آخر قيمة ممهدة من أجل التوقع بالقيم المستقبلية أي :

$$z_n(\ell) = s_n \quad , \ell > 0$$

وفي حالتنا هذه يكون لدينا :

$$z_{90}(\ell) = 217.071 \quad , \ell > 0$$

^(٤) تم اختيار قيمة التابع $\alpha = 0.1$ على أساس معيار أقل إنحراف معياري الذي يساوي $\sigma = 45.044$ ، بعيد التجريب بالقيم التالية : $\alpha = 0.2$ ، $\sigma = 46.458$ ، $\alpha = 0.3$ ، $\sigma = 46.186$ ، $\alpha = 0.349$ ، $\sigma = 45.849$ حيث أن قيم الإنحراف باستعمالها على التوالي :

حيث تؤخذ التوقعات للقيم الـ 6 المستقبلية أي للقيم $z_{n+6}, z_{n+5}, \dots, z_n$ ، وفي حالتنا تكون $z_{96}, z_{95}, \dots, z_{91}$ كما يلي :

$$z_{90}(1) = z_{90}(2) = \dots = z_{90}(6) = 217.071$$

ولحساب فترات توقع 95% نحسب الكميات $\ell > 0$ ، $[z_n(\ell) \pm 1.96\hat{\sigma}]$ أي [217.071 ± 1.96 $\hat{\sigma}$] لجميع قيم التوقعات ، حيث أن القيمة $45.044 = \hat{\sigma}$ ، وعليه تكون فترة توقع 95% لجميع القيم المستقبلية هي :

$$[217.071 \pm 1.96(45.044)] = [217.071 \pm 88.286] = [305.357, 128.785]$$

أي :

$$z_{90+\ell} \in [305.357, 128.785] , \ell > 0 \text{ with probability } 0.95$$

٥- المقارنة بين طريقة بوكس-جنكنز وطريقة المسم الأسي البسيط :

تتم المقارنة على أساس أقل انحراف معياري للتوقع $\hat{\sigma}_{\varepsilon_t}$ بالنسبة للمشاهدات السابقة ، والجدول التالي (١٩-٥) يبين ذلك: جدول (١٩-٥): قيم الإنحراف المعياري للتوقع للطريقتين :

المسم الأسي البسيط	بوكس-جنكنز	طريقة التوقع
45.04421	37.79174	$\hat{\sigma}_{\varepsilon_t}$

المصدر: أنظر إلى الجداول (١٣-٥) ، (١٨-٥).

من خلال الجدول (١٩-١) السابق يتضح لنا أن أصغر انحراف معياري للتوقع، هو الذي تحصلنا عليه بتطبيق طريقة بوكس-جنكنز، إذن انطلاقاً من المشاهدات السابقة فإن طريقة بوكس-جنكنز أعطت نتائج أدق بالمقارنة مع طرق المسح الأسي^(١) ، كما نلاحظ أن مجال التوقع بواسطة طريقة المسح الأسي البسيط يتميز بالشاشة ، حيث أن الحد الأعلى للمجال يساوي القيمة 305.357 ، وهي قيمة إذا قارناها بالفعلية بعد تربيعها نجد أنها ذات قيمة كبيرة 93242.897 بعيدة عن القيم الفعلية المقابلة للفترات ، وكذلك بالنسبة للحد الأدنى لمجال التوقع الذي يساوي 128.785 .

^(١) هذا ما يؤيد ما كنا قد أكدناه بأن هذه النماذج تتتفوق بشكل كبير على نماذج الاستقطاب والمسح الأسي المختلفة .

المبحث الثاني : التوقع بواسطة نماذج (ARCH) و (GARCH)

في هذا المبحث سوف نقوم بإعداد التوقعات بواسطة نماذج (ARCH) و (GARCH)، بعدها قمنا بذلك مع نموذج بوكس- جنكنز في البحث السابق، وسوف نبدأ باختبار أولاً هل يمكن تطبيق هذا النوع من النماذج ، وهذا باستعمال أحد الإختبارات المناسبة لاختبار عدم تباين التباين المنشروط (Conditional Heteroscedasticity) ألا وهو اختبار الباقي مربعة (ϵ_t^2) لنموذج الإنحدار الذاتي (Auto Regressie) المختار⁽¹⁾ لسلسلة المبيعات الشهرية الفعلية (y_t).

١- التوقع باستعمال النموذج (ARCH)

قبل القيام بالتوقع بهذه النماذج نقوم أولاً باختبار عدم تباين التباين لنموذج (Auto Regressie) المختار، وهذا بالنظر باستعمال الدالة (PACF)، وإلى رسومها البياني (Partial Correlogram) ، وإلى الدالة (ACF) وشكلها البياني (Correlogramm) (المتّلأن للسلسلة الأصلية y_t ، والشكل ٥-٨) يوضح ذلك .

١-١- اختبار عدم تباين التباين (Heteroscedasticity) :

سوف نبدأ أولاً بالبحث عن نموذج الإنحدار الذاتي المناسب ، وذلك عن تقدير وتشخيص النموذج المناسب عن طريق إحصائية $Ljung—Box$ (Q_{LB}) ، ومن ثم اختبار عدم تباين التباين .

١-١-١- تقدير نموذج الإنحدار الذاتي المناسب :

بالنظر إلى الدالة فإن نموذج الإنحدار الذاتي المطلوب هو AR(15) أي :

$$y_t = c + \hat{\phi}_1 y_{t-1} + \hat{\phi}_2 y_{t-11} + \hat{\phi}_3 y_{t-12} + \hat{\phi}_{15} y_{t-15}$$

وباستعمال البرمجية E-VIEWS VER 2.0 ، حيث نستعمل الأمر التالي :

- Estimation Command :

=====

LS SALES1 AR(1) AR(11) AR(12) AR(15) C

فتكون المخرجات ممثّلة في الجدول الموالي :

⁽¹⁾ انظر في الصفحة رقم ١٤٥ من الفصل الثالث .

Correlogram of SALES1

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.297	0.297	8.1887 0.004
		2	-0.025	-0.124	8.2465 0.016
		3	-0.025	0.022	8.3061 0.040
		4	-0.113	-0.127	9.5333 0.049
		5	-0.070	0.004	10.016 0.075
		6	-0.063	-0.067	10.410 0.108
		7	-0.122	-0.098	11.888 0.104
		8	-0.138	-0.103	13.813 0.087
		9	0.012	0.070	13.827 0.129
		10	-0.011	-0.078	13.840 0.180
		11	0.208	0.255	18.375 0.073
		12	0.317	0.160	29.022 0.004
		13	0.148	0.052	31.365 0.003
		14	0.006	-0.045	31.368 0.005
		15	-0.230	-0.240	37.206 0.001
		16	-0.195	-0.047	41.460 0.000
		17	-0.045	0.027	41.694 0.001
		18	0.040	0.098	41.876 0.001
		19	-0.123	-0.113	43.649 0.001
		20	-0.093	0.006	44.674 0.001
		21	-0.022	-0.045	44.732 0.002
		22	-0.069	-0.133	45.312 0.002
		23	0.076	-0.043	46.022 0.003
		24	0.088	-0.029	47.005 0.003
		25	-0.054	-0.142	47.374 0.004
		26	-0.061	0.051	47.848 0.006
		27	-0.129	-0.060	50.046 0.004
		28	-0.177	-0.046	54.217 0.002
		29	-0.010	-0.003	54.231 0.003
		30	0.136	0.076	56.788 0.002

الشكل(٥-٨): منحنى (ACF) .(PACF) للسلسلة الأصلية (y_t)

. المصدر: مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

جدول (٢٠-٥): تقدير معلمات النموذج AR(15)

LS // Dependent Variable is SALES1 Date: 03/17/07 Time: 19:01 Sample(adjusted): 2000:04 2006:06 Included observations: 75 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42662.77	2201.959	19.37492	0.0000
AR(1)	0.199246	0.106785	1.865858	0.0663
AR(11)	0.075458	0.113287	0.666076	0.5076
AR(12)	0.239145	0.112901	2.118189	0.0377
AR(15)	-0.253659	0.101455	-2.500215	0.0148
R-squared	0.208949	Mean dependent var	43114.38	
Adjusted R-squared	0.163746	S.D. dependent var	15077.02	
S.E. of regression	13787.47	Akaike info criterion	19.12737	
Sum squared resid	1.33E+10	Schwarz criterion	19.28187	
Log likelihood	-818.6968	F-statistic	4.622478	
Durbin-Watson stat	1.982632	Prob(F-statistic)	0.002275	
Inverted AR Roots	.87 -.13i .49 -.83i .28 -.82i .83 -.40i	.87+.13i .49+.83i .28+.82i .83+.40i	.80+.52i .07+.92i -.56-.68i -.93	.80 -.52i .07 -.92i -.56+.68i

المصدر: مدرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

وبعد استبعاد المعلمات الغير معنوية أي $t_{11} > 1.96$ ، وذلك أن الإحصائية (t-Statistic) لها أقل من الجدولية التي للتوزيع الطبيعي التي تساوي (1.96) عند مستوى معنوية 5% ، وباستبعادهما نحصل على النتائج الموجة، وهذا باستعمال الأمر التالي :

- Estimation Command :

=====

LS SALES1 AR(12) AR(15) C

ف تكون المخرجات كما يلي :

جدول (٢١-٥): تقدير معلمات النموذج المعدل : AR(15)

LS // Dependent Variable is SALES1 Date: 03/17/07 Time: 19:15 Sample(adjusted): 2000:04 2006:06 Included observations: 75 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42656.56	1701.147	25.07517	0.0000
AR(12)	0.294390	0.107761	2.731880	0.0079
AR(15)	-0.260148	0.101544	-2.561930	0.0125
R-squared	0.165582	Mean dependent var	43114.38	
Adjusted R-squared	0.142403	S.D. dependent var	15077.02	
S.E. of regression	13962.31	Akaike info criterion	19.12741	
Sum squared resid	1.40E+10	Schwarz criterion	19.22011	
Log likelihood	-820.6983	F-statistic	7.143825	
Durbin-Watson stat	1.628229	Prob(F-statistic)	0.001478	
Inverted AR Roots	.86 -.14i .48+.83i .31 -.81i .84+.42i	.86+.14i .48-.83i -.31+.81i -.84-.42i	.78+.52i .06+.94i -.55+.68i -.96	.78 -.52i .06 -.94i -.55 -.68i

المصدر: مدرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0

نلاحظ أن جميع هاته المعلمات معنوية إحصائيا، ومن ثم فإن نموذج الإنحدار الذاتي المناسب يكون كما يلي:

$$y_t = 42656.56 + 0.294390 y_{t-12} - 0.260148 y_{t-15}$$

١-٢-١- الإختبار :

ومن أجل اختبار عدم تباث التباين (Heteroscedasticity)، تقوم برسم الدالتين (ACF) و(PACF) للبواقي مربعة (ϵ_t^2) لنموذج (AR(15) السابق (أنظر الملحق [٨])، فنجدتها محصورة داخل فترة الثقة ٩٥% بما يعني أن الإرتباط الذاتي بين حدود (ϵ_t^2) غير معنوي ، أي أنها تشكل صدمات عشوائية (ضجة بيضاء)، وبالتالي عدم وجود أي البواقي مربعة غير معنوية إحصائيا، أي أنها عبارة عن سلسلة تشكل صدمات عشوائية أو ضجة بيضاء .

ومن جدول كاي-تربيع نجد أن القيمة الجدولية عند مستوى معنوية ١٠% هي: 25.849 ، ومن جدول كاي-تربيع نجد أن القيمة الجدولية عند مستوى معنوية ٩٠% هي: $\chi^2_{90\%}(30) = 40.256$.

جدول(5-22): اختبار AR لنموذج Ljung-Box (Q_{LB})

$(Q_{LB})Ljung-Box$	M	K	$\chi^2_{90\%}(M-K)$
25,849	33	3	40,256

المصدر: انظر مخرجات البرمجية E-VIEWS VER 2.0 [8].

ومنه لا يمكننا تطبيق نموذج (ARCH) ذلك أن شرط تطبيق هذا النموذج غير متوفّر وهو عدم تباث التباين المشروط (Conditional Heteroscedasticity).

2-التوقع باستعمال النموذج (GARCH) :

إنطلاقاً من النتائج السابقة، حيث أننا لانستطيع تطبيق النموذج الأولي (ARCH)، ومن ثم لا نستطيع كذلك تطبيق النموذج المعتم (GARCH)، والذي لا يمكننا تطبيقه إلا إذا طبقنا النموذج (ARCH).

ملخص الفصل الخامس

من خلال تطبيقنا لطريقة بوكس-جنكنز للتوقع بالبيانات الشهرية لمنتج الإسمنت البني لشركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)، وبعد مرورنا بالمراحل المختلفة إبتداءً من التعرف على النماذج المختلفة، ثم تقديرها، فتشخيص بواقيها، وبعد المقارنة بين هاته النماذج باستعمال أدوات اختبارية مناسبة، وقع اختيارنا على النموذج الأنسب وهو نموذج ARMA(15,9) ، وكذلك قمنا بالتوقع بواسطة طريقة المسح الأسي البسيط، والذي يصلح مثل هذه السلسلة التي وجدناها لاحتوي لا على مركبة الإتجاه العام، ولا المركبة الموسمية .

وبعد إجراء التوقعات، فإننا نستنتج ما يلي :

لله إن طريقة بوكس-جنكنز للتوقع هي فن يعتمد على الممارسة والخبرة من طرف الباحث أكثر من اعتمادها على قانون ثابت يحكم السلسلة الزمنية المدروسة، وهذا على عكس طرق التمليس الأسي، والتي تفترض وجود قانون أساسي تتبعه السلسلة الزمنية محل الدراسة، وبالتالي فإن نتائجها لا تكون دقيقة إذا كان القانون الأساسي للظاهرة لا يتلاءم مع القانون الأساسي المقترن، وهذا ما تحققنا منه في دراستنا هذه من خلال المقارنة بين نتائج التوقع لكلا الطريقتين ، وهذا باستعمال معيار أقل انحراف معياري للتوقعات الناتجة .

لله إن منهجية طريقة بوكس-جنكنز كما أشرنا، قائمة على منهجية النماذج القياسية من تعريف شكل النموذج، تقدير معلماته، تشخيص النموذج والتأكد من أن بواقيه صدمات عشوائية ، وأخيراً التوقع بعد التأكد من ملاءمته . إن نتائج التوقع بالبيانات كانت مقبولة بشكل عام، وأن التوقعات تقتفي أثر البيانات الحقيقة سواءً عند الإرتفاع الإنخفاض .

أما بالنسبة لنماذج (ARCH-GARCH)، فإنه وعلى الرغم من أن السلسلة الزمنية الأصلية تتميز بالتدبر، إلا أنه وباستعمال إختبار إحصائية Q_{LB} للبواقي مربعة (Q^2) في محاولة منا لاختبار عدم تبات التباين المشروط (Conditional Heteroscedasticity) المعطيات السلسلة الزمنية الأصلية، فوجدناها غير معنوية إحصائياً، وذلك بالنظر إلى دالة الإرتباط الذاتي الكلية والجزئية لنموذج الإنحدار الذاتي المختار وهو AR(15)، حيث أن معلماتها غير معنوية إحصائياً عند درجة الثقة 95%， بما يعني ان الإرتباط الذاتي بين حدود (Q^2) غير معنوي إحصائياً، ومن ثم لا يمكن الاستمرار في تطبيق هاته النماذج سواءً ما تعلق بالنماذج (ARCH)، أو النموذج المعتمد (GARCH) .

خاتمة عامة

=*==*==*==*

حاولنا في هذه الدراسة إجراء التوقع بالبيانات بواسطة أشهر طريقة للتوقع بالبيانات، وهي طريقة بوكس-جنكنز في شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)، وهذا على سلسلة زمنية تمثل البيانات الشهرية لنتائج الإسمنت البني الذي يرمز له بـ (CPS-CEM II/A 42.5)، حيث تم التطرق إلى نماذج التوقع المختلفة مبتدئين في الفصل الأول بنماذج الإستقطاب البسيطة وأشكالها المختلفة، أما في الفصل الثاني فقد تم فيه التطرق إلى صلب الموضوع ألا وهو نماذج بوكس-جنكنز (1970)، وكذلك الأشكال المختلفة ابتداءً من نماذج ARMA إلى المختلطة الموسمية SARIMA فالموسمية المنضربة التي تُعرف بـ SARIMA، أما في الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه إلى نماذج أخرى بُنيت على أساس الإنقاد الموجّه إلى نماذج بوكس-جنكنز ألا وهو افتراض تبات التباين، وهذه النماذج هي ما يُعرف بنماذج ARCH (1982) والنماذج المعتمدة (GARCH 1986).

أما في الفصل الرابع فقد تم التطرق فيه إلى التعريف بالشركة وتشخيص المزيج التسويقي، أما الفصل الخامس والأخير فتم من خلاله التطرق إلى الدراسة التطبيقية لنماذج بوكس-جنكنز، حيث وبعد التعرّف على النماذج المختلفة بالنظر إلى PACF وACF تأتي مرحلة تقدير معلمات النماذج المقترحة، ثم مرحلة التشخيص ، والتي من خلالها نحكم على النماذج المناسب من خلال فحص الباقي والتأكد من أنها تشكل صدمات عشوائية، وأخيراً قمنا بإجراء عملية التوقع على السلسلة الزمنية المعدلة باستعمال النماذج المناسب للأشهر الست من جويلية 2006 حتى ديسمبر من نفس السنة.

و من خلال اطلاعنا على وضعية شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)، يمكننا القول أنه وعلى الرغم من الوضع المالي الممتاز الذي تتمتع به هذه الشركة، إلا أن هذا لا يعني أنها تستعمل كل الأدوات العلمية في مجال تسييرها، بل يرجع إلى أنه لا يوجد منافسين لها، وأنها تسيطر على السوق المحلي الخاص بالإسمنت البني للولايات الثلاث قيسارية، جيجل، ميلة، حيث لاحظنا من خلال المعاينة الميدانية أن هذه الشركة لا تستعمل بعضاً من الأدوات العلمية في مجال تسيير المخزون، الإنتاج، وتسيير البيانات، حيث أن المسؤول القائم بمهمة التوقع بالبيانات يقوم بإجراء عمله ليس اعتماداً على الطرق العلمية والأدوات القياسية والإحصائية، وإنما يقوم بذلك إنطلاقاً من الدورات الماضية، ولذا قمنا من خلال هذا البحث بإفاده المؤسسة بإحدى أهم وأشهر طرق التوقع على المدى القصير والتمثل في طريقة بوكس-جنكنز، والتي قمنا بها على السلسلة الزمنية المعدلة بواسطة تحويلة الجذر التربيعي، وذلك لتبسيط التباين، ثم مقارنتها مع طريقة المسح الأسني البسيط، وكذلك حاولنا إجراء التوقعات بالبيانات بواسطة نماذج أخرى تعرف بنماذج ARCH-GARCH.

وقد تم الحصول على جملة من النتائج، وانطلاقاً من هاته النتائج سوف نورد جملة من التوصيات والتي نراها صائبة في سبيل الإستفادة من هاته النماذج وغيرها الأكثر تطوراً لهذه المؤسسة وللمؤسسات الأخرى.

أ-النتائج :

١- إن طريقة بوكس-جنكнер تعطي نتائج أحسن بكثير من نماذج التمليس الأسني، وهذا بسبب المرونة التي تميزها عكس النماذج الأخرى والتي يحكمها نظام ثابت، وبالتالي فإن التوقعات التي تقدمها هذه الأخيرة تكون غير دقيقة إذا كان القانون الفعلي للظاهرة المدروسة لا يتلاءم مع القانون الأساسي المقترن، بالإضافة إلى أن هذه الطرق لا يمكنها معالجة المركبة الدورية إن وجدت في السلسلة الزمنية محل الدراسة .

٢- إن طريقة بوكس-جنكнер التي تعتبر أشهر طريقة تُستعمل للتوقع بالبيانات يمكن اعتبارها كفناً يعتمد على خبرة الباحث أكثر من اعتمادها على قواعد ثابثة، خاصة منها ما تعلق بتحديد رتبة (درجة) النموذج، ومن ثم تحديد النموذج الملائم للسلسلة الزمنية محل الدراسة .

٣- تتطلب هذه الطريقة كذلك عدد مشاهدات تعتبر يتراوح بين ٥٠ مشاهدة، وكلما كانت المشاهدات أكبر كلما كانت دقة التوقع أكبر وأقرب إلى الواقع، وكذلك تتطلب القيام بها استعمال برمجيات خاصة مما يتطلب التمرن على كيفية استعمالها .

٤- حاولنا إجراء التوقع بواسطة نماذج ARCH-GARCH، إلا أننا لم نستطع تطبيقها، ذلك أننا قمنا باختبار الباقي مربعة لنموذج الإنحدار الذاتي المختار، فوجدنا أن هاته الباقي غير معنوية إحصائياً، أي أنها محصورة داخل الثقة الممثل بالخطين المتوازيين في دالة الارتباط الذاتي الكلية (ACF) والجزئية (PACF) لسلسلة الباقي المربعة .

٥- كذلك فإن السلسلة الزمنية التيتناولناها في الدراسة التطبيقية وهي البيانات الشهرية لا يتلاءم مع طبيعة هاته النماذج ARCH-GARCH، والتي تقوم بالتعامل مع السلسلات الزمنية التي تتميز بالنقلب الشديد (Volatility)، ولهذا نجد أن أكثر تطبيقات هذه النماذج تكون على السلسلات الزمنية المالية خاصة مثل تطور الأسهم في البورصات، وكذلك في المالية الدولية مثل تغيرات أسعار صرف العملات، وكذلك نمذجة أسعار الفائدة، كما أن لديها تطبيقات على مستوى الاقتصاد الكلي للتوقع بمجاميعه المختلفة .

كما نشير في الأخير إلى أن طرق التوقع بواسطة نماذج السلسلات الزمنية لا تعطي نماذج جيدة، في حالة كون السلسلة الزمنية ذات تذبذب شديد، أي أن هناك تغيير في طبيعة القانون الذي تسلكه هذه السلسلة الزمنية من فترة لأخرى، وكبدائل لهذه النماذج اقترح كريستوفر سيمبس (1986) نماذج الإنحدار الذاتي الشعاعية VAR (Vector Autoregressive)، والتي وكبدائل لما تم ذكره تتعامل مع تلك المتغيرات بطريقة مشابهة دون إقصاء أو إنتقائية والذي ينعكس في إدراج عدد كاف ومناسب من المتغيرات المؤخرة لكل المتغيرات الداخلية وفي كل المعادلات .

بـ- التوصيات :

- ١- تعميق استخدام الحاسوب في إعداد النماذج الإقتصادية، والبدائل والسيناريوهات المختلفة، وهذا يتطلب إيجاد هيئات خاصة ومتخصصة في جمع البيانات، إن عملية التحليل وترجمة تلك البيانات إلى نماذج سيحقق الكثير من التطورات نتيجة التطور الهائل الذي حدث في مجال الحاسوب الآلية وكذا البرمجيات المتخصصة ، إذ تستطيع هذه الأخيرة إنجاز نماذج المحاكاة والنماذج القياسية الواسعة بسرعة كبيرة، وتحديد السياسات المطلوبة في خلال ثوان معدودة، هذه السرعة الكبيرة في تحليل البيانات، بالإضافة إلى درجة التفصيلات الدقيقة المطلوبة تمثل بالتأكيد عاملًا مهمًا يسهم في ترسير اعتقاد الكثير من المحللين بأنه يمكن وضع وتصميم وإدارة الأداء الأمثل للنظام الإقتصادي، وذلك في ظل المعلومات الكافية والمتوفرة ففي ظل التقدم الإقتصادي السريع، فإننا نجد أنه من غير العقول أن تكون جوانب القصور في جمع وتحليل البيانات والتي ما زالت قائمة في بلادنا تمثل العامل الرئيس في عدم الإنتشار الواسع لتبني نماذج المحاكاة .
- ٢- العمل على تكوين الإطارات المتخصصة في النمذجة والقياس الإقتصادي ، أو الإستفادة منهم، خاصة منها التي تتميز بالتعقيد على غرار نماذج بوكس-جنكنز، بالإضافة إلى نماذج ARCH-GARCH ، نماذج VAR ،...إلخ، فمن غير العقول والمنطق أن تبقى شركة (SCHB) وغيرها من المؤسسات الجزائرية تُسيّر بهذا النسق من التسيير الذي تميزه العشوائية والتلقائية في كثير من الأحيان .
- ٣- ضرورة استخدام تقنيات التوقع المختلفة من أجل عقلنة عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة، ومن الأفضل لها أن يتم استعمال هاته التقنيات في نظام واضح المعالم يتم بالتنسيق بين مختلف وظائف المؤسسة، وليس كمارأينا في شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) ، حيث تتم إجراء التوقعات الشهرية اعتماداً على ما تم تحقيقه في الدورات السابقة .
- ٤- ضرورة الإهتمام من طرف جامعاتنا ومرافق تكويننا بتعزيز استعمال الكمبيوتر والبرمجيات المختلفة، واستعمالها في جميع أطوار التدريس وذلك في أقرب فرصة، وهذا حتى يتسعى لسوق العمل الإستفادة منها، إذ لا يعقل أن نستمر بعيدين عن استعمال التكنولوجيات الحديثة، والتي من خلالها نربح فيها عاملي الوقت والتكلفة .
- ٥- ضرورة الإسراع في فتح مديرية التسويق في شركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB) ، ذلك أنه ومن خلال اطلاعنا على هذه الشركة، لاحظنا أنه لا زالت النظرة الضيقة للتسويق بأنه يمثل مصلحة تصريف المنتوج والمبيعات لا أكثر، إذ لا يعني أنك الوحيد في السوق كما هي عليه وضعية شركة (SCHB) أن تستمرة في هذه النظرة الضيقة، حيث ومع بدايات الإنفتاح الذي يعرفه الإقتصاد الجزائري، ودخول شركات منافسة إلى السوق الجزائرية على غرار الشركة المصرية "أوراسكوم الإسمنت" ، يُحتم على هذه الشركة وغيرها من الشركات الجزائرية العاملة في هذا القطاع، وغيره من القطاعات الأخرى أن تقوم بوضع سياسة تسويقية تنسجم وهذه التطورات من دراسة لحركة السوق، الإشهار، الجودة والضمان،...إلخ، وأن تستعين بالأدوات والتقنيات العلمية في جميع أطوار عملها، وسيروءة نشاطاتها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في العملية التسييرية .

الملاحق

[1] الملحق

**جدول حسابات النتائج 2003
TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2003**

Date de clôture 31/12/2003

Dossier Adresse		SCHB CONSOLIDE	
Cpt	DESIGNATION	DEBIT	CREDIT
70	Vente de marchandises		0.00
60	Marchandises consommées	0.00	
80	Marge Brute	0.00	
80	Marge Brute		0.00
71	Production vendue		2 191 256 125.44
72	Production stockée		0.00
73	Produit Entreprise p/elle		(3268251.39)
74	Prestation Fournies		0.00
75	Transfert charges de production		0.00
61	Matières & Fournit Consommées	1 020 325 356.98	
62	Service	443 989 212.04	
81	Valeur Ajoutée	733 504 116.29	
81	Valeur Ajoutée		116.29 504 733
77	Produits Divers		60046927.82
78	Transfert Charges D'entreprise		0.00
63	Frais de Personnel	386 205 603.18	29989013.80
64	Impôt & Taxes	57 630 724.44	
65	Frais Financiers	25 474 427.55	
66	Frais Divers	24 396 116.91	
68	Dotation aux Amortissement	417 074 431.24	
83	Résultat d'Exploitation		(87 241 245.41)
79	Produits hors Exploitation		582 183 743.70
69	Charges hors Exploitation	69 640 218.85	
84	Résultat hors Exploitation		113 942 524.85
83	Résultat d'Exploitation		(87 241 245.41)
84	Résultat Hors Exploitation		113942524.85
800	Résultat Brut de l'exercice		26 701 279.44
889	Impôts sur les Bénéfices	3 513 327.00	
88	Résultat de l'exercices		23 187 952.44

الملحق [2]

جدول حسابات النتائج 2004 TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2004

Date de clôture 31/12/2004

Dossier Adresse		SCHB CONSOLIDE	
Cpt	DESIGNATION	DEBIT	CREDIT
70	Vente de marchandises		20 196 018.30
60	Marchandises consommées	13 593 780.22	
80	Marge Brute	6 602 238.08	
80	Marge Brute		6 602 238.08
71	Production vendue		2 499 066 063.42
72	Production stockée		12 397 5081.78
73	Produit Entreprise p/elle		0.00
74	Prestation Fournies		1 254 200.00
75	Transfert charges de production		22 693 389.80
61	Matières & Fournit Consommées	1 067 813 940.05	
62	Service	401 338 677.58	
81	Valeur Ajoutée	1 184 384 355.45	
81	Valeur Ajoutée		1 184 384 355.45
77	Produits Divers		42 294 451.85
78	Transfert Charges D'entreprise		10 979 352.43
63	Frais de Personnel	437 432 407.67	
64	Impôt & Taxes	59 703 349.98	
65	Frais Financiers	28 139 891.35	
66	Frais Divers	32 176 245.95	
68	Dotation aux Amortissement	465 296 137.56	
83	Résultat d'Exploitation		214 910 127.22
79	Produits hors Exploitation		39 930 455.18
69	Charges hors Exploitation	95 447 070.88	
84	Résultat hors Exploitation		(55 516 615.70)
83	Résultat d'Exploitation		214 910 127.22
84	Résultat Hors Exploitation		(55 516 615.70)
800	Résultat Brut de l'exercice		159 393 511.52
889	Impôts sur les Bénéfices	21 258 539.02	
88	Résultat de l'exercices		13 813 4972.5

الملحق [3]

جدول حسابات النتائج 2005
TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2005

Date de clôture 31/12/2005

Dossier Adresse		SCHB CONSOLIDE	
Cpt	DESIGNATION	DEBIT	CREDIT
70	Vente de marchandises		6 068 092.82
60	Marchandises consommées	4 239 750.35	
80	Marge Brute		1 828 342.47
80	Marge Brute		1 828 342.47
71	Production vendue		2 714 640 305.37
72	Production stockée		36 474 732.08
73	Produit Entreprise p/elle		0.00
74	Prestation Fournies		0.00
75	Transfert charges de production		30 207 866.70
61	Matières & Fournit Consommées	1 008 745 381.01	
62	Service	422 570 286.40	
81	Valeur Ajoutée		51 835 579.21
81	Valeur Ajoutée		1 351 835 579.21
77	Produits Divers		43 627 285.21
78	Transfert Charges D'entreprise		43 495 175.39
63	Frais de Personnel	462 808 701.58	
64	Impôt & Taxes	59 177 347.84	
65	Frais Financiers	60 880 458.06	
66	Frais Divers	30 639 776.67	
68	Dotation aux Amortissement	458 810 171.48	
83	Résultat d'Exploitation		366 641 584.15
79	Produits hors Exploitation		79 842 554.02
69	Charges hors Exploitation	145 282 862.34	
84	Résultat hors Exploitation	(65 440 308.32)	
83	Résultat d'Exploitation		366 641 584.15
84	Résultat Hors Exploitation	(65 440 308.32)	
800	Résultat Brut de l'exercice		301 201 275.83
889	Impôts sur les Bénéfices	0.00	
88	Résultat de l'exercices		301 201 275.83

المادة [4]

Correlogram of Residuals

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
				1	-0.006	-0.006	0.0034
				2	-0.068	-0.068	0.4432
				3	0.080	0.080	1.0555
				4	0.002	-0.002	1.0558
				5	-0.037	-0.027	1.1922
				6	-0.036	-0.043	1.3219
				7	-0.091	-0.097	2.1519
				8	-0.109	-0.113	3.3577
				9	0.091	0.085	4.1993
				10	-0.109	-0.113	5.4205
				11	0.009	0.038	5.4296
				12	0.051	0.014	5.7015
				13	0.084	0.094	6.4673
				14	0.079	0.072	7.1444
				15	-0.007	-0.018	7.1499
				16	-0.022	-0.033	7.2064
				17	-0.053	-0.068	7.5248
				18	0.107	0.089	8.8404
				19	-0.076	-0.043	9.5224
				20	-0.065	-0.031	10.015
				21	0.029	0.036	10.112
				22	-0.147	-0.158	12.758
				23	-0.046	-0.034	13.019
				24	0.054	0.034	13.389
				25	-0.184	-0.204	17.698
				26	-0.085	-0.073	18.629
				27	0.014	-0.101	18.657
				28	-0.059	-0.045	19.126
				29	0.004	-0.006	19.128
				30	0.160	0.123	22.646
				31	-0.068	-0.068	23.300
				32	0.018	-0.024	23.345
				33	-0.011	-0.100	23.363
				34	0.075	0.122	24.199
				35	0.083	0.087	25.229
				36	0.026	0.080	25.334

Correlogram of Residuals of ARMA (0,16) Model

المادة [5]

Correlogram of Residuals

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
				1	0.202	0.202	3.1916
				2	-0.017	-0.060	3.2134
				3	0.142	0.165	4.8331
				4	-0.067	-0.144	5.1972
				5	-0.085	-0.022	5.7903
				6	-0.063	-0.083	6.1274
				7	-0.114	-0.063	7.2284
				8	-0.095	-0.060	8.0080
				9	0.174	0.229	10.662
				10	-0.007	-0.112	10.667
				11	0.056	0.141	10.949
				12	0.112	-0.051	12.090
				13	0.067	0.128	12.513
				14	0.110	0.026	13.664
				15	-0.062	-0.081	14.033
				16	-0.142	-0.117	16.016
				17	-0.050	0.043	16.261
				18	0.037	0.027	16.396
				19	-0.116	-0.053	17.793
				20	0.072	0.120	18.333
				21	0.081	-0.012	19.039
				22	-0.167	-0.200	22.076
				23	0.047	0.045	22.324
				24	0.016	-0.035	22.352
				25	-0.173	-0.107	25.796
				26	-0.109	-0.095	27.204
				27	-0.107	-0.123	28.572
				28	-0.118	0.033	30.282
				29	0.028	0.029	30.379
				30	0.122	0.130	32.279
				31	-0.009	-0.043	32.290
				32	0.073	-0.003	33.002
				33	0.060	-0.038	33.492

Correlogram of Residuals of ARMA(15,0) Model

[٦] المحتوى

Correlogram of Residuals

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.027	-0.027	0.0588
		2	-0.054	-0.055	0.2911
		3	0.179	0.176	2.8526
		4	-0.103	-0.101	3.7155 0.054
		5	-0.057	-0.043	3.9837 0.136
		6	-0.025	-0.071	4.0358 0.258
		7	-0.079	-0.052	4.5719 0.334
		8	-0.131	-0.138	6.0623 0.300
		9	0.221	0.233	10.318 0.112
		10	-0.077	-0.091	10.844 0.146
		11	0.054	0.129	11.103 0.196
		12	0.107	-0.030	12.159 0.205
		13	0.009	0.096	12.165 0.274
		14	0.118	0.066	13.479 0.263
		15	-0.057	-0.043	13.792 0.314
		16	-0.117	-0.132	15.131 0.299
		17	-0.044	-0.004	15.324 0.356
		18	0.083	0.058	16.026 0.380
		19	-0.157	-0.072	18.561 0.292
		20	0.081	0.091	19.254 0.314
		21	0.114	0.066	20.652 0.297
		22	-0.215	-0.195	25.672 0.140
		23	0.094	-0.003	26.653 0.145
		24	0.038	0.003	26.819 0.177
		25	-0.168	-0.101	30.093 0.116
		26	-0.051	-0.087	30.404 0.138
		27	-0.069	-0.151	30.984 0.154
		28	-0.112	0.002	32.535 0.143
		29	0.024	-0.002	32.608 0.174
		30	0.131	0.141	34.812 0.144
		31	-0.063	-0.012	35.327 0.161
		32	0.078	-0.003	36.144 0.169
		33	0.045	-0.047	36.423 0.195
		34	-0.024	0.021	36.506 0.228
		35	0.028	-0.006	36.621 0.263

Correlogram of Residuals of ARMA(15,1) model

المادة [7]

Correlogram of Residuals

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
				1	-0.035	-0.035	0.0942
				2	-0.051	-0.052	0.3018
				3	0.187	0.184	3.0927
				4	-0.116	-0.112	4.1956
				5	-0.081	-0.071	4.7399
				6	-0.048	-0.100	4.9315
				7	-0.056	-0.026	5.1974
				8	-0.143	-0.146	6.9608
				9	-0.004	-0.005	6.9621
				10	-0.005	-0.032	6.9646
				11	0.040	0.076	7.1056
				12	0.084	0.045	7.7593
				13	0.069	0.065	8.1973
				14	0.135	0.108	9.9226
				15	-0.024	-0.035	9.9779
				16	-0.086	-0.109	10.702
				17	-0.017	-0.052	10.731
				18	0.091	0.149	11.574
				19	-0.137	-0.073	13.498
				20	0.078	0.132	14.137
				21	0.067	0.029	14.620
				22	-0.224	-0.147	20.109
				23	0.051	-0.035	20.394
				24	0.070	0.030	20.957
				25	-0.147	-0.117	23.440
				26	-0.054	-0.093	23.786
				27	-0.056	-0.140	24.170
				28	-0.082	-0.039	24.991
				29	-0.009	0.005	25.001
				30	0.134	0.144	27.317
				31	-0.027	-0.056	27.415
				32	0.111	0.070	29.069
				33	0.037	-0.059	29.256
				34	-0.019	-0.008	29.306
				35	0.043	-0.009	29.577
							0.539

Correlogram of Residuals of ARMA(15,9) Model

المبحث [٨]

Correlogram of Residuals Squared

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
				1	0.094	0.094	0.6918
				2	0.055	0.047	0.9328
				3	-0.144	-0.155	2.6043 0.107
				4	-0.068	-0.045	2.9846 0.225
				5	-0.097	-0.072	3.7620 0.288
				6	0.023	0.024	3.8058 0.433
				7	0.200	0.198	7.2133 0.205
				8	0.051	-0.013	7.4379 0.282
				9	0.095	0.070	8.2240 0.313
				10	-0.055	-0.026	8.4972 0.386
				11	-0.077	-0.062	9.0268 0.435
				12	0.024	0.107	9.0779 0.525
				13	0.060	0.051	9.4083 0.584
				14	0.037	-0.027	9.5350 0.657
				15	-0.100	-0.123	10.504 0.652
				16	-0.043	-0.060	10.685 0.711
				17	-0.121	-0.074	12.141 0.668
				18	0.002	0.031	12.141 0.734
				19	-0.033	-0.059	12.251 0.785
				20	0.115	0.065	13.648 0.752
				21	0.032	-0.007	13.760 0.797
				22	-0.067	-0.089	14.251 0.818
				23	-0.208	-0.157	19.067 0.581
				24	-0.130	-0.036	20.988 0.521
				25	-0.038	-0.006	21.152 0.572
				26	-0.032	-0.059	21.271 0.623
				27	0.066	-0.003	21.793 0.648
				28	0.009	-0.039	21.803 0.699
				29	-0.119	-0.146	23.575 0.654
				30	-0.050	0.038	23.891 0.687
				31	-0.115	-0.062	25.623 0.646
				32	-0.002	0.005	25.624 0.694
				33	-0.040	-0.052	25.849 0.729


Correlogram of Residuals squared of AR (15) Model

الملحق [٩] : التوزيع الطبيعي المعياري " Z Distribution "

Fonction de répartition Π de la loi normale centrée réduite.

Probabilité de trouver une valeur inférieure à u .

$$\Pi(-u) = 1 - \Pi(u)$$




u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91309	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.92220	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670
2.0	0.97725	0.97778	0.97831	0.97882	0.97932	0.97982	0.98030	0.98077	0.98124	0.98169
2.1	0.98214	0.98257	0.98300	0.98341	0.98382	0.98422	0.98461	0.98500	0.98537	0.98574
2.2	0.98610	0.98645	0.98679	0.98713	0.98745	0.98778	0.98809	0.98840	0.98870	0.98899
2.3	0.98928	0.98956	0.98983	0.99010	0.99036	0.99061	0.99086	0.99111	0.99134	0.99158
2.4	0.99180	0.99202	0.99224	0.99245	0.99266	0.99286	0.99305	0.99324	0.99343	0.99361
2.5	0.99379	0.99396	0.99413	0.99430	0.99446	0.99461	0.99477	0.99492	0.99506	0.99520
2.6	0.99534	0.99547	0.99560	0.99573	0.99585	0.99598	0.99609	0.99621	0.99632	0.99643
2.7	0.99653	0.99664	0.99674	0.99683	0.99693	0.99702	0.99711	0.99720	0.99728	0.99736
2.8	0.99744	0.99752	0.99760	0.99767	0.99774	0.99781	0.99788	0.99795	0.99801	0.99807
2.9	0.99813	0.99819	0.99825	0.99831	0.99836	0.99841	0.99846	0.99851	0.99856	0.99861
3.0	0.99865	0.99869	0.99874	0.99878	0.99882	0.99886	0.99889	0.99893	0.99896	0.99900
3.1	0.99903	0.99906	0.99910	0.99913	0.99916	0.99918	0.99921	0.99924	0.99926	0.99929
3.2	0.99931	0.99934	0.99936	0.99938	0.99940	0.99942	0.99944	0.99946	0.99948	0.99950

الملحق [١٠] : توزيع كاي تربيعي (χ^2)

Cette table donne les fractiles F_p de la loi de khi deux


à v degrés de liberté: $P = \text{Probabilité } (\chi^2 < F_p)$



P	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.75	0.8	0.9	0.95	0.98	0.99
V															
1	0.000	0.001	0.004	0.016	0.064	0.148	0.275	0.455	1.074	1.323	1.642	2.706	3.841	5.412	6.635
2	0.020	0.040	0.103	0.211	0.446	0.713	1.022	1.386	2.408	2.773	3.219	4.605	5.991	7.824	9.210
3	0.115	0.185	0.352	0.584	1.005	1.424	1.869	2.366	3.665	4.108	4.642	6.251	7.815	9.837	11.345
4	0.297	0.429	0.711	1.064	1.649	2.195	2.753	3.357	4.878	5.385	5.989	7.779	9.488	11.668	13.277
5	0.554	0.752	1.145	1.610	2.343	3.000	3.656	4.351	6.064	6.626	7.289	9.236	11.070	13.388	15.086
6	0.872	1.134	1.635	2.204	3.070	3.828	4.570	5.348	7.231	7.841	8.558	10.645	12.592	15.033	16.812
7	1.239	1.564	2.167	2.833	3.822	4.671	5.493	6.346	8.383	9.037	9.803	12.017	14.067	16.622	18.475
8	1.647	2.032	2.733	3.490	4.594	5.527	6.423	7.344	9.524	10.219	11.030	13.362	15.507	18.168	20.090
9	2.088	2.532	3.325	4.168	5.380	6.393	7.357	8.343	10.656	11.389	12.242	14.684	16.919	19.679	21.666
10	2.558	3.059	3.940	4.865	6.179	7.267	8.295	9.342	11.781	12.549	13.442	15.987	18.307	21.161	23.209
11	3.053	3.609	4.575	5.578	6.989	8.148	9.237	10.341	12.899	13.701	14.631	17.275	19.675	22.618	24.725
12	3.571	4.178	5.226	6.304	7.807	9.034	10.182	11.340	14.011	14.845	15.812	18.549	21.026	24.054	26.217
13	4.107	4.765	5.892	7.041	8.634	9.926	11.129	12.340	15.119	15.984	16.985	19.812	22.362	25.471	27.688
14	4.660	5.368	6.571	7.790	9.467	10.821	12.078	13.339	16.222	17.117	18.151	21.064	23.685	26.873	29.141
15	5.229	5.985	7.261	8.547	10.307	11.721	13.030	14.339	17.322	18.245	19.311	22.307	24.996	28.259	30.578
16	5.812	6.614	7.962	9.312	11.152	12.624	13.983	15.338	18.418	19.369	20.465	23.542	26.296	29.633	32.000
17	6.408	7.255	8.672	10.085	12.002	13.531	14.937	16.338	19.511	20.489	21.615	24.769	27.587	30.995	33.409
18	7.015	7.906	9.390	10.865	12.857	14.440	15.893	17.338	20.601	21.605	22.760	25.989	28.869	32.346	34.805
19	7.633	8.567	10.117	11.651	13.716	15.352	16.850	18.338	21.689	22.718	23.900	27.204	30.144	33.687	36.191
20	8.260	9.237	10.851	12.443	14.578	16.266	17.809	19.337	22.775	23.828	25.038	28.412	31.410	35.020	37.566
21	8.897	9.915	11.591	13.240	15.445	17.182	18.768	20.337	23.858	24.935	26.171	29.615	32.671	36.343	38.932
22	9.542	10.600	12.338	14.041	16.314	18.101	19.729	21.337	24.939	26.039	27.301	30.813	33.924	37.659	40.289
23	10.196	11.293	13.091	14.848	17.187	19.021	20.690	22.337	26.018	27.141	28.429	32.007	35.172	38.968	41.638
24	10.856	11.992	13.848	15.659	18.062	19.943	21.652	23.337	27.096	28.241	29.553	33.196	36.415	40.270	42.980
25	11.524	12.697	14.611	16.473	18.940	20.867	22.616	24.337	28.172	29.339	30.675	34.382	37.652	41.566	44.314
26	12.198	13.409	15.379	17.292	19.820	21.792	23.579	25.336	29.246	30.435	31.795	35.563	38.885	42.856	45.642
27	12.878	14.125	16.151	18.114	20.703	22.719	24.544	26.336	30.319	31.528	32.912	36.741	40.113	44.140	46.963
28	13.565	14.847	16.928	18.939	21.588	23.647	25.509	27.336	31.391	32.620	34.027	37.916	41.337	45.419	48.278
29	14.256	15.574	17.708	19.768	22.475	24.577	26.475	28.336	32.461	33.711	35.139	39.087	42.557	46.693	49.588
30	14.953	16.306	18.493	20.599	23.364	25.508	27.442	29.336	33.530	34.800	36.250	40.256	43.773	47.962	50.892

الملحق [١١] : توزيع ستودنت " T Distribution "

Cette table donne les fractiles de la loi de Student à v degrés de liberté : valeur t ayant la probabilité α d'être dépassée en valeur absolue : $P(-t < T < t) = 1 - \alpha$.
 Ou : $P(T < -t) = \alpha/2 = P(T > t)$



		α bilatéral				1 - $\alpha / 2$ (unilatéral)				v (degré de liberté)			
		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
		0.55	0.6	0.65	0.7	0.8	1.376	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.1584	0.3249	0.5095	0.7265	1	1.3764	1.9626	3.0777	6.3137	12.706	31.821	63.656	127.32
2	0.1421	0.2887	0.4447	0.6172	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.92	4.3027	6.9645	9.925	14.089
3	0.1366	0.2767	0.4242	0.5844	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8408	7.4532
4	0.1338	0.2707	0.4142	0.5686	0.7407	0.941	1.1896	1.5332	2.1318	2.7765	3.7469	4.6041	5.5975
5	0.1322	0.2672	0.4082	0.5594	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.015	2.5706	3.3649	4.0321	4.7733
6	0.1311	0.2648	0.4043	0.5534	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	4.3168
7	0.1303	0.2632	0.4015	0.5491	0.7111	0.896	1.1192	1.4149	1.8946	2.3646	2.9979	3.4995	4.0294
8	0.1297	0.2619	0.3995	0.5459	0.7064	0.8889	1.1081	1.3968	1.8595	2.306	2.8965	3.3554	3.8325
9	0.1293	0.261	0.3979	0.5435	0.7027	0.8834	1.0997	1.383	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	3.6896
10	0.1289	0.2602	0.3966	0.5415	0.6998	0.8791	1.0931	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	3.5814
11	0.1286	0.2596	0.3956	0.5399	0.6974	0.8755	1.0877	1.3634	1.7959	2.201	2.7181	3.1058	3.4966
12	0.1283	0.259	0.3947	0.5386	0.6955	0.8726	1.0832	1.3562	1.7823	2.1788	2.681	3.0545	3.4284
13	0.1281	0.2586	0.394	0.5375	0.6938	0.8702	1.0795	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.3725
14	0.128	0.2582	0.3933	0.5366	0.6924	0.8681	1.0763	1.345	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.3257
15	0.1278	0.2579	0.3928	0.5357	0.6912	0.8662	1.0735	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467	3.286
20	0.1273	0.2567	0.3909	0.5329	0.687	0.86	1.064	1.3253	1.7247	2.086	2.528	2.8453	3.1534
25	0.1269	0.2561	0.3898	0.5312	0.6844	0.8562	1.0584	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.0782
30	0.1267	0.2556	0.389	0.53	0.6828	0.8538	1.0547	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.75	3.0298
40	0.1265	0.255	0.3881	0.5286	0.6807	0.8507	1.05	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045	2.9712
45	0.1264	0.2549	0.3878	0.5281	0.68	0.8497	1.0485	1.3007	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896	2.9521
50	0.1263	0.2547	0.3875	0.5278	0.6794	0.8489	1.0473	1.2987	1.6759	2.0086	2.4033	2.6778	2.937
60	0.1262	0.2545	0.3872	0.5272	0.6786	0.8477	1.0455	1.2958	1.6706	2.0003	2.3901	2.6603	2.9146
100	0.126	0.254	0.3864	0.5261	0.677	0.8452	1.0418	1.2901	1.6602	1.984	2.3642	2.6259	2.8707
110	0.126	0.254	0.3863	0.5259	0.6767	0.8449	1.0413	1.2893	1.6588	1.9818	2.3607	2.6213	2.8648
120	0.1259	0.2539	0.3862	0.5258	0.6765	0.8446	1.0409	1.2886	1.6576	1.9799	2.3578	2.6174	2.8599
140	0.1259	0.2538	0.3861	0.5256	0.6762	0.8442	1.0403	1.2876	1.6558	1.9771	2.3533	2.6114	2.8522
Infini	0.1257	0.2533	0.3853	0.5244	0.6744	0.8416	1.0364	1.2816	1.6449	1.96	2.3264	2.5759	2.8072

الببليوغرافيا

١- الكتب :

أ- باللغة العربية :

[١-][م.الحمصي- 79]

محمود الحمصي: التخطيط الاقتصادي ،
دار الطليعة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة- 1979 .

محمد أبو صالح وعدنان محمد عوض : مقدمة في الإحصاء ،
دار ١983 -USA، A Wiley Arobook .

عبد السلام أبو قحف : أساسيات التنظيم والإدارة ،
دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ج م ع- 2002 .

عبد السلام أبو قحف : أساسيات الإدارة ،
دار الجامعة للنشر، الإسكندرية ، ج م ع- 1990 .

عبد القادر بورقة : التخطيط الاقتصادي ، أسلوب لإدارة الاقتصاد الوطني ،
مؤسسة الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق - 1979 .

صالح تومي: مدخل لنظرية القياس الاقتصادي ،
ديوان المطبوعات الجامعية (OPU) ، الجزائر- 1999 .

جيلايلي جلاطو : الإحصاء مع تمارين ومسائل محلولة ،
ديوان المطبعات الجامعية (OPU) ، الجزائر- 1999 .

مولود حشمان : نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى ،
ديوان المطبعات الجامعية (OPU) ، الجزائر- 2002 .

دومينيك سلقاتور: الإحصاء و الاقتصاد القياسي ، سلسلة ملخصات شوم ،
ديوان المطبعات الجامعية (OPU) ، الجزائر- 1982 .

عبد العزيز شرابي: طرق إحصائية للتوقع الرياضي ،
ديوان المطبعات الجامعية (OPU) ، الجزائر- 2000 .

عصام عزيز شريف : مقدمة في القياس الاقتصادي ، الطبعة الثانية ،
ديوان المطبوعات الجامعية (OPU) ، الجزائر- 1981 .

محمد عبد الله عبد الرحيم : التسويق المعاصر ،
مطبعة دار الجامعة و الكتاب الجامعي، القاهرة ، ج م ع- 1988 .

محمد عبيادات ، هاني الضمور، شفيق حداد: إدارة المبيعات والبيع الشخصي ،
دار وائل للطباعة للنشر، عمان،الأردن- 2001 .

[٢-][م.أبو صالح- 83]

[٣-][ع.س.أبو قحف- 02]

[٤-][ع.س.أبو قحف- 90]

[٥-][ع.ق.بودقة- 79]

[٦-][ص.تومي- 99]

[٧-][ج. جلاطو- 99]

[٨-][م.حشمان- 02]

[٩-][د.سلقاتور- 82]

[١٠-][ع.شراibi- 00]

[١١-][ع.شريف- 81]

[١٢-][م.ع. الرحيم- 88]

[١٣-][م.عبيادات- 01]

- عبد القادر محمد عبد القادر عطية: الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ،
الطبعة الثانية، الدار الجامعية، الإسكندرية، ج م ع - 2000 .
- والتر فاندل : السلاسل الزمنية من الوجهة التطبيقية ونمذج بوكس- جنكنز ،
تعریف عبد المرضی حامد عزام ، دار المربیخ للنشر ، الیاپس ، م ع س-1992.
- عادل عبد الغنی محبوب : الاقتصاد القياسي ، ایکونومترکسنس ،
مطبع مديریة الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ، العراق-1982.
- نعمه الله نجيب إبراهيم: مقدمة في مبادئ الاقتصاد القياسي ،
مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ج م ع - 2002 .
- [14-][ع.ق.عطية-02]**
- [15-][و.فاندل-92]**
- [16-][ع.محبوب-82]**
- [17-][ن.إ.ن. الله-02]**

بـ- باللغات الأجنبية :

- 18-[G.ANSION-90]** GUY ANSION
Les méthodes de prévision en économie
 Ed .Amand Colin ,Paris.France -1990
- 19-[G.BRESSON -95]** BRESSON George et PIROTTTE Alain
Econométrie des séries temporelles - Théorie et Application
 Edition PUF.France -1995
- 20-[P.J.BROKWELL-91]** Peter. J.BROKWELL - Richard .A.DAVIS
Time Series :Theory and Methods
 Springer -Verlag - New york INC.2nd Edition. USA -1991
- 21-[C.CHATFIELD-96]** CHRIS CHATFIELD
The Analysis Of Time Series , An Introduction
 CHAPMAN & HALL / CRS, 5th
 Edition . FLORIDA .USA-1996
- 22-[B.COUTROT-84]** B.COUTROT et F.DROESBEKE
Les méthodes de prévision en économie
 Que sais-je .Ed PUF Paris.France -1984
- 23 -[J. J.DROESBEKE-94]** Jean Jaque DROESBEKE - Bernard FICHET- Philipe TASSI
Modélisation ARCH
Théorie statistique et application dans la domaine de la finance
 Edition de L'université de Bruxelles. Belgique -1994
- 24-[W.A.FULLER-96]** Wayne A .FULLER
Introduction to Statistical Time Series
 John willey and sons .INC. New York .USA-1996
- 25 -[C.GOURIEROUS -95]** C.GOURIEROUS et A.MONFORT
Séries temporelles et modèle dynamiques
 Ed Economica . 2^{ème} édition , Paris. France -1995 .

- 26 -[C.W.J.GRANGER -86]** C.W.J.GRANGER et Paul NEWBOLD
Forecasting economic time series
 Academic Press .INC .California .USA -1986
- 27-[W.GREENE-05]** William GREENE
Econométrie
 Pearson Education . 5^{ème} édition .France -2005.
- 28-[J.D.HAMILTON -94]** James Douglas HAMILTON
Times series Analysis
 Princeton university press .Princeton. New jersey. USA -1994
- 29-[G.M.JENKINS -94]** Gwilym M. JENKINS-George E.O.BOX -Gregory C.REINSEL
Time Series Analysis : Forecasting and control
 Prentice - Hall , new Jersey3rd edition .USA-1994.
- 30 -[J.JOHNSON -99]** Jack JOHNSON et John DINARDO
Méthodes économétriques
 Economica , Paris .France -1999
- 31- [C.MARMUSE-83]** C.MARMUSE
Les Aides à la décision
 2^{ème} édition , Ed Fernand Nathan -1983.
- 32-[A.SPANOS-86]** Aris SPANOS
Statistical Foundations of Econometric Modeling
 Cambridge University Press -1986 .
- 33 - [M.TENANHAUS -94]** M.TENANHAUS
Méthode Statistique En Gestion
 Ed .Dunod , Paris. France -1994 .
- 34-[R.S.TSAY-02]** RUEY, S TSAY
Analysis of financial Time series
 John Willey and Sons .INC .New York .USA-2002 .
- 35-[J.C.USINER -82]** Jean Claude USINIER et Régis BOURBOUNNAIS
Pratique de la prévision à court terme
Conception de Système de prévision
 Ed .Dunod , Paris. France -1982 .
- 36 -[G.VANGREVELINEGHE-73]** G.VANGREVELINEGHE
Econométrie
 Ed Hermann, Paris. France -1973 .

2- الأطروحة والرسائل والمجلات :

- 1- [ش. الواي- 98] شهرزاد الواي : الطاقة الكهربائية في الجزائر، محاولة التوقع بالإستهلاك باستخدام نماذج قياسية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، فرع إدارة الأعمال، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة قسنطينة- 1998 .

- 2-[ع.ق.بابا-79] عبد القادر بابا : دراسات استخدامات وتطورات نموذج المدخلات والخرجات مع محاولة تحليلية لجدول المدخلات والخرجات TES الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية، فرع التخطيط جامعة الجزائر- 1979 .
- 3-[ع.ق.بوالسبت-01] عبد القادر بوالسبت : دراسة تحليلية وتنبؤية لإنتاج الحبوب الشتوية في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة ، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير ، جامعة قسنطينة- 2001 .
- 4-[ز.حوري-89] حوري زينب : تقييم الأداء في منشأة صناعية، حالة تطبيقية عن المقاولة العمومية لصناعة المواد والأثاث قسنطينة للفترة 84-80 ، معهد العلوم الإقتصادية ، جامعة قسنطينة - 1989 .
- 5-[ب.خنخار-01] بوزيد خنخار : وظائف الإدارة المالية على مستوى المنشأة الإقتصادية مع تطبيق في المؤسسة الجزائرية، دراسة حالة بشركة الخزف الصحي بالبليدة، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير، جامعة قسنطينة-2001 .
- 6-[س. رجال-84] السعدي رجال: أسس استخدام جدول التشابك في التنبؤ بهيكل التعليم في الجزائر، رسالة ماجستير، معهد العلوم الإقتصادية، جامعة قسنطينة- 1984 .
- 7-[س. رجال-98] السعدي رجال : نمذجة خطة تنمية، دراسة تطبيقية على الإقتصاد الجزائري من خلال معطيات الخطة الخمسية الأولى (84-80) ، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية، فرع الإقتصاد الكمي، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير، جامعة قسنطينة-1998.
- 8-[س. عطيوبي-98] سميرة عطيوبي : تحسين التوقع بالطلب على المنتوجات الصيدلانية، دراسة تطبيقية بمؤسسة أنكوفارم، رسالة ماجستير، معهد العلوم الإقتصادية، جامعة قسنطينة- 1998 .
- 9-[س. موابط-02] ساعد مرابط : التوقع بالمبادرات على المدى القصير باستعمال طريقة بوكس-جنكينز، دراسة حالة بالمؤسسة الوطنية لصناعة اللواص والسكاكين والصناعي(B.C.R)، وحدة عين الكبيرة، سطيف، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير، جامعة منتوري- 2002.
- 10-[Z.BELOGBI -05] Zakia BELOGBI
Adaptation du modèle macro économétrique de Haque et Ali à l'économie Algérienne ,
 Thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat d'état en science Economiques,Option :Econométrique ,
 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ,
 Université D'ALGER . 2004-2005.
- 12-[ONS -03] Collection statistique N°111-2003
 Séries E:Statistique Economique N°29
- 13-[م.السباعي-01] د.السباعي محمد الفقي: بحث بعنوان نحو استراتيجيه لإدارة خطر سعر الفائدة بالبنوك التجارية مجلة المال و الصناعة،بنك الكويت الصناعي، الكويت، العدد التاسع عشر- 2001 .

14-[م.ن.الخياط-83] ملم نسيب الخياط : تقويم تجربة التوقع الاقتصادي، مجلة النفط والتعاون العربي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، العدد 54 - 1983 .

3- المكتبة الإلكترونية :

1 - [إ.بختي-06] إبراهيم بختي: نمذجة التنبؤ بالبيعات ، (اطلع عليه يوم 5 مارس 2006) ، [على الخط] ،
<http://bbeckti.online.fr>

2 - [إ.بختي-06] إبراهيم بختي: دليل إجراءات إعداد مذكرة التخرج ، (اطلع عليه يوم 5 مارس 2006) ، [على الخط] ،
<http://bbeckti.online.fr>

3 - [ع. بري-02] عدنان عبد الرحمن بري : طرق التنبؤ الإحصائي (الجزء الأول) ، (اطلع عليه يوم 10 أكتوبر 2006)
[على الخط] ،
<http://www.abarry.net/or/or221book1.pdf>

4- الموقع الإلكتروني لمجمع ERCE : (اطلع عليه يوم 15/12/2006)، [على الخط].
www.erce-dz.com

5- الموقع الإلكتروني لبوابة الجزائر (اطلع عليه يوم 20/1/2007) ، [على الخط] ،
<http://www.babeldjazair.com/models.php?name:news&file>

6-[Y.ARAGON-04]

Yves ARAGN
Introduction aux Séries temporelles , septembre 2004
(page consulter le 25 AVRIL 2006) , [En Ligne] ,
<http://w3.univ-tlse1.fr / GREMAQ / statistique / yves web / docs / lup-cours.pdf>

7-[M.V.ASOKAN-01] M.V.ASOKAN, Shoja'Eddin CHENOURI ,Basili Khalil

Mahmoobadi
Projet Roport on : ARCH and GARCH models , Departement of Statistics & Acturial Sciences ,University of Waterloo , Canada ,
(page consulté le 5 AVRIL 2006) , [En Ligne] ,
<http://www.math.unwaterloo.ca/~schnour/ stat 929.pdf>

8-[M.BOUTAHAR -05]

Mohamed BOUTAHAR
MASTER M2-AE2 PRO :Econométrie Bancaire et Financière Analyse des Séries Chronologiques ,
(page consulté le 4/2/2006) , [En ligne] ,
<http://lumimath.univ-mrs.fr/~boutahar/AE2PRO.pdf>

9-[G.CHEVILLON-04]

Guillaume CHEVILLON,*OFCE et Université D'oxford , Janvier 2004 Pratique des séries temporelles ,*
(page consulté le 10 AVRIL 2006), [En Ligne] ,
<http://www.guillaume.chevillon.free.fr/lecture notes.pdf>

10-[C.HURLIN-04]

Christophe HURLIN

Master ESA , Econométrie et Statistique Appliquée.

Université D'Orléan économétrie pour la finance

(page Consulter le **20/05/2006**) , [En Ligne] ,

http://www.dauphine.fr/eurisco/ch_cours/cour_finance.pdf

11-[C.G.RENFRO-03]

Charles G. RENFRO

Econometric Software : The first Fifty years in perspective

(page consulté le **4 AVRIL 2006**) , [En Ligne] ,

<http://w3.Autobox.com/pdfs/econometrics.pdf>

الملخصات

المفهوم:

يعتبر التوقع الصحيح القائم على الأسس العلمية والطرق الرياضية والإحصائية جوهر الإدراة، ولذا قمنا في هذا البحث بتطبيق أشهر طرق التوقع بالبيانات وهي طريقة بوكس-جنكز(1970)، والتي تعتبر كفن يعتمد على الممارسة وخبرة الباحث أكثر من اعتمادها على قواعد تابئة، وذلك بالمرور بالراحل الأربعة إنطلاقاً من تحديد شكل النموذج، سواءً كان في شكله البسيط ARMA، أو الموسّع SARIMA في حالة وجود المركبة الموسمية، ثم تقدير معلماته، وأخيراً التوقع باستعمال النموذج المختار بعد تشخيصه والتأكد من أن بوأقيه تشكل صدمات عشوائية، الشيء الذي جعلها وحسب العديد من الأبحاث تتتفوق بشكل هائل في جميع الميادين التطبيقية على طرق التمليس الأسني، والتي تفترض وجود قانون أساسي معين تتبعه السلسلة الزمنية، وهذا ما أثبتناه من خلال المقارنة بين نتائج طريقتي التمليس الأسني وبوكس-جنكز .

إلا أنه وب رغم انتشار استعمال نماذج ARMA، إلا أنها تعاني قصوراً هي أنها مبنية على أساس ثبات التباين، إلا أنه في الواقع فإن غالبية السلاسل القياسية تتميز بعدم ثبات التباين، وهذا ما دفع R.F.Engle (1982) إلى اقتراح نموذج ARCH الذي يأخذ في الإعتبار عدم ثبات التباين، كما تبعه T. Bollerslev (1986) باقتراح النموذج GARCH والذي يأخذ في الإعتبار قصور النموذج . ARCH

الكلمات المفتاحية :

- التوقع بالبيانات ،
- تحليل السلاسل الزمنية ،
- شروط الاستقرارية ،
- نماذج ARMA ،
- عدم ثبات التباين ،
- نماذج ARCH-GARCH .

Summary :

Accurate forecasting based on scientific methods like mathematics and statistics is considered as the essence of management, for this we have applied one of the most famous methods of sales forecasting called BOX-JENKINS method (1970). It is an art which depends on the practice and experience of the researcher rather than relying on fixed rules, and that by passing through four stages: the first stage consists on the identification of the model form. The simple form ARMA or expended SARIMA in the case of the existence of the seasonal combination, the estimation of the model parameters identified, finally forecasting by using the model chosen after diagnostic checking and to make sure that the residuals are random shocks. According to several researches, these models are superior in all areas of application against exponential smoothing methods. This is supposed to be some fundamental law suit of the time series, and is what we prove by comparing the results of exponential smoothing and BOX-JENKINS method.

However, Despite the popularity of ARMA models in forecasting the time series, it have a significant limitation, namely it assumes a constant conditional variance. Most of the econometric data exhibit the non-constant conditional variance, Engle (1982) introduced ARCH model, which allows the conditional variance to change over time, and T. Bollerslev (1986) introduced GARCH model which takes into account the disadvantages of ARCH model .

Key words :

- Sales Forecasting ,
- Time Series Analysis ,
- Stationarity Condition ,
- ARMA models ,
- Heteroscedasticity ,
- ARCH-GARCH models .

Résumé :

La bonne prévision est celle basée sur les méthodes scientifiques, mathématiques et statistiques. Elle est considérée comme le Soubassement de la gestion. Pour toutes ces raisons nous nous intéressons dans cette recherche à l'une des plus célèbres méthodes de prévision des ventes à savoir la méthode de BOX- JENKINS (1970). Cette méthode est considérée comme un art qui dépend de la pratique et de l'expérience du chercheur plutôt que des règles fixes. Elle passe par quatre étapes : La première étape consiste en l'identification de la forme du modèle, forme simple ARMA et la forme dans le cas de l'existence de la composante saisonnière se nomme SARIMA , La seconde étape consiste à estimer les paramètres du modèle identité. L'étape finale consiste en la prévision en utilisant le modèle choisi après le diagnostic qui vérifie que les résidus sont des processus de chocs aléatoires. Ce qui permet à ce type de modèle d'être supérieur dans tous les domaines d'application sur les méthodes de lissage exponentiel, qui elles supposent l'existence de loi fondamentale suivie par la série chronologique. Ce que nous essayons de prouver parle biais de la comparaison entre les résultats des méthodes de lissage exponentiel et la méthode de BOX-JENKINS.

Cependant, en dépit de la popularité des modèles ARMA dans la prévision des séries chronologiques, ceux-ci ont une limite significative, à savoir la constance de la variance conditionnelle. Mais en réalité la majorité des données économétriques ont montré le caractère hétérogène de la variance conditionnelle. R.F.Engle (1982) a présenté le modèle ARCH, qui considère que la variance conditionnelle n'est pas constante. Pour palier aux insuffisances dans le modèle ARCH. T.Boomerslev (1986) a présenté le modèle GARCH .

Mots clé :

- Prévision des ventes ,
- Analyses des séries chronologiques ,
- les conditions de stationnarité ,
- les modèles ARMA ,
- Hétéroscédasticité ,
- les modèles d'ARCH-GARCH .

فهرس اجداد

والأشكال والملحق

فهرسة الجداول

=*=*=*=*=*=*=

الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
11.....	مجالات استخدام التوقع في المؤسسة.....	1-1
26.....	جدول المدخلات والخرجات.....	2-1
29.....	تطورات (PIB) وعدد السكان في الجزائر المقابل لكل سنة من السنوات 1963 حتى 2002	3-1
34.....	طرق تعديل السلسلة الزمنية.....	4-1
41.....	جدول تحليل التباين	5-1
114.....	الدالة ACF و PACF للنماذج الغير موسمية	1-2
115.....	الدالة ACF و PACF للنماذج الموسمية	2-2
168.....	تطور إنتاج CPS-CEM II/A 42.5 (2004 - 1998) بين سنتي (2004 - 1998)	1-4
169.....	تطور مؤشرات النشاط بالمؤسسة	2-4
171.....	جدول حسابات النتائج للفترة (2005-2003)	3-4
172.....	تطور القيمة المضافة وهيكـل التكاليف خلال الفترة (05-03)	4-4
173.....	تطور أعباء الإستغلال خلال الفترة (05-03)	5-4
174.....	مقارنة مصاريف المستخدمين ومصاريف المواد المباشرة إلى رقم الأعمال وإلى النشاط الإجمالي	6-4
175.....	تطور رقم الأعمال خلال الفترة (05-03)	7-4
177.....	نتائج الإسمنت واستخداماتها	8-4
179.....	تطور الأسعار الخاص بالإسمنت البني الموضب في الأكياس SAC + الغير موضب VRAC	9-4
184.....	قيم السلسلة (y _t) : Vrac(Fer + Terre)	1-5
186.....	المتوسط الحسابي ، والإنحراف المعياري لسلسلة المبيعات الخام (y _t)	2-5
187.....	قيم السلسلة الزمنية المحولة z _t = $\sqrt{y_t}$	3-5
189.....	الترتيب الزمني والتتصاعدي للسلسلة الزمنية المحولة (z _t)	4-5
190.....	جدول تحليل التباين	5-5
194.....	تقدير واختبار معنوية نموذج المتوسطات المتحركة ARMA(0,16)	6-5
196.....	تقدير واختبار معنوية معالم نموذج الإنحدار الذاتي ARMA(15,0)	7-5
197.....	تقدير واختبار معنوية معالم نموذج الإنحدار الذاتي الأمثل ARMA(15,0)	8-5
198.....	اختبار واحتـبار معنـوية معـالم نـموذـج (Q _{LB})Ljung - Box	9-5
199.....	اختبار واحتـبار معنـوية نـموذـج (Q _{LB})Ljung - Box	10-5

200	ARMA(15,1)	تقدير واختبار معنوية معالم النموذج المختلط الأول	11-5
201	ARMA(15,1) (Q_{LB})Ljung - Box	اختبار للبواقي	12-5
202	ARMA(15,9)	تقدير واختبار معنوية معالم النموذج المختلط الثاني	13-5
203	ARMA(15,9) (Q_{LB})Ljung - Box	اختبار للبواقي للنموذج	14-5
205		مقارنة النماذج	15-5
206		نتائج التوقعات النقطية باستعمال طريقة بوكس - جنكنز	16-5
209		مجالات الثقة للقيم المتوقعة	17-5
211		تقدير معايرة التوقع لطريقة المسح الأسوي البيسيط	18-5
212		قيم الإنحراف المعياري للتوقع للطريقتين	19-5
215	AR(15)	تقدير معلمات النموذج	20-5
216	AR(15)	تقدير معلمات النموذج المعدل	21-5
217	AR (15) (Q_{LB})Ljung - Box	اختبار للبواقي للنموذج	22-5

فهرسة الأشكال

$= * = * = * = *$

الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
14.....	1-1 أهمية التوقع لنجاح الموزنات التقديرية
19.....	1-2 العلاقة بين المستويات الأساسية للتوقع بالبيعات
22.....	1-3 التقسيمات الرئيسية والفرعية لأساليب التوقع.....
24.....	4-1 خطوات المقاربة التكرارية من أجل بناء النموذج القياسي.....
25.....	5-1 قسمي نماذج القياس الاقتصادي.....
31.....	6-1 الناتج الداخلي الخام (PIB) للجزائر من سنة 1963 حتى سنة 2002
31.....	7-1 تطور عدد السكان من سنة 1963 حتى سنة 2002
32.....	8-1 سلسلة زمنية ممثلة بواسطة النموذج AR(1)
35.....	9-1 تطور الدخل الوطني الجزائري من 1969 حتى 1989
36.....	10-1 مركبات السلسلة الزمنية.....
39.....	11-1 الشكل الجدائي للسلسلة الزمنية
39.....	12-1 الشكل التجمعي للسلسلة الزمنية.....
51.....	13-1 تطور التابع اللوجستيكي.....
76.....	1-2 الدالة ACF لعملية التشويش الأبيض
76.....	2-2 الدالة PACF لعملية التشويش الأبيض
83.....	3-2 الدالة ACF للنموذج AR(1) في حالة: $\phi_1 > 0$
83.....	4-2 الدالة ACF للنموذج (1) AR في حالة: $\phi_1 < 0$
84.....	5-2 الدالة PACF للنموذج AR(1) في حالة: $\phi_1 > 0$
85.....	6-2 الدالة PACF للنموذج (1) AR في حالة: $\phi_1 < 0$
87.....	7-2 الدالة ACF للنموذج (2) AR في حالة: $\phi_1 = 0.4, \phi_2 = 0.4$
87.....	8-2 الدالة ACF للنموذج (2) AR في حالة: $\phi_1 = 1.5, \phi_2 = -0.8$
88.....	9-2 الدالة PACF للنموذج (2) AR في حالة: $\phi_1 = 0.4, \phi_2 = 0.4$
89.....	10-2 الدالة PACF للنموذج (2) AR في حالة: $\phi_1 = 1.5, \phi_2 = -0.8$
93.....	11-2 الدالة ACF للنموذج (1) MA في حالة: $\theta_1 = 0.8$
93.....	12-2 الدالة ACF للنموذج (1) MA في حالة: $\theta_1 = -0.8$
94.....	13-2 الدالة PACF للنموذج (1) MA في حالة: $\theta_1 = -0.8$
95.....	14-2 الدالة PACF للنموذج (1) MA في حالة: $\theta_1 = 0.8$

96.....	2-15 الدالة ACF للنموذج MA(2) في حالة: $\theta_1 = 0.4 , \theta_2 = 0.4$
97.....	2-16 الدالة ACF للنموذج MA(2) في حالة: $\theta_1 = 1.5 , \theta_2 = -0.8$
97.....	2-17 الدالة PACF للنموذج MA(2) في حالة: $\theta_1 = 0.4 , \theta_2 = 0.4$
97.....	2-18 الدالة PACF للنموذج MA(2) في حالة: $\theta_1 = 1.5 , \theta_2 = -0.8$
102.....	2-19 الدالة ACF للنموذج ARMA(1,1) في حالة: $\phi_1 = 0.9, \theta_1 = -0.5$
102.....	2-20 الدالة ACF للنموذج ARMA(1,1) في حالة: $\phi_1 = -0.9, \theta_1 = -0.5$
103.....	2-21 الدالة PACF للنموذج ARMA(1,1) في حالة: $\phi_1 = 0.9 , \theta_1 = -0.5$
110.....	2-22 الدالة ACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)₁₂ في حالة: $\Phi = 0.6 , \theta = 0.5$
110.....	2-23 الدالة ACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)₁₂ في حالة: $\Phi = 0.6 , \theta = -0.5$
110.....	2-24 الدالة PACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)₁₂ في حالة: $\Theta = 0.6$
111.....	2-25 الدالة PACF للنموذج SARIMA(0,d,1)(1,D,0)₁₂ في حالة: $\Theta = -0.6$
113.....	2-26 مراحل النمذجة بواسطة نماذج ARMA
158.....	1-4 وحدات مجمع(ERCE)
160.....	2-4 الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية لمجمع (ERCE)
163.....	3-4 الهيكل التنظيمي للوحدة التجارية (SCMCE)
167.....	4-4 الهيكل التنظيمي لشركة الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)
168.....	4-5 تطور إنتاج الإسمنت البورتلاندي المركب CPS-CEM II/A 42.5
175.....	4-6 تطور النتيجة الصافية بين سنتي (05-03)
176.....	4-7 تطور رقم الأعمال بين سنتي (05-03)
185.....	5-1 المنحنى البياني للسلسلة الزمنية (y_t)
188.....	5-2 المنحنى البياني للسلسلة الزمنية المعدلة (z_t)
192.....	5-3 الدالتين ACF و PACF للسلسلة الزمنية (z_t)
201.....	5-4 المضلع التكراري لباقي النموذج ARMA(15,1)
204.....	5-5 المضلع التكراري لباقي النموذج ARMA(15,9)
208.....	5-6 باقي النموذج الأمثل ARMA(15,9)
210.....	5-7 منحنى التوقع بواسطة بوكس- جنكينز والبيانات الحقيقية.
214.....	5-8 منحنى ACF و PACF للسلسلة الأصلية (y_t)

فهرسة الملحق

=*==*==*==*

الصفحة	عنوان الملحق	رقم الملحق
223.....	جدول حسابات النتائج 2003	الملحق[1]
224.....	جدول حسابات النتائج 2004	الملحق[2]
225.....	جدول حسابات النتائج 2005	الملحق[3]
226.....	Correlogram of Residuals of ARMA (0,16) Model	الملحق[4]
227.....	Correlogram of Residuals of ARMA(15,0) Model	الملحق[5]
228.....	Correlogram of Residuals of ARMA(15,1) model	الملحق[6]
229.....	Correlogram of Residuals of ARMA(15,9) Model	الملحق[7]
230.....	Correlogram of Residuals squared of AR (15) Model	الملحق[8]
231.....	" Z Distribution"	الملحق[9]
232.....	توزيع كاي تربيع (χ^2)	الملحق[10]
233.....	" T Distribution"	الملحق[11]

فهرس المحتويات

الفهرس

--*-*-*

١.....	مقدمة عامة
الفصل الأول : التوقع بالمبينات وأهم طرقه	
٧.....	تمهيد.....
٧.....	البحث الأول : أهمية التوقع بالمبينات المؤسسة ومستوياته.....
٧.....	١- مدخل مفاهيمي.....
٧.....	١-١- التوقع
٨.....	١-٢- التنبؤ
٨.....	١-٣- لتقدير.....
٩.....	١-٤- التخطيط.....
١٠.....	٢- أهمية التوقع بالمبينات في المؤسسة ومستوياته.....
١٠.....	٢-١- أهمية التوقع في المؤسسة و المجالات استخدامه.....
١٢.....	٢-٢- استخدامات بيانات التوقع بالمبينات
١٤	٢-٣- العوامل المؤثرة في حجم المبينات.....
١٦.....	٢-٤- معايير التوقع الفعال
١٧.....	٢-٥- المستويات الأساسية للتوقع.....
١٩.....	٣- متطلبات التوقع بالمبينات.....
٢١	البحث الثاني: أساليب التوقع بالمبينات
٢١.....	١- الأساليب النظامية
٢٣	١-١- النماذج الغير سببية.....
٢٣.....	١-١-١- نموذج الخطوة العشوائية.....
٢٣.....	١-٢- النماذج السببية.....
٢٣.....	١-٢-١- نماذج القياس الاقتصادي.....
٢٥.....	١-٢-٢- نماذج المدخلات والخرجات.....
٢٧.....	١-٢-٣- التنبؤ باستخدام طريقة الخبراء.....
٢٩.....	البحث الثالث : مركبات السلسلة الزمنية وطرق كشفها.....
٢٩	١- مركبات السلسلة الزمنية.....
٢٩	١-١- تعریف السلسلة الزمنية.....
٣٤	٢- مركبات السلسلة الزمنية.....

36	3- الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية
36	3-1- عن طريق تحليل المعلومات بيانيا
36	3-2- عن طريق الإختبارات الإحصائية
36	3-2-1- الكشف عن مركبة الإتجاه العام ($T(t)$)
38	3-2-2- الكشف عن المركبة الموسمية ($S(t)$)
42	المبحث الرابع : التوقع بواسطة نماذج الإستقطاب
42	1- التوقع بواسطة الإتجاه العام
42	1-1- نموذج الإتجاه العام الخطى
42	1-1-1- الفرضيات الأساسية
44	1-1-2- طريقة المربعات الصغرى العادلة (OLS)
46	1-1-3- طريقة المصفوفات
49	2- النموذج الأسى
50	3- نموذج القطع المكافئ
50	4- النموذج اللوجستيكي
51	2- تقييم النموذج
51	1- اختبار جودة المعامل
52	2- اختبار المعنوية الإحصائية
53	3- اختبار المعنوية الكلية
54	4- اختبار فرضية عدم الإرتباط الذاتي بين الباقي
55	3- التوقع والتمهيد بواسطة النماذج المكيفة
55	1-3- التوقع
55	1-1-3- نماذج المتوسطات المتحركة
57	2-3- التمهيد
57	1-2-3- التمهيد بواسطة المتوسطات المتحركة البسيطة
57	2-2-3- التمهيد بواسطة المتوسطات المتحركة المركزية
57	3-2-3- طرق التمهيد الأسى
60	4- المركبة الفصلية وكيفية التعامل معها
60	1-4- طرق إزالة المركبة الموسمية
61	1-1-4- لا يتم حساب المؤشرات الفصلية

٤-١-٢- الطرق التي يتم فيها حساب المؤشرات الفصلية	٦١
٤-٢- النمذجة	٦٤
ملخص الفصل الأول	٦٦
الفصل الثاني : طريقة بوكس - جنكنز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية	
تمهيد	٦٨
المبحث الأول : مفاهيم عن السلسل الزمنية	٦٨
١- السياق العرضي	٦٨
٢- الإستقرارية	٦٩
١- اختبارات السكون	٧٠
١-١- دالة الإرتباط الذاتي ACF	٧٠
١-٢- اختبار جدر الوحدة للإستقرار	٧٠
٣- سلسلة التشويش الأبيض " الضجة البيضاء " (White Noise Series)	٧٢
٤- مميزات السلسلة الزمنية الإقتصادية	٧٣
٤-١- دالة الإرتباط الذاتي ACF	٧٣
٤-٢- دالة الإرتباط الذاتي الجزئية PACF	٧٤
٤-٣- منحنى دالة الإرتباط الذاتي Correlogram	٧٥
٤-٤- الدالة ACF لعملية الضجة البيضاء	٧٥
٤-٥- الدالة PACF لعملية الضجة البيضاء	٧٦
٤-٦- الدالة ACF للعينة	٧٧
٤-٧- الدالة PACF للعينة	٧٨
٤-٨- مفاهيم أساسية	٧٩
المبحث الثاني : النماذج الخطية للسلسلة الزمنية	٨٠
١- نماذج الإنحدار الذاتي AR	٨٠
١-١- نموذج الإنحدار الذاتي من الدرجة الأولى AR(1)	٨٠
١-١-١- شرط سكون للنموذج AR(1)	٨٠
١-١-٢- بعض الملامح الخاصة لعملية AR(1)	٨١
١-٢- نموذج الإنحدار الذاتي من الدرجة الثانية AR(2)	٨٥
١-٢-١- شرط السكون للنموذج AR(2)	٨٥
١-٢-٢- بعض الملامح الخاصة لنموذج AR(2)	٨٦
١-٣- نموذج الإنحدار من الدرجة p: AR(p)	٨٩

89	- شرط السكون للنموذج AR(p)
89	- بعض الملامح الخاصة لعملية AR(p)
90	- نماذج المتوسطات المتحركة
90	- نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الأولى MA(1)
91	- شرط الإنعكاس لنموذج MA(1)
92	- مميزات خاصة لعملية MA(1)
95	- نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الثانية MA(2)
95	- شرط استقرارية النموذج MA(2)
96	- مميزات خاصة لعملية MA(2)
98	- نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة q: MA(q)
98	- شروط انعكاس النموذج MA(q)
99	- مميزات خاصة لعملية MA(q)
100	- نماذج الإنحدار الذاتي وال المتوسطات المتحركة ARMA(1,1)
100	- النموذج ARMA(1,1)
100	- قيود على النموذج ARMA(1,1)
102	- مميزات خاصة للنموذج ARMA(1,1)
104	- نماذج ARMA من درجة أعلى
104	- شروط استقرار وانعكاس النموذج ARMA(p,q)
104	- الدالتين ACF و PACF للنموذج ARMA(p,q)
104	- النماذج الغير ساكنة
104	- نموذج السير (الإنقال) العشوائي
105	- دالة الذاكرة
105	- نماذج الإنحدار الذاتي وال المتوسطات المتحركة التكمالية ARIMA(p,d,q)
106	- النماذج الموسمية
106	- نماذج الإنحدار الذاتي الموسمية SAR
107	- نماذج المتوسطات المتحركة الموسمية SMA
108	- النماذج الموسمية المختلطة SARMA(p,q)
109	- النماذج الموسمية المركبة المضاعفة SARIMA(p,d,q) × (P,D,Q)
112	المبحث الثالث : منهجية بوكس - جنكينز في تحليل السلسل الزمنية الخطية

113.....	١- مرحلة تحديد النموذج
113.....	١-١- الحكم على استقرارية النموذج.....
114.....	١-٢- التعرف على درجة نموذج السلسلة.....
115.....	٢- مرحلة تقدير معلمات النموذج.....
115.....	٢-١- تقدير معلمات نموذج إنحداري ذاتي من الدرجة p : AR(p) :
115.....	٢-١-١- طريقة معادلات يول- وولكر (Youl-Walker)
116.....	٢-١-٢- الطريقة الإنحدارية
117.....	٢-٢- طرق تقدير نماذج المتواضطات المتحركة والمختلطة
117.....	٢-٢-١- طريقة العقولية العظمى
119.....	٢-٢-٢- طريقة البحث التشابكي (Gried-Search)
121.....	٣- مرحلة اختبار النموذج
121.....	٤-١- تحليل بوافي النموذج.....
124.....	٤-٢- المقارنة بين النماذج.....
125.....	البحث الرابع: التوقع وقياس دقتها.....
125.....	٤-٣- التوقع.....
126.....	٤-١-١- التوقع بنقطة (point forecast)
128.....	٤-١-٢- التوقع بمجال (forecast interval)
130.....	٤-٢- قياس جودة التوقع
130.....	٤-٢-١- مقياس الخطأ النسبي (ER)
131.....	٤-٢-٢- معيار (Thiel)
132.....	ملخص الفصل الثاني
الفصل الثالث : التوقيع بواسطة نماذج ARCH-GARCH	
134.....	تمهيد.....
134.....	المبحث الأول : التعريف بمشكلة عدم تبات التباين وأهم اختبارات الكشف عليها.....
134.....	١- تعريف مشكلة عدم تبات التباين(Heteroscedasticity)
137.....	٢- اختبارات الكشف عن عدم تبات التباين
137.....	٢-١- اختبار (Goldfeld-Quandt)
138.....	٢-٢- اختبار (Breush- Pagan)
139.....	٣-٢- اختبار (White)
140.....	٤-٢- اختبار (Park)

141.....	المبحث الثاني: نمذجة عدم تباث التباين المشروط
141.....	١- نموذج ARCH(q)
141.....	١-١- التعريف بشكل النموذج ARCH(q)
142.....	١-٢- النموذج ARCH من الدرجة الأولى (1)
142.....	١-٢-١- التعريف بالنموذج ARCH(1)
142.....	١-٢-٢- خصائص النموذج ARCH(1)
144.....	١-٣- شرط استقرارية النموذج (1)
144.....	١-٣-١- مآخذ النموذج ARCH(q)
144.....	١-٤- بناء النموذج ARCH
145.....	١-٤-١- نمذجة و اختيار النموذج
146.....	١-٤-٢- تقدير معلمات النموذج
148.....	١-٤-٣- اختبار النموذج
148.....	١-٤-٤- التوقع باستعمال النموذج ARCH(q)
148.....	١-٥- مشكلة نماذج ARCH
149.....	٢- النموذج GARCH(p,q)
149.....	٢-١- التعريف بالنماذج GARCH(p,q)
149.....	٢-١-١-٢- شكل النموذج GARCH(p,q)
150.....	٢-١-٢-٢- خصائص النموذج GARCH(p,q)
151.....	٢-١-٣- شروط استقرارية النموذج GARCH(p,q)
151.....	٢-٢- التعريف بالنماذج ARCH(1,1)
151.....	٢-٢-١-٢- شكل النموذج GARCH(1,1)
152.....	٢-٢-٢-٢- شرط استقرارية النموذج GARCH(1,1)
152.....	٢-٣- اختبار توزيع النموذج GARCH(p,q)
152.....	٢-٤- التوقع بواسطة النموذج GARCH(p,q)
154.....	ملخص الفصل الثالث

الفصل الرابع : التعريف بالشركة وتشخيص المزيج التسويقي

156.....	تمهيد
156.....	المبحث الأول : التعريف بمجمع الإسمنت للشرق (ERCE)
157.....	١- الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية
161.....	٢- التعريف بشركة تسويق مواد البناء للشرق (SCMCE)

161	- الهيكل التنظيمي لشركة (SCMCE)
164	- أهم نشاطات الشركة
164	- الإستراتيجية المتبعة من طرف (ERCE)
166	المبحث الثاني: وظائف شركة إنتاج الإسمنت حامة بوزيان (SCHB)
166	- التعريف بالشركة
166	- الهيكل التنظيمي لشركة (SCHB)
168	- وظائف شركة (SCHB)
168	- 1- وظيفة التموين
168	- 2- الوظيفة الإنتاجية والتحويلية
168	- 3- خط إنتاج الإسمنت البورتلاندي المركب (CPSCEM II/A 42.5)
169	- 3-3- الوظيفة المالية
175	- 4- الوظيفة التسويقية
176	المبحث الثالث : تشخيص المزيج التسويقي لمنتج الإسمنت البورتلاندي المركب
176	- دراسة المنتوج
176	- 1- طبيعة المنتوج والسوق المستهدف
177	- 1-2- الجودة والضمان
178	- 2- دراسة الأسعار والمنافسة
178	- 2-1- الأسعار
179	- 2-2- المنافسة
180	- 3- دراسة الإشهار والتوزيع
180	- 1-3- الإشهار
180	- 2-3- التوزيع
181	ملخص الفصل الرابع

الفصل الخامس : الدراسة التطبيقية

183	تمهيد
183	المبحث الأول : الدراسة الإحصائية للسلسلة الزمنية
183	1- السلسلة الزمنية محل الدراسة
183	2- تحليل أولي
183	1-2- فحص البيانات
185	2- تعلیقات على البيانات

188.....	3- الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية (y_t)
188.....	1-3- الكشف عن مركبة الإتجاه العام (T_t)
190.....	2- الكشف عن المركبة الموسمية (S_t)
191.....	المبحث الثاني: التوقع باستعمال بوكس-جنكنز والمقارنة مع المسح الأسي
191.....	1- مرحلة التعرف (Identification)
193.....	1-1- الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية (z_t)
193.....	1-2- التعرف على النماذج الممكنة
193.....	2- مرحلة التقدير واختبار معلمات النموذج (Estimation and Diagnostic Checking)
193.....	1-1- التقدير (Estimation)
193.....	1-1-1- النموذج الأول ARMA(0,16)
195.....	1-1-2- النموذج الثاني ARMA(15,0)
198.....	2- التشخيص (Diagnostic Checking)
198.....	2-1- تشخيص نموذج المتوسطات المتحركة الأمثل ARMA(0,16)
198.....	2-2- تشخيص نموذج الإنحدار الذاتي الأمثل ARMA(15,0)
199.....	2-2-2- تقدير وتشخيص النموذج المختلط الأول ARMA(15,1)
202.....	2-2-2- تقدير وتشخيص النموذج المختلط الثاني ARMA(15,9)
204.....	2-2-5- المقارنة بين النماذج
205.....	3- التوقع (Forecasting)
205.....	1- التوقع بنقطة
208.....	2- التوقع بمجال
210.....	4- التوقع باستعمال طرق المسح الأسي
210.....	4-1- نتائج التوقع باستعمال طرق المسح الأسي البسيط
212.....	5- المقارنة بين طريقة بوكس- جنكنز وطريقة المسح الأسي البسيط
213.....	المبحث الثالث : التوقع بواسطة نماذج GARCH و ARCH
213.....	1- التوقع باستعمال نموذج ARCH
213.....	1-1- اختبار عدم ثبات التباين (Heteroscedasticity)
213.....	1-1-1- تقدير نموذج الإنحدار الذاتي المناسب
216.....	1-1-2- الإختبار
217.....	2- التوقع باستعمال نموذج GARCH

218.....	ملخص الفصل الخامس
219.....	خاتمة عامة
222.....	الملاحق
234.....	الببليوغرافيا
242.....	فهرس الجداول
244	فهرس الأشكال
246.....	فهرس الملاحق
247.....	فهرس المحتويات
	الملخصات